

Dixième tribu : *Crossotini* Thoms.

Crossotina Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 64.

Crossotides + *Hecyrides* + *Ecyroschemides* Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 416, 503, 515, 517.

Crossotidæ Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 190 et suivantes.

Hecyrini Matsush. 1933. Journ. Fac. Agric. Hokk. XXXIV, p. 315.

Cette tribu est caractérisée, d'après LACORDAIRE, parmi les Lamiaires, par son pronotum sans arêtes latérales, les crochets des tarsi simples, le corps ailé, le métasternum de longueur normale, le scape sans cicatrice, pas granulé au bout apical, les cavités cotyloïdes intermédiaires ouvertes, les crochets divariqués, les tibias intermédiaires sans sillon dorsal, la tête rétractile, l'épistome distinct, les antennes sans large sillon longitudinal latéral et sans fascicules de poils.

D'après LACORDAIRE les *Hecyrini* devraient se distinguer des *Crossotini* par le scape en massue et les *Ecyroschemini* par le front trapézoïdiforme et les articles 5 à 11 très courts. Je trouve ces différences insuffisantes ainsi que non constantes et par suite je réunis ces trois groupes ensemble.

Des *Phrynetini*, le groupe le plus proche, les *Crossotini sensu lato* ne se distinguent que par des caractères secondaires, comme la stature plus petite, les yeux moins grands, etc.

Cette tribu comprend trente-quatre genres de l'Afrique et de l'Asie méridionale et orientale.

AURIVILLIUS cite, dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING, treize genres parmi les *Crossotini*, deux parmi les *Ecyroschemini* et six parmi les *Hecyrini*.

Un de ces genres, *Apatelarhron* Thoms. (qui montre des caractères tout à fait spéciaux), doit être exclu de ce groupe, et les genres *Crossotofrea* Hintz et *Cyrtofrea* Auriv. se rangent mieux comme sous-genres du genre *Frea* Thoms.

En outre *Gasponia* Fairm. (rangé dans le Catalogue parmi les *Ceroplesini*), *Corus* Pasc. (rangé parmi les *Apodasyini*), *Tambusa* Dist. (rangé parmi les *Ancylonotini*), et *Mycerinus* Thoms. (rangé parmi les *Nipponini*) viennent en réalité se ranger dans le groupe actuel, et *Mycerinicus* Kolbe est un synonyme de *Mycerinus* Thoms.

Depuis, un genre fut décrit par SCHWARZER : *Neosthenias*, qui est un synonyme de *Plectropygus* Gah. J'ai décrit depuis lors sept genres et j'en ajoute encore six autres.

A. — Tableau de détermination des genres.

1. La saillie prosternale moins haute que les hanches antérieures, régulièrement arquée.....	2
— La saillie prosternale aussi haute que les hanches antérieures, ou parfois un peu moins haute, mais alors tronquée verticalement à son bord antérieur.....	14
2. La saillie prosternale est large.....	3
— La saillie prosternale est étroite.....	4
3. Le pronotum pourvu d'une épine latérale.....	1. <i>Epirochroa</i> Fairm.
— Le pronotum sans épine latérale.....	2. <i>Geteuma</i> Thoms.
4. Les élytres sans crêtes ni tubercules ni fascicules de poils.....	5
— Les élytres pourvus de crêtes ou de tubercules ou de fascicules de poils.....	9
5. Le front trapézoïdiforme.....	34. <i>Paramæchotypha</i> Breun.
— Le front non trapézoïdiforme.....	6
6. Le pronotum pourvu d'une épine latérale.....	7
— Le pronotum sans épine latérale.....	8
7. Le scape court, fort.....	18. <i>Mimoranova</i> Breun.
— Le scape médiocrement long, peu fort.....	4. <i>Frea</i> Thoms. Sous-Genre <i>Cyrtofrea</i> Auriv.
8. La surface couverte de poils érigés.....	7. <i>Cincinnati</i> Jord.
— La surface sans poils érigés.....	6. <i>Mimiculus</i> Jord.
9. Le troisième article des antennes aussi long que le quatrième.....	10
— Le troisième article des antennes distinctement plus long que le quatrième.....	11
10. Les élytres pourvus de poils érigés.....	3. <i>Epirochroides</i> Breun.
— Les élytres sans poils érigés.....	16. <i>Tambusa</i> Dist.
11. Les tubercules antennifères très élevés.....	12
— Les tubercules antennifères peu élevés.....	13

12. Les tubercules antennifères très rapprochés l'un de l'autre, le pronotum sans épine latérale.....	19. <i>Ecyroschema</i> Thoms.	
— Les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, le pronotum pourvu d'une épine latérale.....	12. <i>Mimocorus</i> Breun.	
13. Les élytres pourvus de fascicules de poils.....	21. <i>Plectropygus</i> Gah.	
— Les élytres sans fascicules de poils.....	17. <i>Hecyroides</i> Breun.	
14. Les articles antennaires pourvus à partir du quatrième d'un fin sillon longitudinal latéral.....	15. <i>Gasponia</i> Fairm.	
— Les antennes sans sillon semblable.....		15
15. La saillie mésosternale plus large que longue.....		16
— La saillie mésosternale plus longue que large.....		18
16. Les quatre premiers articles antennaires très légèrement grossis, l'épine latérale du pronotum extrêmement longue, fortement recourbée au sommet.....	5. <i>Freopsis</i> Hintz	
— Les quatre premiers articles antennaires non grossis, l'épine latérale du pronotum pas si longue.....		17
17. La saillie prosternale très élargie à son bord antérieur, prolongée en un tubercule saillant à son bord postérieur..	9. <i>Leucographus</i> Wat.	
— La saillie prosternale non élargie à son bord antérieur, non prolongée en un tubercule saillant à son bord postérieur.	10. <i>Dichostathes</i> Thoms.	
18. Le pronotum pourvu d'une fine crête longitudinale médiane très nette et de deux longues épines latérales larges et émoussées.....	14. <i>Phanis</i> Fairm.	
— Le pronotum sans une telle crête.....		19
19. Le scape au moins de longueur médiocre, peu fort.....		20
— Le scape peu long ou même très court, fort.....		21
20. Un grand fascicule de poils sur le calus huméral des élytres.....	8. <i>Megalofrea</i> Auriv.	
— Pas de fascicule de poils sur le calus huméral des élytres.....	4. <i>Frea</i> Thoms.	
21. Les élytres sans crête ni fascicules de poils ni tubercules.....		22
— Les élytres pourvus de crêtes ou de tubercules ou de fascicules de poils.....		24
22. Le métasternum raccourci, le pronotum sans trace d'épine latérale.....	22. <i>Mycerinus</i> Thoms.	
— Le métasternum de longueur normale, le pronotum avec une épine latérale.....		23
23. La saillie prosternale régulièrement arquée.....	20. <i>Stheniopygus</i> Breun.	
— La saillie prosternale tronquée verticalement à son bord antérieur.....	23. <i>Niphecyra</i> Kolbe	
24. Yeux subdivisés.....		25
— Yeux échancrés.....		28
25. Les cuisses claviformes.....		26
— Les cuisses non claviformes.....		27
26. Les fascicules de poils sont très petits.....	29. <i>Biobessa</i> Gah.	
— Les fascicules de poils sont grands.....	31. <i>Falsobiobessa</i> Breun.	
27. Pas de fascicule de poils après le milieu des élytres.....	32. <i>Mæchotypa</i> Thoms.	
— Au moins un fascicule de poils après le milieu des élytres.....	11. <i>Corus</i> Pasc.	
28. Au moins un fascicule de poils après le milieu des élytres.....		29
— Pas de fascicule de poils après le milieu des élytres.....		32
29. Le front trapézoïdiforme.....	25. <i>Neohecyra</i> Breun.	
— Le front non trapézoïdiforme.....		30
30. La saillie prosternale très courte, non prolongée au delà des hanches en avant.....	13. <i>Crossotus</i> Serv.	
— La saillie prosternale prolongée un peu au delà des hanches en avant et toujours tronquée verticalement à son bord antérieur.....		31
31. La saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur, le pronotum pourvu de deux épines latérales à peu près de même longueur.....	24. <i>Hecyra</i> Thoms.	
— La saillie mésosternale tronquée obliquement à son bord antérieur, le pronotum pourvu d'une seule épine latérale (avant le milieu seulement un tubercule beaucoup moins proéminent).....	27. <i>Hecyromorpha</i> Breun.	
32. Le troisième article des antennes moins de deux fois plus long que le scape.....		33
— Le troisième article des antennes au moins deux fois aussi long que le scape.....		34
33. La saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur.....	28. <i>Pseudohecyra</i> Breun.	
— La saillie mésosternale tronquée obliquement à son bord antérieur.....	33. <i>Mæchohecyra</i> Breun.	
34. L'épine latérale du pronotum assez longue.....	26. <i>Parhecyra</i> Breun.	
— L'épine latérale du pronotum réduite à un petit tubercule.....	30. <i>Parabiobessa</i> Breun.	

B. — Tableaux de détermination des sous-genres et espèces.

Genre premier : *Epirochroa* Fairm.

- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 1. L'épine latérale du pronotum est petite. | <i>E. fasciolata</i> Fairm. | 2 |
| — L'épine latérale du pronotum est grande. | | |
| 2. Chaque élytre pourvu d'une crête longitudinale basilaire. | <i>E. acutecostata</i> Fairm. | 3 |
| — Chaque élytre pourvu d'un tubercule basilaire. | | |
| 3. Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux. | <i>E. griseovaria</i> Fairm. | |
| — Les joues beaucoup moins longues que les lobes inférieurs des yeux. | <i>E. cervinocincta</i> Fairm. | |

Genre 2 : *Geteuma* Thoms.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| Une seule espèce. | <i>G. quadridentata</i> Coqu. |
|------------------------|-------------------------------|

Genre 3 : *Epirochroides* Breun.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Une seule espèce. | <i>E. hovanus</i> Fairm. |
|------------------------|--------------------------|

Genre 4 : *Frea* Thoms.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. La saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. | B. Sous-Genre <i>Cyrtofrea</i> Auriv. | |
| — La saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur. | | 2 |
| 2. Les élytres sans crêtes ou tubercules. | A. Sous-Genre <i>Frea</i> Thoms. | |
| — Chaque élytre pourvu d'une crête ou d'un ou deux tubercules au tiers basilaire. | C. Sous-Genre <i>Crossotofrea</i> Hintz | |

A. Sous-Genre *Frea* Thoms. s. str.

- | | | |
|--|--------------------------------|----|
| 1. Les élytres entièrement couverts de poils érigés. | | 2 |
| — Les élytres sans poils érigés ou pourvus de tels poils au plus à la moitié basilaire. | | 3 |
| 2. L'épine latérale du pronotum petite. | <i>F. burgeoni</i> Breun. | |
| — L'épine latérale du pronotum grande. | <i>F. pilosa</i> Breun. | |
| 3. Toute la surface couverte de pubescence verte. | <i>F. mniszechi</i> Thoms. | |
| — La pubescence de la surface autrement colorée. | | 4 |
| 4. La pubescence de la surface de couleur blanchâtre ou grise ou olivâtre et ornée de dessins noirâtres ou grisâtres. | | 5 |
| — La pubescence de la surface autrement colorée. | | 14 |
| 5. L'épine latérale du pronotum très petite, émoussée. | <i>F. sparsa</i> Klug | |
| — L'épine latérale du pronotum grande ou pointue. | | 6 |
| 6. La moitié basilaire des élytres couverte de longs poils noirs érigés. | | 7 |
| — La moitié basilaire des élytres sans poils érigés. | | 8 |
| 7. L'épine latérale du pronotum très large, les élytres finement ponctués au tiers apical. | <i>F. maculicornis</i> Thoms. | |
| — L'épine latérale du pronotum peu large, les élytres assez grossièrement ponctués jusqu'au sommet. | | |
| 8. Chaque élytre orné d'une très large bande transversale noire au milieu. | <i>F. proxima</i> Breun. | |
| — Les élytres sans cette bande. | <i>F. nigrovittata</i> Breun. | |
| 9. L'épine latérale du pronotum fortement recourbée à son sommet. | | 9 |
| — L'épine latérale du pronotum non recourbée au sommet. | | 10 |
| 10. Le pronotum orné d'une large bande transversale blanche très nette. | | 12 |
| — Le pronotum sans cette bande. | <i>F. cincta</i> Jord. | |
| 11. La stature très élancée, les élytres non granulés à la base. | | 11 |
| — La stature large, les élytres granulés à la base. | <i>F. sparsilis</i> Jord. | |
| 12. L'épine latérale du pronotum large, émoussée, la stature large. | <i>F. senilis</i> White | |
| — L'épine latérale du pronotum mince, pointue, la stature élancée. | <i>F. albomarmorata</i> Breun. | |
| 13. Le disque du pronotum grossièrement ponctué. | | 13 |
| — Le disque du pronotum à peine ponctué. | <i>F. jaguarita</i> Chevrl. | |
| 14. Le métasternum couvert d'une dense pubescence blanche ou jaune clair différant de la couleur du reste du dessous. | <i>F. strandiella</i> Breun. | |
| — Le métasternum de la même couleur que le reste du dessous. | | 15 |
| 15. Le mésosternum et l'abdomen couverts de pubescence grise. | | 18 |
| — Le mésosternum également couvert d'une pubescence blanche ou jaune. | | 16 |
| 16. L'épine latérale du pronotum de longueur moyenne. | | 17 |
| — L'épine latérale du pronotum très petite. | <i>F. basalis</i> Jord. | |
| | <i>F. griseescens</i> Auriv. | |

17. L'épine latérale du pronotum très longue, recourbée au sommet.	<i>F. puncticollis</i> Jord.	
— L'épine latérale du pronotum droite.	<i>F. uniformis</i> Hintz	
18. Les élytres couverts d'une pubescence grise uniforme.	<i>F. unicolor</i> Breun.	
— Les élytres montrant toujours quelques dessins.		19
19. Les élytres couverts de pubescence grise et mouchetés de blanc.		20
— Les élytres autrement dessinés.		22
20. Tout le pronotum couvert de pubescence jaune d'ocre.	<i>F. flavicollis</i> Auriv.	
— La pubescence du pronotum de la même couleur que celle des élytres.		21
21. L'épine latérale du pronotum minime.	<i>F. floccifera</i> Qued.	
— L'épine latérale du pronotum très distincte.	<i>F. lævepunctata</i> Thoms.	
22. Les élytres couverts d'une pubescence grise variée de blanchâtre, et ornés d'une grande tache noire autour du calus huméral.		23
— Les élytres sans cette tache.		24
23. Sur chaque élytre, en outre, une tache ronde noire, près du bord latéral après le milieu.	<i>F. humeralis</i> Kolbe	
— Les élytres sans cette tache.	<i>F. circumscripta</i> Hintz	
24. Les élytres couverts d'une pubescence brune variée de gris, et ornés chacun de deux grandes taches blanches ou jaunes (en partie interrompues ou dilacérées), une à la base, l'autre au quart apical.		25
— Les élytres autrement dessinés.		27
25. Les élytres rudement granulés à la base, la deuxième tache claire située peu avant le sommet.	<i>F. marmorata</i> Gerst.	
— Les élytres à peine granulés à la base, la deuxième tache claire située au commencement du quart apical.		26
26. L'épine latérale du pronotum courte.	<i>F. flavoscapulata</i> Fairm.	
— L'épine latérale du pronotum très longue.	<i>F. marshalli</i> Breun.	
27. Chaque élytre pourvu au moins d'une large bande transversale jaune.		28
— Les élytres sans cette bande.		31
28. Le scape pourvu d'une fine crête longitudinale au côté extérieur.		29
— Le scape sans une telle crête.		30
29. Chaque élytre orné d'une seule bande transversale jaune, prémédiane.	<i>F. haroldi</i> Qued.	
— Chaque élytre orné de deux bandes pareilles, une prémédiane et une postmédiane.	<i>F. curta</i> Chevrl.	
30. La base des élytres couverte de poils érigés noirs; l'épine latérale du pronotum fortement recourbée.	<i>F. congoana</i> Breun.	
— La base des élytres sans poils érigés; l'épine latérale du pronotum droite.	<i>F. kinduensis</i> Breun.	
31. Chaque élytre orné d'une grande tache brun rougeâtre nette au commencement du tiers apical.	<i>F. castaneomaculata</i> Auriv.	
— Les élytres sans tache brune nette en cet endroit.		32
32. Les élytres parsemés de taches jaunes et ornés chacun d'une bande transversale noire juste avant le milieu.	<i>F. vermiculata</i> Kolbe	
— Les élytres sans cette bande.		33
33. Les élytres ornés de taches jaunes, dont quelques-unes assez grandes, très nettes.	<i>F. flavosparsa</i> Auriv.	
— Les élytres marbrés de gris et de jaunâtre ou pourvus de taches jaunes très petites.		34
34. Les sillons transversaux du pronotum peu profonds; les élytres convexes, uniformément parsemés de taches jaunâtres peu nettes, ou marbrés de jaunâtre.		35
— Les sillons transversaux du pronotum profonds; les élytres médiocrement convexes; les taches jaunes des élytres assez nettes.		36
35. L'épine latérale du pronotum un peu recourbée au bout.	<i>F. johannæ</i> Gah.	
— L'épine latérale du pronotum droite.	<i>F. brevicornis</i> Gah.	
36. La pubescence grise ne dépasse pas le milieu des élytres.	<i>F. nyassana</i> Auriv.	
— La pubescence grise dépasse beaucoup le milieu des élytres.	<i>F. zambesiana</i> Hintz	

B. Sous-Genre *Cyrtofrea* Auriv.

1. Le pronotum orné de bandes longitudinales claires.	<i>F. albolineata</i> Auriv.	
— Le pronotum sans bandes.		2
2. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que les joues.	<i>F. subcostata</i> Kolbe	
— Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues.	<i>F. flocciferoïdes</i> Breun.	

C. Sous-Genre *Crossotofrea* Hintz

1. La surface couverte de pubescence brun rougeâtre; chaque élytre orné d'une très large bande transversale claire après le milieu.	<i>F. unifasciata</i> Thoms.	
— Les élytres sans bande semblable.		2

2. Chaque élytre pourvu de deux petits tubercules (un basilaire et un postbasilaire, situés l'un après l'autre).... 3
 — Chaque élytre pourvu d'un seul tubercule basilaire ou d'une crête longitudinale à la base..... 5
 3. Les joues beaucoup moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; chaque élytre pourvu d'une bande prémédiane oblique blanchâtre..... *F. albovittata Breun.*
 — Les joues un peu moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; les élytres sans bande blanchâtre..... 4
 4. Les élytres pourvus de quelques lignes longitudinales un peu élevées ; leur surface marbrée de brun et de jaune...
 *F. virgata Qued.*
 — Les élytres sans lignes semblables ; leur surface brun rougeâtre varié d'un peu de gris et de jaune.....
 *F. annulata Chevrl.*
 5. Chaque élytre pourvu d'un seul tubercule basilaire..... 6
 — Chaque élytre pourvu d'une courte crête longitudinale à la base..... 12
 6. Le pronotum bombé, pourvu d'une épine latérale minime..... *F. flavovittata Breun.*
 — Le pronotum médiocrement convexe, pourvu d'une épine latérale assez grande..... 7
 7. Les élytres couverts en partie d'une pubescence grise..... 8
 — Les élytres couverts de pubescence brun rougeâtre varié de jaune..... 10
 8. La partie basilaire des élytres pourvue de poils érigés noirs ; l'épine latérale du pronotum très large..... 9
 — La partie basilaire des élytres sans poils érigés ; l'épine latérale du pronotum mince... *F. griseomaculata Breun.*
 9. Le pronotum orné d'étroites bandes longitudinales brunes..... *F. irrorata Jord.*
 — Le pronotum sans bandes semblables *F. olivacea Breun.*
 10. Les joues moitié plus longues que les lobes inférieurs des yeux..... *F. maculata Hintz*
 — Les joues un peu moins longues que les lobes inférieurs des yeux..... II
 11. L'épine latérale du pronotum recourbée au sommet *F. tuberculata Auriv.*
 — L'épine latérale du pronotum droite..... *F. flavomarmorata Breun.*
 12. L'épine latérale du pronotum petite..... 13
 — L'épine latérale du pronotum assez grande..... 15
 13. De chaque côté du milieu du pronotum, une bosse obtuse ; la stature en ovale allongé..... 14
 — Le pronotum sans bosses semblables ; la stature allongée, cylindrique *F. lundbladi Breun.*
 14. Les élytres pourvus de points très gros après l'épaule *F. barbartoni Dist.*
 — Les élytres finement ponctués même après les épaules..... *F. capensis Breun.*
 15. Les antennes densément frangées en dessous de poils longs..... *F. schoutedeni Breun.*
 — Les antennes éparsément ou non frangées en dessous..... 16
 16. La crête basilaire des élytres est très haute..... 17
 — La crête basilaire des élytres est peu haute..... 19
 17. La surface couverte de poils érigés *F. lata Breun.*
 — La surface sans poils érigés..... 18
 18. La crête élytrale s'étend jusqu'à l'extrême base ; la bande ondulée foncée au milieu des élytres n'atteint pas la suture
 *F. lineata Hintz*
 — La crête basilaire des élytres n'atteint pas l'extrême base ; la bande médiane foncée des élytres atteint la suture.....
 *F. edificatoria Hintz*
 19. L'épine latérale du pronotum non recourbée au sommet..... 20
 — L'épine latérale du pronotum recourbée au sommet..... 21
 20. Les élytres sans poils érigés..... *F. rosacea Breun.*
 — Les élytres densément pourvus de poils érigés *F. unipunctata Breun.*
 21. Le pronotum orné d'une large bande longitudinale brun foncé, élargie vers la base... *F. flava Breun.*
 — Le pronotum sans bande semblable..... 22
 22. Sur chaque élytre une ligne transversale brun foncé en zigzag ; pas de grillage de lignes ochracées sur les élytres..
 *F. ziczac Breun.*
 — Les élytres pourvus d'un grillage de lignes ochracées, sans ligne transversale foncée. *F. assimilis Breun.*
- Genre 5 : *Freopsis Hintz*
- Une seule espèce..... *F. leucostictica White.*
- Genre 6 : *Mimiculus Jord.*
- Une seule espèce..... *M. maculatus Jord.*
- Genre 7 : *Cincinnati Jord.*
1. Les élytres couverts plus ou moins d'une pubescence brun jaunâtre *C. fasciata Jord.*
 — Les élytres couverts d'une pubescence grise..... 2
 2. Le métasternum couvert d'une dense pubescence blanche ou jaune..... *C. konduensis Breun.*
 — Le métasternum couvert de la même pubescence grise que tout le dessous..... *C. schoutedeni Breun.*

Genre 8 : *Megalofrea Auriv.*

1. La saillie mésosternale légèrement inclinée vers son bord antérieur. *M. cinerascens* Fairm. 2
 — La saillie mésosternale tronquée verticalement au bord antérieur. 2
 2. Le pronotum et le quart basilaire des élytres densément réticulés de noirâtre et de jaunâtre ou blanchâtre. *M. ferricri* Fairm.
 — Ces parties non réticulées de cette manière. 3
 3. Les élytres densément couverts de très petites taches jaunâtres, ces taches parfois en partie confluentes. *M. bioculata* Fairm.
 — Les élytres ornés de plusieurs taches plus grandes et de bandes jaunes, surtout autour des fascicules de poils. *M. humeralis* Voll.

Genre 9 : *Leucographus Wat.*

1. La stature en ovale allongé ; les élytres sans tubercule proéminent. *L. albovarius* Wat. 2
 — La stature allongée ; chaque élytre pourvu après l'écusson d'un grand tubercule très proéminent. 2
 2. La bande postmédiane claire des élytres dentelée. *L. variegatus* Wat.
 — La bande postmédiane claire des élytres droite, non dentelée. *L. alluaudi* Fairm.

Genre 10 : *Dichostathes Thoms.*

1. Les côtés du pronotum arrondis. 2
 — Les côtés du pronotum anguleux ou pourvus d'une épine latérale. 9
 2. Les côtés du disque du pronotum fortement déprimés. *D. ugandæ* Breun. 3
 — Les côtés du disque du pronotum non déprimés. 3
 3. Les épaules fortement proéminentes latéralement en forme de tubercule. 4
 — Les épaules ne formant pas de tubercule latéral. 6
 4. Les élytres pourvus de fascicules de poils. *D. lobatus* Jord. 5
 — Les élytres sans fascicules de poils. 5
 5. Les élytres ornés de taches rouge foncé. *D. rubromaculatus* Breun.
 — Les élytres sans taches semblables. *D. hauseri* Hintz
 6. Chaque élytre pourvu d'une large bande claire un peu oblique entre le fascicule postbasilaire et le fascicule post-médian. 7
 — Les élytres sans bande semblable. 8
 7. Le troisième article des antennes un peu plus long que le quatrième. *D. nigroguttatus* Jord.
 — Le troisième article des antennes aussi long que le quatrième. *D. kuntzeni* Hintz
 8. Chaque élytre orné de nombreuses taches jaunes, dont une discale prémédiane et deux pareilles à la base. *D. flavoguttatus* Hintz
 — Les élytres sans taches claires ou avec des taches claires, mais alors, pas de tache discale prémédiane (trois en triangle au milieu, une prémédiane à la suture) *D. flavopictus* Qued.
 9. Les côtés du pronotum formant un angle obtus ou conique, parfois légèrement pointus. *D. quadripunctatus* Chevrl.
 — Les côtés du pronotum pourvus d'une épine latérale. 10
 10. Chaque élytre pourvu d'un grand fascicule postbasilaire rond de poils noirs. 11
 — Les élytres sans un tel fascicule. 12
 11. Les épaules arrondies ; le troisième article des antennes plus long que le quatrième. *D. quadrisignatus* Hintz
 — Les épaules proéminentes en forme de tubercule ; le troisième article des antennes moins long que le quatrième. *D. mülleri* Qued.
 12. Chaque élytre orné d'une tache discale ochracée juste avant le milieu. 13
 — Les élytres sans tache semblable. 14
 13. Les fascicules de poils sur les élytres peu hauts ; le disque du pronotum ponctué. *D. tabularis* Kolbe
 — Les fascicules de poils sur les élytres hauts ; le disque du pronotum ridé. *D. magnus* Auriv.
 14. Un fascicule de poils sur le calus huméral. 15
 — Pas de fascicule de poils sur le calus huméral. 18
 15. Chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils après le milieu. *D. corticarius* Hintz
 — Chaque élytre pourvu d'un seul fascicule après le milieu. 16
 16. Chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils à la base (un sur le calus huméral, un près de l'écusson et un autre entre ces deux) *D. ayresi* Dist.
 — Chaque élytre pourvu de deux fascicules de poils basilaire (un près de l'écusson, un sur le calus huméral). 17
 17. Le disque du pronotum ponctué. *D. trilineatus* Hintz
 — Le disque du pronotum non ponctué. *D. similis* Breun.

18. Chaque élytre pourvu de deux fascicules de poils à la base (un près de l'écusson, un à son côté extérieur)..... *D. strandi* Breun. 19
- Chaque élytre pourvu d'un seul fascicule de poils basilaires.....
19. L'épine latérale du pronotum assez mince ; les élytres pourvus de lignes longitudinales jaunes..... *D. concretus* Pasc.
- L'épine latérale du pronotum large ; les élytres sans lignes semblables..... *D. compactus* Fairm.

Genre II : *Corus* Pasc.

1. Chaque élytre pourvu de plus d'un fascicule à la moitié postérieure..... 2
- Chaque élytre pourvu d'un seul fascicule de poils à la moitié postérieure..... 15
2. Le disque du pronotum pourvu de chaque côté d'un haut tubercule..... 3
- Le disque du pronotum sans tubercule semblable..... 5
3. L'épine latérale du pronotum distincte..... *C. albopunctatus* Breun.
- L'épine latérale du pronotum très petite..... 4
4. Les antennes densément frangées en dessous ; les élytres sans taches blanches..... *C. mirabilis* Breun.
- Les antennes non densément frangées ; les élytres ornés de taches blanches..... *C. compactus* Hintz
5. Un fascicule de poils sur le calus huméral..... 6
- Pas de fascicule de poils sur le calus huméral..... 7
6. Le disque du pronotum éparsément ponctué..... *C. ignarius* Guér.
- Le disque du pronotum très densément ponctué..... *C. lacunosus* Fähr.
7. Le pronotum sans bande latérale longitudinale claire..... 8
- Le pronotum avec des bandes latérales longitudinales claires..... 9
8. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues..... *C. obscurus* Breun.
- Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que les joues..... *C. minusculus* Breun.
9. La bande latérale blanche du pronotum atteint le bord antérieur..... 10
- La bande latérale claire du pronotum n'atteint pas le bord antérieur..... 14
10. Les élytres couverts d'une pubescence foncée ; chacun pourvu de cinq fascicules de poils blancs.....
- Les élytres sans fascicules de poils blancs..... *C. parallelus* Breun. 11
11. Les joues aussi longues que les lobes inférieurs des yeux..... 12
- Les joues à peine moitié aussi longues que les lobes inférieurs des yeux..... 13
12. Le pronotum très transversal..... *C. latus* Breun.
- Le pronotum peu transversal..... *C. levepunctatus* Breun.
13. L'épine latérale du pronotum assez grande..... *C. pseudocaffer* Breun.
- L'épine latérale du pronotum très petite..... *C. caffer* Fähr.
14. Au côté intérieur de cette bande, une petite tache blanche ; les élytres sans tache blanche latérale plus grande.....
- Pas de tache pareille au pronotum ; sur chaque élytre, une grande tache blanche latérale postmédiane..... *C. leonensis* Breun.
15. Le scape très court et fort ; le pronotum couvert de pubescence verdâtre ; la tête et les élytres d'une pubescence jaune..... *C. collaris* Chevrl.
- Le scape de longueur médiocre, rarement court, mais alors la surface autrement colorée..... *C. fasciculosus* Auriv.
16. Le pronotum pourvu de chaque côté d'une bande longitudinale jaune ou blanchâtre..... 16
- Le pronotum sans bande semblable..... 17
17. Le disque du pronotum non ponctué..... 23
- Le disque du pronotum ponctué..... *C. laevadorsis* Kolbe
18. Toute la pubescence de couleur jaune blanchâtre..... 18
- La pubescence autrement colorée..... *C. luridus* Breun.
19. Les élytres ornés de bandes obliques plus claires..... 19
- Les élytres sans bandes obliques claires..... 20
20. Chaque élytre avec une bande oblique jaune blanchâtre, qui descend obliquement vers la suture..... 22
- Chaque élytre avec deux bandes pareilles (moins claires)..... *C. cretaceus* Chevrl.
21. Le pronotum finement ponctué..... 21
- Le pronotum grossièrement ponctué..... *C. pseudocostiger* Breun.
22. Les joues un peu moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; le disque du pronotum très grossièrement ponctué..... *C. costiger* Qued.
- Les joues beaucoup moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; le disque du pronotum densément et moins grossièrement ponctué..... *C. strandiellus* Breun.
23. Le disque du pronotum non ponctué..... *C. burgeoni* Breun.
- *C. flavus* Breun.

— Le disque du pronotum distinctement ponctué.....	24
24. Les joues un peu moins longues que les lobes inférieurs des yeux.....	25
— Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux.....	26
25. Le disque du pronotum éparsement et grossièrement ponctué.....	<i>C. lesnei Breun.</i>
— Le disque du pronotum densément et finement ponctué.....	<i>C. exiguus Breun.</i>
26. Les joues deux fois plus longues que les lobes inférieurs des yeux.....	<i>C. parvus Breun.</i>
— Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux.....	27
27. La tête et le pronotum éparsement ponctués.....	<i>C. nyassanus Breun.</i>
— La tête et le pronotum tres densément ponctués.....	<i>C. cylindricus Breun.</i>

Genre 12 : *Mimocorus Breun.*

Une seule espèce..... *M. quadricristatus Breun.*

Genre 13 : *Crossotus Serv.*

1. Chaque élytre pourvu de plus d'un fascicule de poils à la moitié postérieure.....	2
— Sur chaque élytre seulement un seul fascicule de poils à la moitié postérieure.....	6
2. Les joues beaucoup plus longues que les lobes inférieurs des yeux.....	<i>C. plurifasciculatus Breun.</i>
— Les joues moins longues que les lobes inférieurs des yeux.....	3
3. Sur chaque élytre une tache blanche latérale prémédiane.....	<i>C. albomaculatus Breun.</i>
— Les élytres sans tache semblable.....	4
4. Les fascicules de poils postmédians des élytres de couleur brun foncé.....	<i>C. molossus Duviv.</i>
— Les fascicules de poils postmédians des élytres de couleur rougeâtre.....	5
5. La stature grande (17 à 20 mm.) ; la tête grossièrement ponctuée.....	<i>C. strandi Breun.</i>
— La stature petite (11 mm.) ; la tête finement ponctuée.....	<i>C. sassensis Breun.</i>
6. Les trois premiers articles antennaires très densément frangée en dessous, les suivants à peine.....	<i>C. sahariensis Breun.</i>
— Les articles antennaires autrement frangés.....	7
7. La moitié apicale du troisième et du quatrième article antennaire frangée de longs poils d'une manière extrêmement dense.....	8
— Les antennes régulièrement frangées ou non frangées.....	9
8. La moitié apicale du cinquième article des antennes également frangée de cette manière.....	<i>C. plumicornis Serv.</i>
— La moitié apicale du cinquième article des antennes éparsement frangée.....	<i>C. bifasciatus Kolbe</i>
9. L'épine latérale du pronotum très courte.....	10
— L'épine latérale du pronotum jamais très courte.....	11
10. Les antennes non frangées en dessous.....	<i>C. schoutedeni Breun.</i>
— Les antennes densément frangées en dessous.....	<i>C. inermis Breun.</i>
11. Les élytres couverts d'une pubescence rougeâtre, ornés de bandes obliques plus claires.....	12
— Les élytres autrement colorés.....	13
12. Une étroite bande longitudinale blanche sur les joues et les parties latérales du pronotum.....	<i>C. genalis Auriv.</i>
— Pas de bande blanche semblable.....	<i>C. capucinus Gerst.</i>
13. Les joues plus longues que les lobes inférieurs des yeux.....	14
— Les joues aussi longues ou moins longues que les lobes inférieurs des yeux.....	20
14. Un fascicule de poils sur les épaules ; la partie basilaire des élytres couverte de pubescence brune, le reste d'une pubescence gris clair avec des bandes irrégulières jaunes.....	<i>C. stypticus Pasc.</i>
— Pas de fascicule de poils au calus huméral.....	15
15. Les points des élytres très gros, en partie alignés, séparés par des intervalles longitudinaux distinctement élevés.....	<i>C. barbatus Gerst.</i>
— Les points des élytres non très gros, non séparés par des intervalles élevés.....	16
16. L'épine latérale du pronotum courte ; les élytres ornés de lignes longitudinales jaunâtres.....	17
— L'épine latérale du pronotum assez longue ; les élytres sans lignes semblables.....	18
17. L'épine latérale du pronotum pointue ; la stature très allongée.....	<i>C. marshalli Breun.</i>
— L'épine latérale du pronotum large, obtuse ; la stature en ovale allongé.....	<i>C. ugandæ Breun.</i>
18. Les fascicules de poils des élytres sont noirs, le postmédian est minime.....	<i>C. æthiops Dist.</i>
— Les fascicules de poils des élytres sont bruns ou ochracés, le postmédian est assez grand.....	19
19. De chaque côté du pronotum une large bande longitudinale blanche, ou presque tout le pronotum blanc ; le métasternum couvert de pubescence blanche.....	<i>C. argenteus Hintz</i>
— Le pronotum sans bandes semblables, le métasternum sans pubescence blanche.....	<i>C. stigmaticus Fahr.</i>

20. Les joues aussi longues que les lobes inférieurs des yeux.....	21
— Les joues moins longues que les lobes inférieurs des yeux.....	22
21. La stature très allongée.....	<i>C. nebulosus</i> Fairm.
— La stature trapue.....	<i>C. flavolineatus</i> Breun.
22. Les élytres légèrement échancrés au sommet.....	<i>C. strigifrons</i> Fairm.
— Les élytres non échancrés au sommet.....	23
23. Une large bande longitudinale claire au milieu du pronotum.....	<i>C. tubericollis</i> Fairm.
— Pas de bande semblable.....	24
24. Les élytres ornés de lignes longitudinales discales jaunes.....	25
— Les élytres sans lignes semblables.....	27
25. La saillie mésosternale inclinée à son bord antérieur ; longueur : plus de 13 mm.....	26
— La saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur ; longueur : moins de 13 mm.....	<i>C. erlangeri</i> Hintz
26. Le scape densément marbré de brun et de blanc.....	<i>C. subocellatus</i> Fairm.
— Le scape couvert d'une pubescence blanche uniforme.....	<i>C. sublineatus</i> Gestro
27. Sur chaque élytre trois fascicules de poils minimes noirâtres.....	<i>C. frœoides</i> Breun.
— Les élytres pourvus de fascicules de poils assez grands.....	28
28. Le fascicule postbasilaire formé par une courte crête longitudinale.....	<i>C. brunneopictus</i> Fairm.
— Le fascicule postbasilaire des élytres court, non formé par une crête.....	29
29. Les élytres densément granulés au tiers basilaire.....	<i>C. lateralis</i> Hintz
— Les élytres à peine granulés au tiers basilaire.....	30
30. Sur chaque élytre, une assez grande tache blanchâtre avant le fascicule postmédian.....	<i>C. vagepictus</i> Fairm.
— Les élytres sans tache semblable.....	31
31. La saillie mésosternale inclinée à son bord antérieur.....	<i>C. arabicus</i> Gah.
— La saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur.....	32
32. Les parties latérales du disque du pronotum et la partie médiane des élytres couvertes de pubescence blanche plus dense.....	<i>C. albicollis</i> Guér.
— Ces parties sans pubescence plus dense.....	<i>C. klugi</i> Dist.

Genre 14 : *Phanis* Fairm.

Une seule espèce..... *P. armicollis* Fairm.

Genre 15 : *Gasponia* Fairm.

1. Les joues beaucoup moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; le front à peine ponctué.....	<i>G. gaurani</i> Fairm.
— Les joues un peu moins longues que les lobes inférieurs des yeux ; le front assez densément ponctué.....	<i>G. fascicularis</i> Fairm.

Genre 16 : *Tambusa* Dist.

Une seule espèce..... *T. marleyi* Dist.

Genre 17 : *Hecyroides* Breun.

Une seule espèce..... *H. lateriplagiatus* Breun.

Genre 18 : *Mimoranova* Breun.

Une seule espèce..... *M. bifuscomaculata* Breun.

Genre 19 : *Ecyroschema* Thoms.

1. Les tubercules antennifères séparés seulement par une étroite fissure.....	<i>E. rugatum</i> Pasc.
— Les tubercules antennifères très élevés, mais séparés par un espace plus large.....	2
2. Les élytres pourvus de plusieurs hauts tubercules.....	<i>E. multituberculatum</i> Breun.
— Les élytres sans tubercules.....	<i>E. favosum</i> Thoms.

Genre 20 : *Stheniopygus* Breun.

Une seule espèce..... *S. medioalbus* Breun.

Genre 21 : *Plectropygus* Gah.

Une seule espèce..... *L. mucoreus* Gah.

Genre 22 : *Mycerinus* Thoms.

1. Le métasternum un peu raccourci, moins de moitié plus large que long..... 2
 — Le métasternum très raccourci, plus de moitié plus large que long..... 3
 2. Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues ; les élytres couverts d'une pubescence blanchâtre uniforme..... *M. dorcadioides* Serv.
 — Les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues ; le bord latéral des élytres couvert d'une pubescence blanchâtre, plus claire que le reste..... *M. subcostatus* Kolbe
 3. Les élytres non ponctués..... *M. brevis* Auriv.
 — Les élytres distinctement ponctués..... 4
 4. Chaque élytre orné de cinq bandes longitudinales ochracées..... *M. multilincatus* Breun.
 — Chaque élytre orné (à part la suture) de trois bandes longitudinales jaunes ou rosâtres ou blanchâtres..... 5
 5. L'abdomen non ponctué..... *M. limbatus* Kolbe
 — L'abdomen distinctement ponctué..... *M. punctiventris* Kolbe

Genre 23 : *Niphecyra* Kolbe

1. Tout le disque du pronotum densément et grossièrement ponctué..... *N. rufolineata* Qued.
 — Le disque du pronotum éparsément ponctué..... 2
 2. Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues..... *N. interpres* Kolbe
 — Les lobes inférieurs des yeux à peine plus longs que les joues..... *N. uniformis* Breun.

Genre 24 : *Hecyra* Thoms.

1. La pubescence du pronotum claire, gris blanchâtre varié de brun rougeâtre, et ornée d'une tache quadrangulaire brun foncé..... *H. graueri* Hintz
 — Le pronotum sans dessins semblables..... 2
 2. Les lobes inférieurs des yeux moins longs que les joues..... *H. terrea* Bert.
 — Les lobes inférieurs des yeux plus longs que les joues..... 3
 3. Les élytres sans lignes longitudinales rougeâtres..... *H. obscurator* F.
 — Les élytres avec des lignes semblables..... 4
 4. Les élytres très finement ponctués..... *H. pallida* Breun.
 — Les élytres assez grossièrement ponctués..... *H. tenebrioides* Fähr.

Genre 25 : *Neohecyra* Breun.

Une seule espèce..... *N. compacta* Breun.

Genre 26 : *Parhecyra* Breun.

Une seule espèce..... *P. costata* Auriv.

Genre 27 : *Hecyromorpha* Breun.

Une seule espèce..... *H. plagicollis* Gah.

Genre 28 : *Pseudohecyra* Breun.

Une seule espèce..... *P. lutulenta* Gestro

Genre 29 : *Biobessa* Gah.

Une seule espèce..... *B. beatrix* Gah.

Genre 30 : *Parabiobessa* Breun.

Une seule espèce..... *P. ugandæ* Breun.

Genre 31 : *Falsobiobessa* Breun.

Une seule espèce..... *F. fasciculosa* Breun.

Genre 32 : *Mœchotypa* Thoms.

1. Les élytres pourvus de fascicules de poils au quart basilaire..... 2
 — Les élytres sans fascicules de poils..... 16
2. De chaque côté du milieu de chaque segment abdominal, une grande tache rosâtre ou blanchâtre très nette, sur fond noir..... *M. diphysis* Pasc. 3
 — L'abdomen sans tache semblable..... 4
3. Les élytres couverts d'une réticulation jaunâtre ou blanchâtre nette..... 4
 — Les élytres sans réticulation semblable..... 5
4. Cette réticulation couvrant toute leur étendue, sauf la partie basilaire..... *M. semenovi* Heyr. 6
 — Cette réticulation réduite à trois bandes transversales (une prémédiane, une postmédiane, une apicale)..... *M. alboannulata* Pic 11
5. Les lobes inférieurs des yeux au moins un peu moins longs que les joues..... 6
 — Les lobes inférieurs des yeux aussi longs ou plus longs que les joues..... 11
6. Chaque élytre orné de trois lignes longitudinales rosâtres nettes, sur fond blanchâtre, donc très apparentes..... *M. suffusa* Pasc. 7
 — Ces lignes vaguement indiquées ou manquantes..... 7
7. Les tubercules discaux du pronotum très élevés, coniques..... *M. thoracica* White 8
 — Les tubercules discaux du pronotum peu élevés, arrondis..... 8
8. Les tubercules antennifères très peu élevés..... 9
 — Les tubercules antennifères assez élevés..... 10
9. Sur chaque élytre, trois petits fascicules de poils..... *M. strandi* Breun. 10
 — Sur chaque élytre, trois crêtes longitudinales, qui sont densément couvertes de poils. *M. attenuata* Pic 10
10. Les tubercules antennifères médiocrement élevés; le disque du pronotum éparsement ponctué..... *M. umbrosa* Lac. 10
 — Les tubercules antennifères très élevés; le disque du pronotum densément et grossièrement fossulé..... *M. jeanvoinei* Pic 10
11. Les lobes inférieurs des yeux trois fois plus longs que les joues; le front trapézoïdiforme..... *M. coomani* Pic 10
 — Les lobes inférieurs des yeux moins de trois fois plus longs que les joues; le front quadrangulaire..... 12
12. Les lobes inférieurs des yeux deux fois aussi longs que les joues, ou presque..... 13
 — Les lobes inférieurs des yeux au plus moitié plus longs que les joues..... 14
13. Les tubercules discaux du pronotum très élevés..... *M. asiatica* Pic 14
 — Les tubercules discaux du pronotum peu élevés..... *M. uniformis* Pic 14
14. Un haut tubercule de chaque côté du milieu du disque du pronotum..... 15
 — Pas de tubercule semblable..... *M. trifasciculata* Breun. 15
 — Le front densément et grossièrement ponctué..... *M. sikkimensis* Breun. 15
 — Le front non ponctué..... *M. ceylonica* Breun. 15
16. Toute la surface des élytres densément parsemée de taches brunes nettes..... *M. javana* Schwarz. 17
 — La partie médiane des élytres couverte d'une pubescence gris blanchâtre, ornée seulement de quelques taches sombres isolées nettes..... 17
17. La partie médiane des élytres couverte de pubescence blanche, presque sans taches foncées (sauf le long de la suture et du bord latéral et avec deux taches au milieu), cette partie contrastant fortement avec le quart apical sombre..... *M. adusta* Pasc. 17
 — La partie médiane des élytres également parsemée de taches brunes vagues, cette partie ne contrastant pas avec le quart apical..... 18
18. Les lobes inférieurs des yeux à peine moins longs que les joues..... *M. marmorea* Pasc. 18
 — Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues..... 19
19. Les côtés du disque du pronotum grossièrement ponctués..... *M. delicatula* White 19
 — Les côtés du disque du pronotum finement ponctués..... 20
20. Le front très finement ponctué; les élytres sans lignes longitudinales élevées à la moitié postérieure..... *M. formosana* Pic 20
 — Le front peu finement ponctué, les élytres parsemés de plusieurs lignes longitudinales un peu élevées à la moitié postérieure..... *M. assamensis* Breun. 20

Genre 33 : *Mœchohecyra* Breun.

1. Les élytres pourvus de longs poils érigés..... *M. indica* Breun.
 — Les élytres sans poils érigés..... *M. verrucocillis* Gah.

Genre 34 : *Paramœchotypa* Breun.

- Une seule espèce..... *P. fasciculata* Breun.

Genre premier : **Epirochroa** *Fairm.*

Epirochroa Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 385.

Stature en ovale allongé. Les antennes assez fines, un peu moins longues que le corps (♀♀) ou un peu plus longues que le corps (♂♂), densément frangées en dessous ; le scape médiocrement long, légèrement claviforme ; le troisième article à peine plus long que le scape, à peu près de la longueur du quatrième ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux finement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux.

Le pronotum deux fois aussi large que long (ou presque), pourvu d'une grande épine latérale au milieu du pronotum, de deux tubercules discaux, de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs, dont le premier antérieur est effacé sur le disque, tandis que le deuxième antérieur et le premier postérieur sont très sinués.

Les élytres allongés, médiocrement convexes, rétrécis légèrement dès les épaules, arrondis au sommet et pourvus d'une bosse postbasilaire ; les épaules assez proéminentes, mais arrondies.

La tête rétractile.

La saillie prosternale large, un peu moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale très large, légèrement inclinée vers son bord antérieur. Les jambes de longueur moyenne ou assez longues ; les cuisses très claviformes ; les postérieures presque pédonculées.

Toute la surface assez densément et finement ponctuée.

Type : *griseovaria Fairm.* Quatre espèces de Madagascar.

1. *griseovaria Fairm.*

Epirochroa griseovaria Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 385.

Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux. Les deux tubercules discaux du pronotum sont peu élevés et obtus ; l'épine latérale du pronotum très grande, un peu courbée en arrière à son sommet. Chaque élytre pourvu d'une bosse postbasilaire discale obtuse et de trois crêtes un peu élevées, qui s'étendent du bord latéral obliquement vers le disque (une prémédiane, une postmédiane et une préapicale).

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence gris blanchâtre variée de jaune d'ocre ; le vertex, une ou deux taches au milieu du pronotum et, sur chaque élytre, le tubercule postbasilaire ainsi que des bandes étroites au bord postérieur des crêtes obliques, d'une pubescence brun foncé. Le dessous du corps, d'une pubescence grise. Les jambes de même, tachetées de blanc ; la partie apicale des tibias et les troisième et quatrième articles des tarsi, d'une pubescence brun foncé. Les antennes, d'une pubescence brune ; les deux premiers articles tachetés de blanc, la moitié basilaire des articles suivants avec une pubescence blanche.

Longueur : 9 à 10 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 5 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Antsianaka.

Localités : Madagascar : Antsianaka, Tananarive (Muséum de Paris).

2. *cervinocincta Fairm.*

Epirochroa cervinocincta Fairm. 1899. Ann. Soc. ent. Belg. XLIII, p. 551.

Les joues beaucoup moins longues que les lobes inférieurs des yeux. L'épine latérale du pronotum très grande, courbée un peu en arrière au bout ; les tubercules discaux du pronotum assez élevés. Sur chaque élytre, un petit tubercule postbasilaire assez élevé ; pas de crêtes obliques.

Noir, marbré de jaune rougeâtre et de gris lilas, et orné des dessins brun foncé suivants : l'espace entre les tubercules antennifères, le vertex, les tubercules discaux du pronotum, de chaque côté une bande longitudinale après les épines latérales et, sur chaque élytre, le tubercule postbasilaire, trois bandes transversales dentelées (une médiane, une post-médiane et une préapicale) ainsi que plusieurs petites taches. Le dessous couvert d'une pubescence grise ; les jambes de même, tachetées de jaune rougeâtre ; la partie apicale des tibias, le troisième et le quatrième article des tarsi couverts d'une pubescence brun foncé. Les antennes de même ; la base des articles, à partir du troisième, couverte d'une pubescence gris clair.

Longueur : 8 à 13 millimètres. Largeur 3 mm. 1/2 à 5 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Antsianaka.

Localités : Madagascar : Antsianaka, Tananarive (Muséum de Paris).

3. *acutecostata Fairm.*

Epirochroa acutecostata Fairm. 1899. Ann. Soc. ent. Belg. XLIII, p. 551.

Les joues distinctement plus courtes que les lobes inférieurs des yeux. Les épines latérales du pronotum de grandeur moyenne, pointues, non courbées en arrière ; les tubercules discaux du pronotum élevés. Sur chaque élytre, une haute crête longitudinale postbasilaire, qui s'étend jusqu'à la base, et plusieurs lignes un peu élevées à la moitié postérieure.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence gris blanchâtre, marbré de brun. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris blanchâtre ; la partie apicale des tibias brun foncé ; les antennes couvertes de pubescence brun rougeâtre, la partie basilaire des articles d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 9 à 12 millimètres. Largeur : 4 mm. à 5 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Antsianaka et Tananarive.

Localités : Madagascar : Antsianaka, Tananarive, Port-Dauphin (Muséum de Paris).

4. *fasciolata* Fairm.

Epirochroa fasciolata Fairm. 1899. Ann. Soc. ent. Fr. LXVIII, p. 503.

Proche d'*acutecostata* Fairm., mais s'en distinguant ainsi : L'épine latérale du pronotum plus petite, les tubercules discaux du pronotum moins hauts, plus obtus, la crête postbasilaire des élytres plus émoussée.

Brun rougeâtre ; la tête et le pronotum couverts d'une pubescence grise ; au milieu du pronotum, une large bande longitudinale brun foncé ; ses côtés couverts de pubescence gris blanchâtre, les élytres d'une pubescence brune et ornés d'une étroite bande transversale droite gris blanchâtre au commencement du tiers apical.

Longueur : 11 millimètres. Largeur 5 mm. 1/2.

Localité : Madagascar, Baie d'Antongil (FAIRMAIRE, Muséum de Paris).

Genre 2 : *Geteuma* Thoms.

Geteuma Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 65.

Geteuma Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 505, 509.

Stature en ovale allongé. Les antennes fines, un peu moins longues que le corps (♀♀) ou un peu plus longues que le corps (♂♂), non frangées en dessous ; le scape long, claviforme ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre et peu élevés. Les yeux finement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux.

Le pronotum transversal, inerme aux côtés, pourvu de chaque côté du milieu d'un très haut tubercule conique ; son bord antérieur relevé ; les sillons transversaux postérieurs assez distincts, les antérieurs peu distincts.

Les élytres allongés, peu convexes, arrondis au sommet, légèrement rétrécis dès les épaules, où ils sont beaucoup plus larges que le pronotum et pourvus d'une courte crête longitudinale très haute et tranchante de chaque côté de l'écusson.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très large, un peu moins haute que les hanches, régulièrement arrondie ; la saillie mésosternale très large, un peu moins haute que les hanches, légèrement inclinée vers son bord antérieur. Les jambes de longueur moyenne ; les cuisses très claviformes ; les postérieures presque pédonculées.

Type : *quadridentata* Coqu. Une seule espèce de Madagascar.

1. *quadridentata* Coqu.

Phymasterna quadridentata Coqu. 1851. Rev. Zool. (2) VIII, p. 89 ; 1852. Ann. Soc. ent. Fr. (2) X, p. 398.

Geteuma quadridentata Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 66.

Geteuma quadridentata Fairm. 1871. Ann. Soc. ent. Fr. (5), I, p. 64.

Geteuma quadridentata Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 510.

Les lobes inférieurs des yeux plus de deux fois plus longs que les joues ; la tête éparsement et finement ponctuée ; écusson triangulaire, arrondi ; les élytres finement ponctués, les points très fins vers le sommet.

Brun, entièrement couvert d'une pubescence brun rougeâtre mate ; une bande étroite blanchâtre sur le front et l'occiput, une autre longitudinale au milieu du pronotum ; les côtés du pronotum ainsi que les élytres ornés d'un réseau à grandes mailles d'étroites lignes blanches ; des bandes pareilles aussi sur les cuisses.

Longueur : 8 mm. 1/2 à 9 millimètres. Largeur : 4 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par COQUEREL sur des individus de Madagascar.

Localité : Madagascar, Baie d'Antongil (Muséum de Paris).

Genre 3 : *Epirochroides* nov.

Stature en ovale allongé. Les antennes fines, aussi longues que le corps (♂♂) ou distinctement moins longues que le corps (♀♀) ; le scape court, assez fort ; le troisième article aussi long que le quatrième ou que le scape. Les yeux finement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs plus longs que larges. Les tubercules antennifères distants l'un de l'autre et peu élevés.

Le pronotum transversal, convexe, pourvu d'une longue épine droite pointue au milieu du bord latéral, d'une bosse obtuse de chaque côté du milieu du disque, de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs.

Les élytres allongés, convexes, distinctement plus larges que le pronotum, arrondis au sommet ; sur chaque élytre deux petits fascicules de poils postbasilaires.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale inclinée à son bord antérieur. Les jambes de longueur moyenne ; les cuisses très claviformes ; les postérieures pédonculées.

Toute la surface couverte de courts poils noirs érigés.

Type : *hovanus* Fairm. Une seule espèce de Madagascar, rangée jusqu'à présent dans le genre *Crossotus* Serv.

1. *hovanus* Fairm.

Crossotus hovanus Fairm. 1904. Ann. Soc. ent. Belg. XLVIII, p. 257.

Les lobes inférieurs des yeux deux fois aussi longs que les joues. Toute la tête éparsement, mais assez grossièrement ponctuée. Le pronotum et les élytres densément et peu finement ponctués, les points un peu plus fins vers le sommet des élytres ; sur chaque élytre, un fascicule longitudinal de poils roux sur le disque et un deuxième pareil tout petit à son bord latéral.

Rouge, couvert d'une très fine pubescence grise ; une très large bande longitudinale blanche de chaque côté du disque du pronotum, s'étendant de la bosse discale jusqu'un peu au delà de l'épine latérale ; à la moitié postérieure du pronotum, une très étroite bande longitudinale médiane blanche qui se prolonge jusqu'au sommet de l'écusson. Chaque élytre orné d'une tache longitudinale basilaire blanche au côté interne du calus huméral (en continuation de la large bande longitudinale du pronotum), et d'une large bande transversale postmédiane blanche, fortement ondulée (formée plutôt de deux étroites bandes pareilles parallèles). Le dessous, les jambes et les antennes couverts de pubescence brun rougeâtre foncé, les cuisses, les tibias et le scape tachetés de blanc. La partie basilaire des articles antennaires couverte, à partir du troisième, d'une pubescence blanche.

Longueur : 8 mm. 1/2 à 9 millimètres. Largeur : 4 millimètres.

Localité : Madagascar, région d'Androy, Ambowombé (FAIRMAIRE, Muséum de Paris).

Genre 4 : *Frea* Thoms.

Frea Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 174.

Eumimetes Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 505, 506.

Cyrtofrea Auriv. 1910. Ark. f. Zool. VII/3, p. 36.

Crossotofrea + *Mimofrea* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192 et 198 à 200.

Stature plus ou moins allongée. Les antennes plus ou moins fines, ne dépassant pas le milieu des élytres, ou jusqu'à plus de moitié plus longues que le corps, frangées en dessous ou non ; le scape assez long ; le troisième article aussi long que le quatrième ou plus long (très rarement un peu plus court), distinctement plus long que le scape ; les articles suivants parfois pourvus de petites fossettes latérales très peu profondes ; les tubercules antennifères le plus souvent distants l'un de l'autre et peu élevés. Les yeux assez finement facettés, subdivisés (ou presque).

Le pronotum large, pourvu d'une épine latérale, rapprochée de la base, rarement très petite, et de deux sillons transversaux près du bord antérieur et du bord postérieur ; l'écusson très large et court.

Les élytres plus ou moins allongés, médiocrement convexes, arrondis au sommet, le plus souvent légèrement rétrécis dès les épaules, pourvus parfois de tubercules ou crêtes au tiers basilaire.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très courte, de la hauteur des hanches, rarement un peu moins haute, arrondie ou légèrement tronquée à ses bords ; la saillie mésosternale médiocrement large, moins large que longue, tronquée à son bord antérieur ou plus rarement inclinée. Les jambes de longueur médiocre.

Type : *maculicornis* Thoms. Soixante-trois espèces de l'Afrique et de quelques îles adjacentes, qui se répartissent en trois sous-genres.

Eumimetes Lacord. et *Mimofrea* Hintz sont à considérer comme des synonymes ; *Crossotofrea* Hintz et *Cyrtofrea* Auriv. peuvent être considérés comme des sous-genres.

AURIVILLIUS cite, dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING, quarante-deux espèces de *Frea*, deux espèces de *Cyrtofrea* et huit espèces de *Crossotofrea*. Sept espèces sont à exclure du genre : *fasciculosa* Auriv. se rangeant dans le genre *Corus* Pasc., *irrorata* Jord., *tropica* Duviv. et *latefasciata* Hintz dans le genre *Gnathania* Thoms. (tribu des *Cero-plesini*), *Crossotofrea molossus* Duviv. dans le genre *Crossotus* Serv., *leucostictica* White dans le genre *Freopsis* Hintz, et *corticaria* Hintz dans le genre *Dichostathes* Thoms. En outre, *attenuata* Jord. se range comme synonyme de *floccifera* Qued., *aureocincta* Auriv. et *frater* Lam. comme synonymes de *curta* Chevrl., *grisea* Jord. comme synonyme de *lavepunctata* Thoms., *lineata* Auriv. comme synonyme de *flavoscapulata* Fairm., *malachitica* Jord. comme synonyme de *mniszehi* Thoms. et *valdepunctata* Thoms. comme synonyme de *jaguarita* Chevrl., *fulvovestita* Fairm. se range comme morpha de

johannæ Gah., *gabonica* Thoms. comme synonyme d'*annulata* Chevrl.; et *trilineata* Hintz comme synonyme d'*unifasciata* Thoms.

Par contre, *flavoscapulata* Fairm. doit être considéré comme espèce à part (et non comme aberration de *marmorata* Gerst.) et *unifasciata* Thoms., rangé dans le catalogue dans le genre *Crossotus* Serv., ainsi qu'*annulata* Chevrl., rangé dans le genre *Dichostathes* Thoms., viennent se ranger dans le genre actuel.

J'ai décrit depuis vingt-deux espèces et j'en ajoute encore trois ici.

A. Sous-Genre **Frea** Thoms. s. str.

Frea Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 174; 1860. Ess. Class. Cer., p. 34, 38; 1864. Syst. Cer., p. 373.

Frea + *Eumimetes* Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 505, 506.

Eumimetes Auriv. 1903. Ent. Tijdskr. XXIV, p. 217.

Mimofrea + *Frea* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192, 199.

Les yeux presque subdivisés; les élytres sans crête ou tubercule au tiers basilaire; la saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur; la saillie prosternale de la hauteur des hanches.

Type: *maculicornis* Thoms. Trente-sept espèces.

1. *maculicornis* Thoms.

Frea maculicornis Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 174, pl. VIII, fig. 1.

Eumimetes maculicornis Aulm. 1911. Fna. deutsch. Kol. V/2, p. 46, fig. 28.

ab. *fuscomaculata* Qued.

Frea maculicornis var. *fuscomaculata* Qued. 1882. Berl. ent. Zs. XXVI, p. 356.

m. *nigrofasciata* nov.

m. *hintzi* Plav.

Frea maculicornis var. *hintzi* Plav. 1927. Encycl. ent. Sér. B, I, Col. II, p. 58.

Frea fasciata Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 201.

Stature en ovale allongé, large. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀), ou aussi longues ou même un peu plus longues que le corps (♂); le troisième et le quatrième article frangés en dessous; le scape médiocrement long; le troisième article un peu plus long que le quatrième; les tubercules antennifères peu élevés. Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux, qui sont transversaux. Le front et les joues finement ponctués. Le pronotum très large, pourvu d'une grande et très large épine latérale rapprochée de la base, courbée en arrière à son bout; les sillons transversaux peu profonds; les côtés du disque assez grossièrement ponctués; l'écusson presque deux fois plus large que long. Les élytres allongés, rétrécis dès les épaules, densément et très grossièrement ponctués à la moitié antérieure, finement à la moitié postérieure; les côtés du disque du pronotum et la moitié basilaire des élytres couverts de longs poils noirs érigés.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre ou gris bleuâtre clair, et densément et irrégulièrement tacheté de noir: la plupart de ces taches sont petites. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre; de chaque côté des sterna et des segments abdominaux une tache noire. Les jambes également tachetées de noir. Les antennes couvertes de pubescence noire, la partie basilaire des articles de pubescence blanchâtre.

Longueur: 12 à 18 mm. Largeur: 5 mm. 1/2 à 8 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par THOMSON sur des individus du Gabon.

ab. *fuscomaculata* Qued.

La pubescence grise est plus étendue; les taches sont de couleur brune (au lieu de noire), et moins distinctes.

m. *nigrofasciata* nov.

Les taches noires des élytres confluent en une bande transversale médiane irrégulière, ondulée.

Type: un ♂ du Congo belge: Kiniato-Zobé, au Musée de Tervueren.

m. *hintzi* Plav.

Comme m. *nigrofasciata mihi*, mais la bande transversale médiane noire des élytres est droite, de même largeur sur toute son étendue; les taches noires à la base et au commencement du quart apical des élytres confluent aussi en bandes transversales plus ou moins régulières; avant et après la bande médiane, se trouve une large bande blanchâtre dépourvue ou presque (sauf le long de la suture) de taches noires.

Cette forme fut décrite par HINTZ sous le nom de *fasciata*. PLAVILTSCHIKOV changea plus tard en *hintzi* ce nom, déjà préoccupé dans le genre *Frea*.

Localités : Cameroun (AURIVILLIUS) ; île Saint-Thomé (AULMANN) ; Gabon : Libreville ; Congo belge : dans toutes les parties centrales et boréales du pays (Musée de Tervueren) ; Angola : Loanda (JORDAN) ; Colonie du Kénia : Naïrobi (Imperial Bureau of Entomology).

AULMANN cite cette espèce comme nuisible aux plantations de café.

2. *proxima* Breun.

Frea proxima Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 217.

Proche de *maculicornis* Thoms., mais s'en distinguant comme suit : La stature plus courte, les joues beaucoup plus longues que les lobes inférieurs des yeux ; l'épine latérale du pronotum beaucoup moins large ; l'écusson plus de deux fois plus large que long ; les élytres moins allongés, les points un peu moins gros à la moitié antérieure, plus gros au contraire à la moitié postérieure ; toute la pubescence plutôt gris bleuâtre, les taches noires sur les élytres moins nombreuses (situées surtout au quart apical et en forme de bande médiane transversale) ; les antennes couvertes de pubescence noire, le bout apical et le quart basilaire des articles de pubescence blanchâtre.

Longueur : 14 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Décrit par moi sur un individu d'Eala.

Localités : Sierra Leone : N'tala (Imperial Bureau of Entomology) ; Congo belge : Eala (Musée de Tervueren).

3. *pilosa* Breun.

Frea pilosa Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 218.

Stature en ovale allongé, très large. Les antennes distinctement moins longues que le corps (♂) ou dépassant peu le milieu des élytres (♀) ; le scape assez long ; les tubercules antennifères plats. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Le front, les joues et la partie antérieure du vertex densément et finement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale recourbée et de deux sillons transversaux postérieurs assez profonds ; le disque peu densément et très finement ponctué ; l'écusson très large, trapézoïdal. Les élytres allongés, légèrement rétrécis dès les épaules, largement arrondis au sommet, densément et très finement ponctués sur toute leur étendue ; les épaules un peu proéminentes. Toute la surface couverte de poils noirs érigés.

Noir, couvert d'une pubescence gris blanchâtre ; les points sur le disque du pronotum entourés en partie d'un petit cercle brun ; sur la ligne médiane du pronotum deux taches brunes plus grandes, triangulaires (l'une après le deuxième sillon transversal antérieur, l'autre avant le sillon transversal postérieur) et parfois deux autres pareilles de chaque côté du disque. Le tiers apical du troisième et du quatrième article des antennes, la moitié apicale du cinquième article et les suivants (sauf à la base) couverts d'une pubescence brune.

Longueur : 16 à 19 millimètres. Largeur : 7 à 8 millimètres.

Décrit par moi sur des individus du Cameroun (Musée de Dresde).

4. *nigrovittata* Breun.

Frea (Frea) nigrovittata Breun. 1935. Fol. Zool. et Hydrob. VII, p. 160.

Très proche de *maculicornis* Thoms. m. *hintzi* Plav. (avec laquelle il fut toujours confondu) mais s'en distinguant comme suit : La stature un peu plus courte et plus large ; les antennes un peu plus courtes, n'atteignant pas (même chez le ♂) le sommet des élytres ; les joues distinctement plus longues que les lobes inférieurs des yeux ; le pronotum un peu plus convexe ; l'épine latérale plus petite, non courbée en arrière au sommet ; les sillons transversaux encore moins profonds, souvent interrompus au milieu ; les élytres ponctués moins grossièrement, le pronotum et les élytres non pourvus de poils érigés.

Le pronotum le plus souvent couvert d'une pubescence grise uniforme, sans taches noires ; sur chaque élytre, l'extrême base, une bande transversale droite et régulière (de même largeur dans toute son étendue), un peu avant le milieu, et une autre pareille plus étroite, un peu dentelée, au commencement du quart apical, ainsi que quelques taches à la partie apicale, sont de couleur noire ; avant et après la large bande prémédiane noire, une très large bande grise, dépourvue de taches noires.

Longueur : 10 à 16 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par moi sur des individus de Kondué.

Localités : Congo belge : Luebo, Luluabourg, Tshihapa, Makumbi, Sankuru, Kondué (Musée de Tervueren).

5. *sparsa* Klug

Lamia sparsa Klug 1833. Abh. Ak. d. Wiss. Berl. I, p. 207, pl. V, fig. 5.

Phymasterna sparsa Fairm. 1871. Ann. Soc. ent. Fr. (5) I, p. 66.

Eumimetes sparsa Klug 1890. Grandid. Hist. Madag. Col., pl. 51, fig. 3.

m. vagepicta Fairm.

Phymasterna vagepicta Fairm. 1871. Ann. Soc. ent. Fr. (5) I, p. 65.

Eumimetes sparsa var. *Künck.* 1890. Grandid. Hist. Madag. Col., pl. 51, fig. 4.

Eumimetes fasciata Brancs. 1893. Jahresber. Ver. Trencs. XV, p. 242, pl. XII, fig. 17.

Très proche de *maculicornis Thoms.*, mais s'en distinguant ainsi : Les antennes plus fines, de la longueur du corps (♀) ou un tiers plus longues (♂) ; l'épine latérale du pronotum très petite, émoussée, les sillons transversaux un peu plus profonds ; les élytres plus atténués vers leur sommet ; le disque du pronotum et les élytres sans poils érigés.

Brun rougeâtre foncé, couvert entièrement d'une pubescence gris clair et parsemé de taches brun olivâtre foncé ; ces taches parfois en partie confluentes, mais ne formant jamais de bandes régulières.

Longueur : 11 à 17 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 8 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par KLUG sur des individus de Madagascar.

m. vagepicta Fairm.

La pubescence plutôt gris jaunâtre ; les taches sur les élytres confluentes, de manière à former sur chaque élytre trois bandes transversales dentelées (une postbasilaire, une médiane et une postmédiane).

Fasciata Brancs. est un synonyme de cette forme.

Localité : Madagascar, commun dans toute l'île (Muséum de Paris, etc.).

6. albomarmorata Breun.

Frea (Frea) albomarmorata Breun. 1935. Fol. Zool. et Hydrob. VII, p. 160.

Proche de *sparsa Klug*, mais s'en distinguant ainsi : La stature un peu plus courte ; les antennes plus courtes, n'atteignant pas (même chez le ♂) le sommet des élytres ; l'épine latérale du pronotum beaucoup plus grande, assez large, émoussée, non courbée en arrière au sommet ; les taches sur les élytres forment une bande transversale médiane dentelée.

Longueur : 11 à 14 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit sur un individu de Cholo.

Localités : Nyassaland : Cholo, Chiromo, Mont Mlanje (Imperial Bureau of Entomology) ; Congo belge : Lukuga, Kasai, Ipamu ; Katanga, Kafakumba (Musée de Tervueren).

Les individus du Congo sont un peu plus grands que le type, avec les taches sombres un peu plus étendues.

7. sparsilis Jord.

Frea sparsilis Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 234.

ab. albithorax nov.

Proche de *maculicornis Thoms.* (forme typique), mais s'en distinguant ainsi : La stature beaucoup plus étroite et plus allongée ; les joues plus longues ; l'épine latérale du pronotum plus large, encore plus convexe à son bord antérieur ; les élytres plus allongés, beaucoup moins larges, leurs points plus gros ; le pronotum et les élytres sans poils érigés.

Brun rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence gris clair et densément tacheté de brun foncé ; les taches en partie confluentes, sans toutefois former de bandes.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur 5 mm. à 6 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par JORDAN sur des individus de Kuilu et Loanda.

ab. albithorax nov.

La tête, le pronotum, le dessous et les jambes (sauf la partie apicale des tibias) couverts d'une pubescence blanche uniforme ; sur les élytres la pubescence blanchâtre est aussi plus étendue.

Type : une ♀ du Congo belge, au Musée de Tervueren.

Localités : Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Mandungu, Sassa, Eala, Kondué, Kafakumba (Musée de Tervueren) ; Angola : Loanda (JORDAN).

8. strandiella Breun.

Frea (Frea) strandiella Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 160.

Proche de *sparsilis Jord.* dont elle se distingue par les caractères suivants : La stature un peu plus large et plus courte (plus étroite que chez *maculicornis Thoms.*) ; les antennes un peu plus longues que le corps (♂) ; l'épine latérale du pronotum mince, droite, non courbée en arrière au sommet ; les élytres finement ponctués ; la pubescence gris clair de la surface plus étendue, moins distincte, formant sur les élytres des bandes transversales vagues, sauf au quart apical où cette pubescence est plutôt blanchâtre et interrompue par des taches nettes, plutôt noirâtres.

Longueur : 12 à 16 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrite par moi sur des individus d'Eala.

Localités : Congo belge : Eala, Albertville, Katanga (Musée de Tervueren).

9. *senilis* White

Phymasterna senilis White 1858. Proc. zool. Soc. Lond. XXVI, p. 402.

Frea senilis Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 234.

Proche de *sparsilis* Jord, mais s'en distinguant comme suit : La stature beaucoup plus large ; les antennes un peu plus courtes ; l'épine latérale du pronotum encore plus large ; les élytres granulés aux épaules.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence blanchâtre, sans dessins noirs (autant qu'on peut en juger d'après le type unique, qui se trouve en très mauvais état).

Longueur : 16 millimètres. Largeur : 8 millimètres.

Décrit par WHITE sur un individu de Sierra-Leone.

J'identifie avec cette espèce un individu du Congo belge : Luluabourg, qui se distingue en ce que les élytres sont parsemés de taches noirâtres, surtout vers la base et le sommet, et sous forme de bande transversale postmédiane irrégulière.

Localités : Sierra-Leone (Musée Britannique) ; Congo belge : Luluabourg (Musée de Tervueren).

10. *cincta* Jord.

Frea cincta Jord. 1903. Novit. Zool. X, p. 178.

La stature élancée. Les antennes un peu moins longues que le corps chez la ♀, non frangées en dessous ; le scape médiocrement long, peu fort, le troisième article beaucoup plus long que le quatrième, les tubercules antennifères très peu élevés. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, moins longs que les joues. Le front très éparsement et très finement ponctué. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale, qui est fortement recourbée à son sommet ; les sillons transversaux sont très profonds ; les côtés du disque pourvus de quelques gros points. Les élytres très allongés, légèrement et régulièrement atténués, grossièrement ponctués jusqu'au sommet, surtout très densément aux épaules, les points plus fins vers la suture.

Noir ; le front et les joues couverts d'une pubescence grisâtre ; le pronotum d'une pubescence noire et orné d'une large bande transversale médiane blanche. Les élytres marbrés de gris clair et de noir, sauf à leur quart basilaire, qui reste noir, ainsi que l'écusson. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris blanchâtre. La base des articles des antennes annelée également de blanchâtre.

Longueur : 14 à 17 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Localité : Gabon : Fleuve Ogooué (JORDAN).

11. *jaguarita* Chevrl.

Tragocephala ? jaguarita Chevrl. 1855. Rev. zool. (2) VII, p. 522 ; 1858. Cent. Long., n° 42.

Frea valdepunctata Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 175, pl. VIII, fig. 3.

Tragocephala jaguarita Murr. 1871. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII, p. 49.

Stature allongée, étroite. Les antennes de la ♀ n'atteignant pas le sommet des élytres, non frangées en dessous ; le scape médiocrement long, médiocrement fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères peu élevés. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Le front plus large (♀) ou moins large (♂) qu'un des lobes inférieurs des yeux, finement ponctué ainsi que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une petite épine latérale pointue, un peu rapprochée de la base ; les sillons transversaux assez profonds ; le disque ponctué assez grossièrement. Les élytres allongés, parallèles, densément et assez grossièrement ponctués ; les épaules un peu proéminentes, mais arrondies.

Noir, couvert d'une pubescence grise et parsemé entièrement de taches rondes gris noirâtre, de manière que toute la surface paraît tigrée. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris clair, les antennes d'une pubescence noire, annelées de blanchâtre à la base à partir du troisième article.

Longueur : 8 à 11 millimètres. Largeur : 3 à 4 millimètres.

Décrit par CHEVROLAT sur des individus de Vieux-Calabar. *Valdepunctata* Thoms. est un synonyme.

Localités : Nigeria : Vieux-Calabar (CHEVROLAT) ; Cameroun : Buea (Musée de Stockholm) ; Gabon : Lambaré (Muséum de Paris) ; Congo belge : Eala, Simba (Musée de Tervueren).

12. *haroldi* Qued.

Eumimetes haroldi Qued. 1883. Berl. ent. Zs. XXVII, p. 139, pl. I, fig. 7.

Stature en ovale allongé. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂), très éparsement frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre, pourvu d'une fine crête longitudinale à son côté extérieur ; le troisième article aussi long que le quatrième ; les tubercules antennifères à peine élevés. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, un peu moins longs que les joues. Le front et les joues densément et assez finement ponctués. Le pronotum grand, bombé, pourvu d'une très petite épine latérale pointue ; les sillons transversaux peu pro-

fonds ; les antérieurs le plus souvent interrompus au milieu ; les côtés du disque assez grossièrement, mais pas profondément ponctués ; l'écusson très court. Les élytres très convexes, très grossièrement ponctués, surtout vers la base, les points un peu moins gros seulement vers la suture.

Noir, couvert d'une fine pubescence brune, variée de gris blanchâtre ; la couleur grise plus dense sur le front, les joues et au tiers apical des élytres où elle forme deux bandes transversales ; en outre, sur chaque élytre, une large bande transversale prémédiane de couleur jaune d'ocre, prolongée le long de la suture le plus souvent jusqu'à l'écusson. Le dessous du corps, les jambes et les antennes couverts d'une fine pubescence gris blanchâtre, tachetés de brun ; les côtés des sterna d'une pubescence jaune d'ocre.

Longueur : 9 à 14 millimètres. Largeur : 4 mm. à 5 mm. 1/2.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus du Chinchoxo (Congo belge).

Localités : Congo belge, commun presque dans tout le pays (sauf à l'est) ; Angola : Loanda (JORDAN).

13. *curta* Chevrl.

Gnathœnia curta Chevrl. 1858. Thoms. Arch. Ent. II, p. 250, pl. 14, fig. 5.

Eumimetes frater Lam. 1893. Ann. Soc. ent. Fr. LXII, p. 46.

Eumimetes aureocinctus Auriv. 1903. Ent. Tidskr. XXIV, p. 277.

Très proche de *haroldi* Qued., mais la stature un peu plus allongée et plus svelte ; les deux tiers basilaires des élytres couverts d'une pubescence jaune d'ocre, formant deux bandes transversales plus denses (une comme chez *haroldi*, parfois un peu réduite vers l'épaule, l'autre après le milieu) ; le tiers apical orné de taches blanchâtres.

Longueur : 11 à 13 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 5 millimètres.

Décrit par CHEVROLAT sur des individus de Vieux-Calabar.

Frater Lam. et *aureocinctus* Auriv. sont des synonymes.

Localités : Sierra-Leone (Musée Britannique) ; Côte d'Ivoire : Assinie (LAMEERE) ; Côte de l'Or ; Nigeria : Vieux-Calabar (Musée Britannique) ; Dahomey (collection STAUDINGER) ; Cameroun (AURIVILLIUS).

14. *kinduensis* Breun.

Frea (Frea) kinduensis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 161.

Proche de *curta* Chevrl., mais la stature plus grande et plus allongée ; le scape sans crête longitudinale latérale ; l'épine latérale du pronotum beaucoup plus longue.

Les élytres ponctués plus grossièrement à la base ; les dessins sur les élytres moins nets ; la bande transversale prémédiane jaune beaucoup plus large, s'étendant souvent presque jusqu'à la base.

Longueur : 13 à 14 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Localité : Congo belge : Kindu (Musée de Tervueren).

15. *congoana* Breun.

Frea (Frea) congoana Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 161.

Proche de *curta* Chevrl., mais la stature plus grande ; le scape sans crête longitudinale latérale ; l'épine latérale du pronotum beaucoup plus longue, courbée fortement en arrière à son sommet ; les sillons transversaux plus profonds.

La bande transversale prémédiane jaune des élytres plus large, la postmédiane réduite ; toute la surface des élytres (sauf à la place de la bande prémédiane) couverte d'un grillage jaune olivâtre ; les côtés du disque du pronotum et le tiers basilaire des élytres pourvus de poils noirs érigés.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus de Kindu.

Localités : Congo belge : Kindu (Musée de Tervueren), Maniema (Muséum de Paris).

16. *strandii* Breun.

Frea (Frea) strandii Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 161.

Frea burgeoni Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 218.

Stature en ovale allongé, trapue. Les antennes du type unique cassées des deux côtés (de sorte qu'on ne peut pas dire définitivement si l'espèce n'appartient pas au genre *Gnathœnia* Thoms.), frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. La tête non ponctuée. Le pronotum grand, bombé, pourvu d'une petite épine latérale émoussée ; les sillons transversaux peu profonds ; les antérieurs non distincts au milieu. Les élytres très convexes, peu atténués vers le sommet, où ils sont largement arrondis ; leur quart basilaire grossièrement granulé, leur moitié postérieure très finement ponctuée ; les épaules proéminentes, anguleuses. Toute la surface couverte de courts poils noirs érigés.

Noir ; la tête et le pronotum couverts d'une pubescence éparsse jaune paille, cette pubescence plus dense sur les élytres, sauf à leur tiers apical, qui est couvert d'une pubescence brun rougeâtre ; les granules au quart basilaire restent noirs,

ainsi que les points, de manière qu'ils interrompent la couleur jaune paille. Le dessous du corps couvert d'une pubescence jaune paille plus dense, les jambes d'une pubescence plus éparsée, les antennes d'une pubescence jaune grisâtre très éparsée.

Longueur : 14 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Kasai, Makumbi, au Musée de Tervueren.

Par erreur j'ai redécrit cette espèce sous le nom de *burgeoni*, qui est donc un synonyme.

17. *flavicollis* Auriv.

Mimofrea flavicollis Auriv. 1914. Ark. f. Zool. IX/8, p. 12.

Stature allongée. Les antennes à peu près un quart plus longues que le corps (♀) ou plus de moitié plus longues que le corps (♂), frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, moins longs que les joues. Le front et les joues assez grossièrement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une assez petite épine latérale pointue, dirigée un peu en haut ; les sillons transversaux assez profonds ; les côtés du disque pourvus de quelques gros points ; l'écusson très large. Les élytres légèrement rétrécis dès les épaules, densément et très grossièrement ponctués ; les points à peine moins gros au sommet ; les épaules proéminentes.

Noir ; la tête et le bord antérieur du pronotum éparsément couverts d'une pubescence jaune ; le reste du pronotum densément. Les élytres couverts d'une fine pubescence grise, marbrés de blanchâtre et ornés juste après le milieu d'une étroite bande transversale jaune. Le dessous du corps et les jambes couverts d'une pubescence grise, les côtés des sterna d'une pubescence jaunâtre. Les antennes couverts de pubescence noire, annelées de blanchâtre à la base à partir du troisième article.

Longueur : 10 à 12 millimètres. Largeur : 4 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus de la Côte de l'Or.

Localités : Côte d'Ivoire (Collection LE MOULT) ; Côte de l'Or (Musée de Stockholm).

18. *laevipunctata* Thoms.

Frea laevipunctata Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 175, pl. VIII, fig. 2.

Frea grisea Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 234.

Stature en ovale allongé. Les antennes dépassant à peine le milieu des élytres (♀) ou de la longueur du corps (♂), non frangées en dessous ; le scape de longueur moyenne ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, à peu près aussi longs que les joues. Le front et les joues très finement ponctués. Le pronotum large, très convexe, pourvu d'une assez petite épine latérale pointue ; les sillons transversaux peu profonds, les côtés du disque éparsément et assez grossièrement ponctués. Les élytres allongés, assez densément, quoique finement ponctués.

Brun rougeâtre foncé, entièrement marbré de gris blanchâtre et de brun olivâtre.

Longueur : 10 à 12 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 5 mm. 1/2.

Décrit par THOMSON sur des individus du Gabon. *Grisea* Jord. est un synonyme.

Localités : Cameroun : Bipindi, Victoria, Buea, etc. (collection STAUDINGER, etc.) ; Gabon (collection ITZINGER) ; Congo belge : Bas Uélé, Buta, Mayumbe (Musée de Tervueren).

19. *unicolor* nov.

Proche de *laevipunctata* Thoms., mais s'en distinguant ainsi : La stature plus allongée ; les antennes un peu plus longues que le corps ; les joues distinctement plus longues que les lobes inférieurs des yeux ; le pronotum plus transversal, moins convexe, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs droits et profonds ; l'épine latérale plus large, émoussée ; l'écusson deux fois aussi large que long, quadrangulaire ; les élytres plus allongés, un peu moins convexes, un peu plus densément et plus grossièrement ponctués ; les épaules plus proéminentes, pourvues d'un granule dirigé en haut.

Noir, entièrement couvert (y compris le scape et le deuxième article des antennes) d'une pubescence grise, les articles antennaires suivants d'une pubescence noire et annelés de blanc à la base.

Longueur : 12 mm. 1/2. Largeur : 5 millimètres.

Type du Congo belge : Eala, au Musée de Tervueren.

20. *floccifera* Qued.

Crossotus (*Eumimetes*) *floccifer* Qued. 1885. Journ. Sc. math. phys. nat. Lisboa XL, p. 245.

Eumimetes attenuatus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 235.

Stature très allongée. Les antennes un peu plus longues que le corps (♀) ou de moitié plus longues que le corps (♂), densément frangées en dessous ; le scape de longueur moyenne ; le troisième article aussi long que le quatrième

ou même un peu moins long. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, un peu moins longs que les joues. Le front et les joues fortement ponctués. Le pronotum très large, pourvu d'une assez petite épine latérale émoussée, dirigée un peu en haut ; les sillons transversaux profonds ; le disque entre ces sillons fortement ponctué. Les élytres très allongés, légèrement rétrécis dès les épaules, grossièrement ponctués ; les points très gros vers la base ; les épaules proéminentes ; à la moitié postérieure se trouvent quelques lignes longitudinales un peu élevées.

Brun foncé, entièrement couvert d'une pubescence brun olivâtre variée de jaune clair, surtout sur le front, en forme de bande transversale sur le vertex, l'écusson et la base des élytres. Les élytres couverts (sauf à leur tiers basilaire) d'un réseau irrégulier d'étroites bandes blanc jaunâtre. Le dessous du corps, les jambes et les antennes couverts de pubescence brun olivâtre variée de jaune ; le dernier segment abdominal, à la partie apicale, d'une pubescence jaune d'ocre.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus de Cabinda. *Attenuatus* Jord. est un synonyme.

Localités : Cameroun : Victoria, Joko (collection STAUDINGER) ; Cabinda (QUEDENFELDT) ; Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Eala, Sassa, Sankuru, Komi, Kondué (Musée de Tervueren) ; Angola : Loanda (JORDAN).

21. *grisescens* Auriv.

Freia grisescens Auriv. 1921. Col. Cat. Ceramb., pars 73, p. 192.

Eumimetes griseus Hintz 1911. Wiss. Ergebn. d. deutsch. Centr. Afr. Exped. III, p. 440.

Très proche de *flocifera* Qued., mais s'en distinguant comme suit : La stature un peu moins large, le troisième article des antennes un peu plus long que le quatrième ; le front et les joues finement ponctués ; l'épine latérale du pronotum très petite, encore plus émoussée ; le disque ponctué beaucoup plus finement ; les élytres plus larges, ponctués plus densément ; les épaules moins proéminentes.

Les dessins blanc jaunâtre des élytres moins apparents ; le métasternum et ses épisternes couverts d'une dense pubescence blanche ou jaunâtre.

Longueur : 11 à 15 millimètres. Largeur : 5 à 6 millimètres.

Décrit par HINTZ sur des individus de Kondué sous le nom de *griseus* ; ce nom, préoccupé dans le genre *Freia*, fut changé par AURIVILLIUS en *grisescens*.

Localités : Congo belge : Kondué (HINTZ), Léopoldville, Lukolela, Dima, Équateur, Flandria (Musée de Tervueren).

22. *basalis* Jord.

Freia basalis Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 233.

ab. *griseobasalis* nov.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu plus longues que le corps (♀) ou plus de moitié plus longues que le corps (♂), densément frangées en dessous ; le scape assez long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux. Les joues moitié plus longues que ces lobes. Le front et le bord antérieur du vertex très densément ponctués, les joues éparsemment et assez grossièrement ponctuées. Le pronotum large, densément et assez grossièrement ponctué, pourvu d'une épine latérale conique ; les sillons transversaux assez profonds ; l'écusson très large. Les élytres légèrement atténués dès la base, grossièrement ponctués, les points très gros vers les épaules.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence gris clair variée d'un peu de blanchâtre ; les élytres d'une pubescence jaune d'ocre au quart basilaire, parsemés sur le reste de leur surface de taches et courtes bandes blanches. Le dessous, les cuisses, les tibias et les antennes couverts de pubescence grise, le métasternum et ses épisternes d'une pubescence blanche, la partie apicale des tibias ainsi que les tarses d'une pubescence brun rougeâtre, la partie apicale des articles antennaires d'une pubescence noirâtre.

Longueur : 12 à 17 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par JORDAN sur des individus de Kuilu et Loanda.

ab. *griseobasalis* nov.

La pubescence du quart basilaire des élytres de la même couleur grise que le reste.

Type : un ♂ du Congo belge, de la collection ITZINGER. Partout avec la forme typique.

Localités : Cameroun : Mundame (collection STAUDINGER) ; Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Benito (Musée de Tervueren) ; Congo belge : Mayumbe (Musée de Tervueren) ; Angola : Loanda (JORDAN).

23. *uniformis* Hintz

Mimofrea uniformis Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 199.

ab. *fasciolata* Hintz

Mimofrea uniformis s. sp. *fasciolata* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 199.

m. *thoracica* Hintz

Mimofrea uniformis s. sp. *thoracica* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 200.

Proche de *basalis* Jord., mais la stature un peu plus courte et plus large ; les élytres moins rétrécis vers le sommet, sans pubescence jaune d'ocre à la base ; les taches blanches sur les élytres sont plus nombreuses ; le mésosternum et ses épisternes couverts aussi d'une dense pubescence blanche. Parfois les dessins de la surface de couleur blanc jaunâtre.

Longueur : 12 à 19 millimètres. Largeur : 6 mm. à 8 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par HINTZ sur des individus du Cameroun.

ab. *fasciolata* Hintz

Les taches blanches des élytres forment une étroite bande transversale médiane blanche, qui n'atteint pas la suture.

m. *thoracica* Hintz

Les parties latérales du pronotum, jusque sur le disque (en partie) couvertes de pubescence blanche ou blanc jaunâtre.

Localités : Nigeria : Warri (collection LE MOULT) ; Cameroun : Mundame, Victoria, Johann-Albrechtshöhe (HINTZ) ; île Fernando Po (Musée de Gênes) ; Guinée espagnole (HINTZ) ; Gabon : Fleuve Ogooué (Muséum de Paris).

24. *puncticollis* Jord.

Frea puncticollis Jord. 1903. Novit. Zool. X, p. 194.

Stature allongée, assez large. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂) ; les quatre premiers articles éparsement frangés en dessous ; le scape long ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, un peu moins longs que les joues. La tête très finement ponctuée et parsemée de plus gros points. Le pronotum très large, pourvu d'une grande épine latérale, courbée fortement en arrière à son sommet ; les sillons transversaux peu profonds ; le disque éparsement, mais assez grossièrement ponctué. Les élytres très allongés, médiocrement convexes, légèrement rétrécis dès les épaules, très densément et grossièrement ponctués, granulés à la base ; les épaules proéminentes ; le disque du pronotum et la base des élytres pourvus de longs poils noirs érigés.

Noir ; le front (ou deux grandes taches sur lui), les joues, les côtés du disque du pronotum, l'écusson, les parties latérales du pronotum, des sterna et des segments abdominaux couverts d'une pubescence dense jaune d'ocre ou blanchâtre ; le reste couvert d'une très fine pubescence grise, les élytres parsemés de mouchetures blanches.

Longueur : 14 à 15 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Localité : île Saint-Thomas (JORDAN, Musées de Tervueren, de Gênes).

25. *mniszечи* Thoms.

Sternotomis mniszечи Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 179, pl. 7, fig. 9.

Frea malachitica Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 234, pl. X, fig. 13.

Eumimetes turchais Fairm. 1894. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVIII, p. 330.

ab. *nigrobasalis* nov.

Stature allongée. Les antennes aussi longues que le corps (♀) ou moitié plus longues que lui (♂), non frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, à peu près aussi longs que les joues. Le front et les joues finement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une assez grande épine latérale émoussée ; les sillons transversaux profonds ; le disque densément et grossièrement ponctué. Les élytres très allongés, assez grossièrement ponctués, les points de plus en plus fins vers le sommet, finement granulés à la base ; les épaules très proéminentes ; le calus huméral pourvu d'un tubercule assez haut.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence vert bleuâtre ; une grande tache sur le vertex et quelques petites taches sur le pronotum sont de couleur noirâtre. Les élytres ornés de plusieurs bandes transversales gris noirâtre ou noires, plus ou moins apparentes, et parsemés de taches de cette couleur. Le dessous et les jambes également vert bleuâtre ; la partie apicale extérieure des tibias brun noirâtre. Les antennes couvertes de pubescence brun noirâtre ; la partie basilaire des articles couverte de pubescence gris verdâtre.

Longueur : 12 à 21 millimètres. Largeur : 5 à 9 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par THOMSON sur des individus du Gabon.

Malachitica Jord. et *turchais* Fairm. sont des synonymes.

ab. *nigrobasalis* nov.

Tous les dessins des élytres de couleur noire, très apparents ; chaque élytre pourvu en outre d'une large bande transversale postbasilaire noire.

Type : une ♀ de la côte d'Ivoire, de la collection ITZINGER.

Localités : Côte d'Ivoire (collection ITZINGER) ; Gabon : Kuilu (JORDAN), Libreville (Musée de Tervueren) ; Congo belge : Eala, Sassa, Stanleyville, Barumbu, Sankuru, Komi, Kondué (Musée de Tervueren).

26. *flavosparsa* Auriv.

Freya flavosparsa Auriv. 1914. Ark. f. Zool. VIII/29, p. 29, pl. I, fig. 7.

Stature assez allongée. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), non frangées en dessous ; le scape assez long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, aussi longs que les joues. Le front et les joues éparsement et grossièrement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une très grande épine latérale émoussée ; les sillons transversaux peu profonds ; le disque éparsement et grossièrement ponctué. Les élytres très allongés, assez grossièrement ponctués, les points devenant de plus en plus fins vers le sommet ; les épaules proéminentes.

Brun rougeâtre foncé, couvert d'une pubescence brune, marbré de gris clair ; le front et les joues avec une pubescence blanche ; sur le front, deux bandes transversales brunes (une au milieu, l'autre entre les tubercules antennifères) ; de chaque côté une bande longitudinale blanchâtre, qui s'étend du bord postérieur des yeux jusqu'à la base des élytres. Chaque élytre parsemé de taches blanchâtres ou jaunâtres, dont plusieurs plus grandes (une en ovale allongé à la suture, après l'écusson ; une au bord latéral à la fin du quart basilaire ; deux postmédianes : une près de la suture, l'autre près du bord latéral ; et une préapicale au bord latéral) ; les parties inférieures des parties latérales du pronotum, les côtés des sterna et des segments abdominaux, couverts d'une pubescence blanchâtre très éparse ; les antennes, d'une pubescence dense brun foncé.

Longueur : 16 à 17 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 7 mm. 1/2.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus d'Usambara.

Localités : Territoire du Tanganyika : Usambara (Musée de Stockholm), Lac Nyassa (collection ITZINGER).

27. *vermiculata* Kolbe

Freya vermiculata Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg., p. 270.

Stature très allongée, peu large. Les antennes aussi longues que le corps (♀) ou plus de moitié plus longues que le corps (♂), densément frangées en dessous ; le scape long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères assez rapprochés l'un de l'autre. Les lobes inférieurs des yeux très transversaux, moitié moins longs que les joues. Toute la tête finement ponctuée. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale émoussée ; les sillons transversaux profonds ; le disque assez éparsement et grossièrement ponctué. Les élytres très allongés, étroits, grossièrement ponctués, les points de plus en plus fins vers le sommet ; les épaules proéminentes, formant une crête.

Noir, couvert d'une pubescence éparse grise ; la tête et les élytres couverts d'un grillage de nombreuses et étroites bandes jaune d'ocre sur fond noirâtre ; l'écusson jaune ; une ou deux taches brun noirâtre de chaque côté du vertex. Sur chaque élytre, le calus huméral et une bande transversale étroite un peu avant le milieu (atténuée vers la suture), sont brun noirâtre. De même la partie apicale des tibias. Le dessous couvert d'une pubescence grise variée de jaune, les antennes d'une pubescence gris blanchâtre ; la partie apicale des articles, à partir du troisième, est noire.

Longueur : 13 mm. à 17 mm. 1/2. Largeur : 4 mm. à 5 mm. 1/2.

Décrit par KOLBE sur des individus de Derema.

Localités : Territoire du Tanganyika : Derema (KOLBE), Usambara, N'Guru (collection ITZINGER).

28. *humeralis* Kolbe

Freya humeralis Kolbe 1893. Stett. ent. Ztg. LIV, p. 270.

Stature en ovale allongé, assez large. Les antennes fines, n'atteignant pas le sommet des élytres (♀) ou un tiers plus longues que le corps (♂), éparsement frangées en dessous ; le scape très long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux très transversaux, à peu près aussi longs que les joues. Le front et les joues très finement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale très émoussée ; les sillons transversaux peu profonds ; les côtés du disque finement ponctués. Les élytres très larges à la base, fortement rétrécis vers le sommet, peu convexes, assez grossièrement ponctués à la moitié antérieure, les points de plus en plus fins vers le sommet ; les épaules très proéminentes, formant un grand tubercule arrondi.

Brun noirâtre, entièrement marbré de brun olivâtre clair et de gris blanchâtre ; de chaque côté du vertex une tache brun foncé ; une grande tache noire autour des épaules, parfois cernée de jaune ; une tache jaune à la base de chaque élytre entre l'écusson et la tache noire humérale ; la couleur grise formant sur chaque élytre deux bandes transversales (une très large pré-médiane variée de jaune et une plus étroite post-médiane) et diverses taches au quart apical et le long de la suture. Le dessous couvert d'une pubescence grise variée de jaune ; une tache brun foncé de chaque côté des segments abdominaux ; les jambes et les antennes couverts de pubescence gris clair.

Longueur : 15 à 19 millimètres. Largeur : 7 mm. 1/2 à 8 mm. 1/2.

Décrit par KOLBE sur des individus de Derema.

Localités : Territoire du Tanganyika : Derema (KOLBE), Usambara, Tanga (collection ITZINGER).

29. *castaneomaculata* Auriv.

Frea castaneomaculata Auriv. 1908. Ark. f. Zool. IV/17, p. 6.

Proche d'*humeralis* Kolbe, mais la stature un peu plus petite ; les élytres moins élargis aux épaules, un peu plus grossièrement ponctués.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence jaune paille et marbré de brun. Sur chaque élytre deux taches rouge foncé (une couvrant le calus huméral et s'étendant à la base vers l'écusson, l'autre, ronde, sur le disque au commencement du tiers apical). Le dessous, les jambes et les antennes couverts d'une pubescence grise, les côtés des sterna et des segments abdominaux d'une pubescence jaune.

Longueur : 13 à 17 millimètres. Largeur : 6 mm. à 7 mm. 1/2.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus de Ndanda et Dar-es-Salaam.

Localités : Territoire du Tanganyika : Ndanda, Dar-es-Salaam (Musée de Stockholm), Namupa (Musée de Munich), Mikindani (Musée de Vienne), Lindi (collection ITZINGER).

30. *circumscripta* Hintz

Frea circumscripta Hintz 1910. Deuts. ent. Zs., p. 201.

Proche d'*humeralis* Kolbe, mais la stature un peu plus petite, le pronotum et les élytres très grossièrement ponctués, l'épine latérale du pronotum petite.

Le front, les joues, l'écusson et le dessous couverts d'une pubescence gris blanchâtre ; une tache noirâtre de chaque côté du vertex ; le pronotum et les élytres couverts de pubescence jaune rougeâtre ; une étroite bande longitudinale blanchâtre de chaque côté du disque du pronotum. Sur chaque élytre, une tache ronde noire, qui couvre le calus huméral, et une autre pareille après le milieu près du bord latéral, toutes deux cernées de blanc. Les jambes et les antennes couverts d'une fine pubescence grise.

Longueur : 14 à 17 millimètres. Largeur 6 mm. 1/2 à 7 mm. 1/2.

Localités : Sud-Ouest Africain : Svakopmund ; Territoire du Tanganyika : Kilva (HINTZ).

31. *marmorata* Gerst.

Frea marmorata Gerst. 1871. Arch. f. Naturg. XXXVII/1, p. 48 ; 1873. Decken, Reise Ostaf. III/2, p. 258.

Frea marmorata Aulm. 1911. Fna. deutsch. Kol. V/2, p. 33.

ab. *alboplagiata* Kolbe.

Frea marmorata ab. *alboplagiata* Kolbe 1893. Stett. ent. Ztg. LIV, p. 270.

Proche d'*humeralis* Kolbe, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes un peu moins longues, l'épine latérale du pronotum moins large, les élytres granulés à la base, les épaules un peu moins proéminentes.

Brun rougeâtre foncé, entièrement couvert d'une pubescence grise variée de brun et de jaunâtre ; les joues, l'occiput en partie, l'écusson (sauf une ligne longitudinale au milieu) d'une pubescence jaune d'ocre. Sur chaque élytre, la partie basilaire (surtout autour du calus huméral, qui reste noir) couverte de pubescence jaune d'ocre, qui est interrompue par les granules noirs ; une tache ronde de même couleur sur le disque de chaque élytre au commencement du quart apical.

Longueur : 9 à 17 millimètres. Largeur : 4 à 8 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par GERSTÆCKER sur des individus de Mbaramu.

ab. *alboplagiata* Kolbe

Toute la pubescence plus ou moins brune ; les dessins jaunes de la forme typique sont de couleur blanche.

Localités : Territoire du Tanganyika : Derema (KOLBE), Morogoro, Mhonda, Kwiro, Ukami, Usambara, Dar-es-Salaam, Bagamoyo, N'guru (collection STAUDINGER, collection ITZINGER, etc.) Mbaramu (GERTSÆCKER) ; Rhodésie du Sud : Mont Selinda (Musée de Prétoria).

AULMANN cite cette espèce comme nuisible aux plantations de café.

32. *flavoscapulata* Fairm.

Frea flavoscapulata Fairm. 1897. Ann. Soc. ent. Fr. LXVI, p. 154.

Frea lineata Auriv. 1916. Ark. f. Zool. X/19, p. 18, fig. 71.

ab. *albescens* nov.

Proche de *marmorata* Gerst., mais s'en distinguant ainsi : Stature un peu plus large et plus courte ; l'épine latérale du pronotum plus petite ; les élytres ponctués plus finement, non granulés à la base.

Toute la surface couverte d'une pubescence gris clair ; le pronotum pourvu de quelques lignes longitudinales brunes, les élytres de bandes transversales brunes très dentelées ; sur chaque élytre deux taches jaune d'ocre, la basilaire

non interrompue par les granules foncés, la deuxième préapicale (située plus en arrière que chez *marmorata* Gerst.). Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre, les antennes de pubescence gris clair.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur : 6 mm. à 7 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par FAIRMAIRE sur des individus de Zanzibar. *Lineata Auriv.* est un synonyme.

ab. *albescens nov.*

Les deux taches des élytres de couleur blanche (au lieu de jaune d'ocre).

Type : une ♀ de la Baie de Delagoa, au Musée de Tervueren.

Localités : Colonie du Kénia ; Lower Tana (Imperial Bureau of Entomology) ; Territoire du Tanganyika : Kigonsera (collection STAUDINGER), Namupa (Musée de Munich), Tanga, Lindi (collection ITZINGER) ; Nyassaland : Blantyre (Musée de Hambourg) ; Afrique orientale portugaise : Baie de Delagoa (Musée de Tervueren) ; Transvaal : Magude (Musée de Prétoria).

33. *zambesiana* Hintz

Freya zambesiana Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 202.

Stature très allongée, peu large. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou moitié plus longues que le corps (♂), très éparsement frangées en dessous ; le scape long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux très transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front et les joues très densément et très finement ponctués, parsemés de gros points. Le pronotum large, pourvu d'une assez grande épine latérale émoussée ; les sillons transversaux assez profonds ; le disque très densément et très finement ponctué et parsemé de gros points. Les élytres très allongés, médiocrement convexes, assez grossièrement ponctués ; les points très gros vers la base ; les épaules proéminentes.

Brun rougeâtre foncé ; toute la surface marbrée de brun et de jaune. Sur le disque du pronotum et sur les élytres (sauf à leur base et leur tiers apical), la couleur jaune est remplacée par une pubescence grise, interrompue sur le pronotum par trois courtes bandes longitudinales brunes à sa base et par une ou deux bandes transversales, très dentelées, sur les élytres (une médiane et une postmédiane). Le dessous couvert d'une pubescence grise variée plus ou moins de jaune ; une tache brun foncé sur les côtés des segments abdominaux. Les jambes et les antennes couvertes de pubescence grise, la partie apicale extérieure des tibias de pubescence brun noirâtre.

Longueur : 15 à 19 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par HINTZ sur des individus de Morrumbala.

Localités : Nyassaland : Cholo (Musée Britannique) ; Zambèze : Morrumbala (HINTZ).

34. *nyassana* Auriv.

Freya nyassana Auriv. 1914. Ark. f. Zool. VIII/29, p. 29.

Très proche de *zambesiana* Hintz, dont elle ne forme peut-être qu'une variante individuelle, mais la stature encore plus allongée, plus étroite, l'épine latérale du pronotum plus large, plus émoussée, les sillons transversaux plus profonds, les épaules encore plus proéminentes ; la pubescence grise sur les élytres moins étendue, ne formant qu'une large bande transversale prémédiane, qui s'étend près de la suture jusque vers l'écusson.

Longueur : 15 à 19 millimètres. Largeur : 6 mm. à 6 mm. 1/2.

Localité : Nyassaland : Mont Mlanje (AURIVILLIUS, Musée de Stockholm).

35. *marshalli* Breun.

Freya (Freya) marshalli Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 161.

Très proche de *zambesiana* Hintz, dont elle ne forme peut-être qu'une variante individuelle, mais s'en distinguant comme suit : La stature plus large, les antennes du ♂ seulement un quart plus longues que le corps ; l'épine latérale du pronotum plus large, plus émoussée ; les élytres moins grossièrement ponctués.

Brun foncé, couvert d'une pubescence gris clair, variée de jaune ; la couleur jaune plus dense sur l'occiput, à la base du pronotum, sur l'écusson, à l'extrême base des élytres et à leur quart apical. La pubescence grise des élytres interrompue par une bande transversale médiane brune très dentelée. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris clair variée de jaune ; les antennes brun foncé, couvertes d'une très fine pubescence grise.

Décrit par moi sur des individus de Nairobi.

Localités : Colonie du Kénia : Nairobi (Imperial Bureau of Entomology, Musée de Vienne) ; Territoire du Tanganyika : Kilimandjaro (Muséum de Paris).

36. *johannæ* Gah.

Eumimetes johannæ Gah. 1890. Trans. ent. Soc. Lond., p. 322.

Eumimetes johannæ Fairm. 1893. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVII, p. 552.

m. *fulvovestita* Fairm.

Eumimetes fulvovestitus Fairm. 1893. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVII, p. 552.

Stature allongée, trapue. Les antennes fines, un quart plus longues que le corps (δ), éparsément frangées en dessous ; le scape très long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux très transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front et les joues éparsément ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale émoussée, courbée un peu en arrière à son sommet ; les sillons transversaux peu profonds ; le disque assez grossièrement ponctué et vermiculé. Les élytres médiocrement convexes, très densément et très grossièrement ponctués (les points un peu moins gros vers le sommet), granulés à la base.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre éparsée, variée de brun rougeâtre. Les élytres mouchetés peu distinctement de jaune clair et pourvus de quelques bandes transversales rougeâtres peu distinctes.

Longueur : 14 à 17 millimètres. Largeur 7 mm. à 7 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par GAHAN sur des individus d'Anjouan.

m. *fulvovestita* Fairm.

Les élytres sans bandes transversales rougeâtres.

Se trouve avec la forme typique.

Localités : Iles Comores : Anjouan (Musée Britannique), Mayotte (FAIRMAIRE, Muséum de Paris).

37. *brevicornis* Gah.

Eumimetes brevicornis Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 53.

Proche de *johannæ* Gah., mais la stature plus petite ; les antennes beaucoup plus courtes que le corps ; la tête densément ponctuée ; le disque du pronotum plus densément ponctué ; l'épine latérale un peu moins large, droite, légèrement émoussée au bout.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence grise, marbré de jaunâtre.

Longueur : 13 à 15 millimètres. Largeur : 6 à 7 millimètres.

Localité : Colonie du Kénia : Samburu (GAHAN, Musée Britannique).

B. Sous-Genre *Cyrtofrea* Auriv.

Cyrtofrea Auriv. 1910. Ark. f. Zool. VII/3, p. 36.

Cyrtofrea Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192.

Les yeux fortement échanrés ; les élytres sans crêtes ou tubercules au tiers basilaire ; la saillie prosternale un peu moins haute que les hanches ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur.

Type : *albolineata* Auriv. Trois espèces.

38. *albolineata* Auriv.

Cyrtofrea albolineata Auriv. 1910. Ark. f. Zool. VII/3, p. 37.

Stature en ovale allongé. Les antennes beaucoup moins longues que le corps ; le scape assez long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale droite, pointue. Les élytres éparsément, mais grossièrement ponctués et pourvus chacun de trois lignes longitudinales un peu élevées sur le disque.

Brun rougeâtre, couvert d'une fine pubescence gris blanchâtre ; cinq étroites bandes longitudinales blanches sur le disque du pronotum ; une autre, de couleur jaune d'ocre, de chaque côté sur ses parties latérales. Les lignes élevées des élytres couvertes d'une pubescence blanche et noire. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre éparsée, la partie apicale des tibias et les tarsi en partie couverts de pubescence noire.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Localité : Colonie du Kénia : Ikutha (AURIVILLIUS, Musée de Stockholm).

39. *flociferoides* Breun.

Frea (*Cyrtofrea*) *flociferoides* Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 219.

Stature allongée. Les antennes fines, deux fois plus longues que le corps (δ) ; les cinq premiers articles frangés en dessous ; le scape long, mince ; le troisième article aussi long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape ; les tubercules antennifères peu élevés. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front beaucoup plus haut que large, très densément et finement ponctué. Le pronotum court, plus de deux fois plus large que long, pourvu d'une grande épine latérale large, obtuse, recourbée ; les sillons transversaux droits et profonds ; le disque assez densément et très finement ponctué ; l'écusson quadrangulaire. Les élytres allongés, légèrement rétrécis dès les épaules, arrondis au sommet, densément et assez grossièrement ponctués, les points plus espacés et moins gros à la

moitié postérieure ; sur chaque élytre, une courte crête longitudinale partant du calus huméral. Les cuisses claviformes, et ornés d'une bande transversale postbasilaire noirâtre peu large.

Longueur : 11 millimètres. Largeur 3 mm. 3/4.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Eala, du Musée de Tervueren.

40. *subcostata* Kolbe

Frea subcostata Kolbe 1891. Stett. ent. Ztg. LII, p. 35.

Stature allongée. Les antennes un peu moins longues que le corps ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, moitié plus longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une épine latérale assez longue, mince, tronquée au bout. Les élytres beaucoup plus larges que le pronotum, médiocrement convexes, grossièrement ponctués et granulés aux épaules, qui sont assez proéminentes. Sur chaque élytre, trois lignes longitudinales peu élevées.

Brun rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence gris cendré, variée de brun jaunâtre. Le dessous, les jambes et les antennes couverts d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 11 mm. 1/2 à 15 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus du territoire du Tanganyika.

Localités : Territoire du Tanganyika : Lukuledi, Namupa (Musée de Munich).

C. Sous-Genre **Crossotofrea** Hintz

Crossotofrea Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192, 198.

Les yeux presque subdivisés ; les élytres pourvus au tiers basilaire de crêtes ou tubercules ; la saillie prosternale de la hauteur des hanches ; la saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur.

Type : *virgata* Qued. Vingt-trois espèces.

41. *virgata* Qued.

Crossotus virgatus Qued. 1882. Berl. ent. Zs. XXVI, p. 357.

Crossotus virgatus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 236.

Stature allongée, assez large. Les antennes assez fines, un peu moins longues que le corps (♀), ou un peu plus longues que le corps (♂), frangées en dessous ; le scape de longueur moyenne ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu plus longs que les joues. La tête assez grossièrement ponctuée. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale large, courbée en arrière à son sommet ; les sillons transversaux assez profonds ; le disque grossièrement ponctué. Les élytres allongés, médiocrement convexes, peu rétrécis jusqu'avant le sommet, assez grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet. Chaque élytre pourvu de trois lignes longitudinales légèrement ondulées, peu élevées et de deux tubercules au milieu du disque, surmontés de poils brun foncé (un à l'extrême base, l'autre postbasilaire après le premier). Toute la surface couverte de poils noirs érigés.

Brun rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence brun olivâtre, variée de jaune clair. Les tubercules des élytres et quelques taches allongées sur leurs lignes longitudinales élevées, la partie apicale des tibias, le troisième et le quatrième article des tarsi couverts d'une pubescence brun foncé. Les antennes couvertes d'une pubescence brun foncé ; la partie basilaire et apicale des articles, d'une pubescence jaunâtre.

Longueur : 11 à 17 millimètres. Largeur 5 mm. à 7 mm. 1/2.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus de l'Angola.

Localités : Côte de l'Or (JORDAN) ; Cameroun : Buea (Musée de Stockholm) ; Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Sassa, Lulua, Lukombe, Kindu, Barumbu (Musée de Tervueren) ; Angola (QUEDENFELDT) ; Uganda : Entebbe (Imperial Bureau of Entomology).

42. *annulata* Chevrl.

Frea annulata Chevrl. 1858. Rev. zool. (2) X, p. 308 ; Cent. Longic., n° 88.

Crossotus gabonicus Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 177.

Crossotofrea gabonica Auriv. 1913. Ark. f. Zool. VIII/22, p. 25.

Très proche de *virgata* Qued., mais les antennes à peine frangées en dessous ; les élytres sans lignes longitudinales élevées et sans taches brun foncé.

Toute la surface couverte d'une pubescence brune et variée de jaune d'ocre, sans taches jaune clair ; la couleur donc plus uniforme. Les antennes couvertes de pubescence brune ; la partie apicale et basilaire des articles, d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 11 à 15 millimètres. Largeur : 5 à 7 millimètres.

Décrit par CHEVROLAT sur un individu de Vieux-Calabar. *Gabonicus* Thoms. est un synonyme.

Localités : Nigeria : Vieux-Calabar (Musée Britannique), Ibadan (Imperial Bureau of Entomology) ; Cameroun : Buea (collection ITZINGER) ; Gabon (THOMSON) ; Congo belge : Kasai (Musée de Tervueren).

43. *flavomarmorata* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *flavomarmorata* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 162.

Proche de *virgata* Qued., mais s'en distinguant comme suit : L'épine latérale du pronotum plus large, non courbée en arrière au sommet ; les élytres sans tubercule postbasilaire et sans lignes longitudinales élevées.

Entièrement marbré de brun rougeâtre, de jaune et de gris blanchâtre. Les taches brun rougeâtre forment sur chaque élytre trois bandes transversales peu distinctes, dentelées ou même interrompues (une postbasilaire, une médiane et une au commencement du quart apical). Les tibias et les tarses en partie couverts de pubescence blanchâtre ; la partie apicale des tibias de pubescence brun foncé, les antennes de pubescence brune, la partie basilaire et apicale des articles de pubescence blanche.

Longueur : 12 à 13 millimètres. Largeur : 6 mm. à 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de Mayumbe-Zobé.

Localités : Congo belge : Mayumbe-Zobé, Barumbu, Eala, Lulua (Musée de Tervueren) ; Ouganda : Entebbe, Mwera (Imperial Bureau of Entomology).

44. *albovittata* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *albovittata* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 162.

Proche de *virgata* Qued., mais la stature un peu moins large ; les lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les joues ; le tubercule postbasilaire des élytres moins élevé et granulé.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence brun rougeâtre, variée de jaune. Sur chaque élytre, une bande transversale prémédiane, blanchâtre, peu large, qui remonte un peu vers le bord latéral et diverses mouchetures pareilles au tiers apical. Le dessous couvert de pubescence brun jaunâtre ; les jambes tachetées de brun foncé et de jaune blanchâtre ; les antennes brunes, la partie basilaire et apicale des articles annelée de blanchâtre.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Localité : Congo belge : Barumbu (Musée de Tervueren).

45. *irrorata* Jord.

Crossotus irroratus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 236.

Stature allongée. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂) ; le troisième et le quatrième article éparsement frangés en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu plus longs que les joues. Le front et les joues éparsement et assez grossièrement ponctués. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale, très large, très émoussée ; les sillons transversaux profonds ; le disque couvert de granules épars. Les élytres très allongés, médiocrement convexes, grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu à la base d'un assez grand tubercule arrondi ; le disque du pronotum et la base des élytres pourvus de longs poils érigés.

Brun rougeâtre. La tête, le pronotum et l'écusson couverts d'une pubescence jaune, mêlée d'un peu de gris ; trois bandes longitudinales brunes très étroites sur le disque du pronotum. Les élytres couverts d'une pubescence éparse grise ; chacun orné d'une large bande transversale médiane et de quelques petites taches au quart apical, de couleur brune, peu apparentes ; trois lignes longitudinales jaunes sur le disque, plus apparentes sur le fond gris. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris clair ; les côtés des sterna et des segments abdominaux, plutôt d'une pubescence brun jaunâtre, la partie apicale des tibias d'une pubescence brun foncé ; les antennes d'une pubescence brune, la base des articles (à partir du troisième article) d'une pubescence gris clair.

Longueur : 14 à 16 millimètres. Largeur 6 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par JORDAN sur des individus de Kuilu.

Localités : Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Kasai (collection ITZINGER).

46. *olivacea* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *olivacea* Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 218.

Proche d'*irrorata* Jord., mais les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; le front assez densément ponctué ; le disque du pronotum peu densément et assez grossièrement ponctué ; l'épine latérale recourbée au sommet.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun olivâtre. Les élytres marbrés de gris sur toute leur étendue ; le pronotum et les élytres sans bandes. La moitié basilaire des articles antennaires (à partir du quatrième) couverte d'une pubescence grisâtre clair.

Longueur : 12 mm. 1/2. Largeur : 6 millimètres.

Localité : Congo belge : Eala (Musée de Tervueren).

47. *unifasciata* Thoms.

Crossotus unifasciatus Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 178.
Crossotofrea trilineata Hintz 1913. Deuts. ent. Zs., p. 202.

Proche de *virgata* Qued., mais s'en distinguant comme suit : Les antennes un peu plus fortes et plus courtes ; les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; l'épine latérale du pronotum plus large, plus fortement courbée en arrière à son sommet ; les élytres plus convexes, plus densément ponctués ; le tubercule postbasilaire à peine indiqué ; pas de lignes longitudinales élevées ; les poils érigés très courts à la moitié postérieure des élytres.

Brun rougeâtre. La tête et le pronotum couverts d'une pubescence brun jaunâtre ; quelques taches sur la tête et trois lignes longitudinales sur le disque du pronotum sont de couleur brun rougeâtre foncé. Les élytres couverts d'une pubescence brun rougeâtre foncé, mouchetés de jaune, surtout à leur tiers apical ; chaque élytre pourvu d'une large bande transversale blanchâtre postmédiane, atténuée vers la suture et interrompue par des taches brunes. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence brun jaunâtre, la partie apicale des tibias d'une pubescence brun foncé, les antennes d'une pubescence brune, la partie basilaire des articles, à partir du troisième, d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 9 à 13 millimètres. Largeur : 4 à 6 millimètres.

Décrit par THOMSON sur des individus du Gabon. *Trilineata* Hintz est un synonyme.

Localités : Cameroun : Bipindi (HINTZ) ; Gabon (THOMSON) ; Congo belge : Barumbu, Lukolela, Sassa, Lenghi, Kondué (Musée de Tervueren), Mawambi (Musée de Vienne) ; Uganda : Entebbe, Budongo (Imperial Bureau of Entomology) ; Colonie du Kénia : Naïrobi (Imperial Bureau of Entomology).

48. *assimilis* Breun.

Frea (Crossotofrea) assimililis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 162.

Très proche de *unifasciata* Thoms., mais s'en distinguant ainsi : Le troisième article des antennes à peine plus long que le quatrième ; la tête et le disque du pronotum ponctués plus éparsément, mais plus grossièrement ; l'épine latérale plus longue et plus étroite ; les élytres ponctués plus grossièrement ; chacun pourvu d'une assez longue crête longitudinale basilaire (au lieu des tubercules).

Brun foncé, entièrement marbré de brun, de jaune d'ocre et de gris blanchâtre ; le pronotum sans bandes longitudinales sombres ; les élytres sans bande transversale blanchâtre, couverts à leur moitié postérieure d'un grillage de bandes jaune ochracé.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Localité : Congo belge : Mayumbe (Musée de Tervueren).

49. *tuberculata* Auriv.

Frea tuberculata Auriv. 1910. Ark. f. Zool. VII/3, p. 36.

Stature en ovale allongé. Les antennes beaucoup plus courtes que le corps (♀) ou presque aussi longues que le corps (♂), à peine frangées en dessous ; le scape médiocrement long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu plus longs que les joues. La tête assez grossièrement ponctuée. Le pronotum très large, pourvu d'une longue épine latérale assez mince, courbée fortement en arrière au sommet ; les sillons transversaux profonds ; le disque très grossièrement ponctué. Les élytres allongés, densément et assez grossièrement ponctués, chacun pourvu à l'extrême base d'un petit tubercule rond à côté de l'écusson.

Brun rougeâtre. La tête, le pronotum et l'écusson couverts d'une pubescence brun jaunâtre ou jaune d'ocre ; les élytres d'une pubescence brune, marbrés de jaune d'ocre, cette couleur plus dense à l'extrême base, au quart apical le long de la suture et sous forme de deux bandes transversales très dentelées et interrompues (une prémédiane et une postmédiane), formant parfois une sorte de réseau, qui couvre presque tout l'élytre. Le dessous et les jambes couverts de pubescence brun grisâtre, varié de jaune surtout aux côtés, les antennes d'une pubescence brune, la partie basilaire des articles, à partir du troisième, d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 12 à 13 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus de Buea.

Localités : Cameroun : Buea (Musée de Stockholm) ; île de Fernando-Po (Musée de Gênes) ; Congo belge : Équateur, Boende (Musée de Tervueren).

50. *maculata* Hintz

Frea maculata Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 201.

Proche de *tuberculata* Auriv., mais s'en distinguant comme suit : Les antennes plus longues, un peu moins longues que le corps (♀) ou un tiers plus longues (♂) ; les lobes inférieurs des yeux transversaux, moitié plus longs que les joues. La tête finement ponctuée. Le pronotum moins large ; l'épine latérale plus mince, moins fortement courbée en arrière à son bout ; le disque ponctué plus finement. Les élytres un peu plus courts ; les points moins gros ; le tubercule basilaire plus petit. Les jambes plus longues.

Brun rougeâtre, entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre ; de chaque côté, une tache brune sur le vertex, trois lignes longitudinales brunes irrégulières sur le disque du pronotum et quelques taches brunes sur les élytres, plusieurs de ces taches formant sur chaque élytre une large bande transversale postbasilaire.

Longueur : 9 à 11 millimètres. Largeur 4 mm. 1/2 à 5 millimètres.

Localités : Cameroun : Johann-Albrechtshöhe ; Guinée espagnole : Nkolentangan (HINTZ).

51. *ziczac* nov.

Proche de *tuberculata* Auriv., mais la tête très finement ponctuée ; l'épine latérale du pronotum plus large, émoussée au bout ; le disque éparsement et très finement granulé ; chaque élytre pourvu d'une crête médiocrement élevée au milieu de la base.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence jaunâtre, marbrée de gris. De chaque côté du disque du pronotum, une bande brun foncé légèrement courbée. Les élytres ornés de lignes longitudinales jaunes ; sur chaque élytre une ligne transversale brun foncé en zigzag. Les antennes couvertes d'une fine pubescence grise et annelés de blanchâtre à la base des articles à partir du cinquième article.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Type : une ♀ de la colonie du Kénia : Tsavo River, du Musée de Tervueren.

52. *griseomaculata* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *griseomaculata* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 162.

Proche de *tuberculata* Auriv., mais s'en distinguant ainsi : La stature plus allongée et plus étroite ; la tête plus finement ponctuée ; l'épine latérale du pronotum encore plus longue, son disque plus grossièrement ponctué, les élytres ponctués un peu plus grossièrement à la base.

Brun foncé. La tête, l'écusson et les élytres couverts de pubescence brun jaunâtre, le pronotum de pubescence gris bleuâtre clair. Chaque élytre pourvu de deux larges bandes transversales (une prémédiane et une postmédiane) gris bleuâtre et de quelques mouchetures de cette couleur au quart apical. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris bleuâtre variée de brun jaunâtre, les antennes de pubescence brune, la partie basilaire des articles, à partir du troisième, de pubescence gris bleuâtre.

Longueur : 10 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

D'*irrorata* Jord., de laquelle cette espèce se rapproche aussi, elle se distingue surtout par l'épine latérale du pronotum, beaucoup plus mince, et le manque de poils érigés à la base des élytres.

Localité : Congo belge : Sassa (Musée de Tervueren).

53. *lineata* Hintz

Crossotofrea lineata Hintz 1913. Deuts. ent. Zs., p. 202.

Stature en ovale allongé, large. Les antennes un peu plus longues que le corps (♂) ou beaucoup moins longues que lui (♀), non frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre, légèrement claviforme ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, aussi longs que les joues. Le front et les joues finement ponctués. Le pronotum très large, pourvu d'une grande et large épine latérale, qui est fortement recourbée à son bout ; les sillons transversaux très peu profonds ; le disque assez finement ponctué. Les élytres allongés, très grossièrement ponctués, granulés aux épaules ; les points plus fins vers le sommet ; les épaules anguleusement proéminentes ; chaque élytre pourvu à l'extrême base d'une assez longue crête longitudinale, très haute, surmontée de poils, et, à la moitié postérieure, de quatre lignes longitudinales très peu élevées, qui se réunissent toutes avant le sommet.

Brun foncé, couvert d'une pubescence jaunâtre, variée d'un peu de blanchâtre surtout sur le disque des élytres et de brun foncé. Deux bandes transversales brun foncé sur le front ; de chaque côté, une bande longitudinale brun foncé courbée en dehors sur le disque du pronotum et une autre droite sur ses parties latérales. Sur chaque élytre, l'épaule, la crête basilaire, le bord latéral de la base jusqu'au milieu, une étroite bande transversale médiane, très dentelée, qui n'atteint pas la suture et s'élargit vers le bord latéral, une autre bande prémédiane et une bande postmédiane (ces deux bandes un peu moins distinctes) et quelques taches le long de la suture et à la partie apicale, sont également brun foncé ; les lignes longitudinales élevées des élytres sont jaune d'ocre. Le dessous et les jambes couverts de pubescence brun jaunâtre, tachetés de brun foncé, les antennes couvertes de pubescence brun foncé, la partie basilaire et apicale des articles de pubescence blanchâtre.

Longueur : 11 à 14 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par HINTZ sur des individus de Kondué.

Localités : Congo belge : Elisabethville, Bambesa, Kondué, Kafakumba (Musée de Tervueren) ; Angola : Benguela (Muséum de Paris) ; Transvaal : Zoutpansberg (Musée Britannique).

54. *ædificatoria Hintz*

Crossotus ædificator Hintz 1910. Deuts. ent. Zs., p. 576.

Très proche de *lineata Hintz*, mais les épaules plus arrondies, non anguleusement proéminentes ; la crête élytrale n'atteint pas tout à fait la base ; la bande médiane dentelée foncée des élytres non élargie vers le bord latéral, mais prolongée jusqu'à la suture.

Décrit par HINTZ sur un individu du Kilimandjaro.

Localités : Territoire du Tanganyika : Kilimandjaro (Musée de Bruxelles) ; Transvaal : Pienaars River (Musée de Prétoria).

55. *lata Breun.*

Frea (Crossotofrea) lata Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 163.

Très proche de *lineata Hintz*, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes encore plus courtes, ne dépassant pas le milieu des élytres (♀), frangées en dessous ; le scape non claviforme. Les joues distinctement moins longues que les lobes inférieurs des yeux. Le front et les joues ponctués plus grossièrement. Le pronotum moins large, pourvu de chaque côté du milieu du disque d'une bosse obtuse ; l'épine latérale plus courte. La crête basilaire des élytres moins haute ; les épaules moins proéminentes ; pas de lignes longitudinales élevées sur les élytres. Toute la surface pourvue de poils érigés plus longs.

Brun foncé, entièrement couvert d'une pubescence jaune olivâtre, variée d'un peu de brun rougeâtre, cette couleur brun rougeâtre formant une assez large bande transversale au milieu des élytres. Pas de dessins bruns sur la tête ou le pronotum. La partie apicale des tibias et le troisième et le quatrième article des antennes brun foncé.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Localité : Congo belge : Eala (Musée de Tervueren).

56. *flava Breun.*

Frea (Crossotofrea) flava Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 163.

Proche de *lineata Hintz*, mais s'en distinguant ainsi : Le scape non claviforme ; la tête assez grossièrement ponctuée ; le pronotum un peu moins large ; les sillons transversaux plus profonds ; l'épine latérale un peu plus mince ; les élytres non granulés aux épaules, sans lignes longitudinales un peu élevées ; la crête basilaire beaucoup moins élevée ; les épaules moins proéminentes.

Brun foncé, couvert d'une pubescence brun jaunâtre clair, variée de gris blanchâtre ; la couleur grise dominant sur les parties latérales du pronotum, sur le disque des élytres après l'écusson et en forme de bande transversale au commencement du quart apical. Une bande longitudinale au milieu du pronotum, très élargie vers sa base, et quelques taches près de la suture après le milieu des élytres, sont de couleur brun rougeâtre foncé. Le dessous, les jambes et les deux premiers articles des antennes couverts de pubescence brun jaunâtre, la partie apicale des tibias de pubescence brun foncé, la partie basilaire des articles antennaires, à partir du troisième, de pubescence blanchâtre.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de Buta.

Localités : Congo belge : Bas Uelé, Buta (Musée de Tervueren), Forêt de Mawambi (Musée de Vienne).

57. *unipunctata nov.*

Stature allongée, trapue. Les antennes moitié plus longues que le corps (♂), éparsément frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, un peu plus longs que les joues. La tête densément et très finement ponctuée. Le pronotum large, très densément et assez grossièrement ponctué, pourvu d'une grande épine latérale large et émoussée, rapprochée de la base, et de sillons transversaux assez profonds ; la partie médiane du disque, entre ces sillons, très convexe ; l'écusson large, trapézoïdal. Les élytres allongés, médiocrement convexes, légèrement rétrécis dès les épaules, largement arrondis au sommet, très densément et finement ponctués (très finement vers le sommet), très finement granulés à la base ; sur chaque élytre une courte crête longitudinale peu élevée au milieu de la base et une dépression prémédiane, qui s'étend en arc en avant de la suture vers l'épaule.

Noir, couvert d'une pubescence jaune olivâtre, les parties latérales du pronotum et des sternites et l'abdomen d'une pubescence dense jaune pâle ; les points du pronotum et des élytres interrompent cette pubescence ; sur chaque élytre une petite tache discale, postmédiane, ronde jaune pâle, un peu rapprochée du bord latéral.

Longueur : 15 mm. 1/2. Largeur : 6 mm. 1/2.

Type du Congo belge : Galli-koko, de la collection LE MOULT.

58. *rosacea* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *rosacea* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 163.

Stature! allongée. Les antennes ne dépassant pas le milieu des élytres (♀) ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Le front grossièrement ponctué. Le pronotum relativement étroit, pourvu d'une assez longue épine latérale droite ; les sillons transversaux peu profonds ; le disque éparsément et très grossièrement ponctué. Les élytres beaucoup plus larges que le pronotum, très allongés, ponctués très densément et grossièrement à la moitié antérieure, plus finement à la moitié postérieure ; chaque élytre pourvu d'une crête longitudinale peu élevée au milieu de la base.

Brun rougeâtre foncé. La tête et le pronotum couverts d'une pubescence brune ; de chaque côté du disque du pronotum, une large bande longitudinale jaune. Les élytres couverts d'une pubescence grise éparsée et ornés au tiers basilaire et au tiers apical d'étroites bandes et taches rosâtres ainsi que d'une étroite bande transversale médiane ondulée, qui n'atteint pas la suture. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence brun jaunâtre et variés de gris ; la partie apicale des tibias et les tarsi, de pubescence brun foncé, les antennes de pubescence brun rougeâtre, la partie basilaire et apicale des articles, à partir du troisième, de pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de Kapanga.

Localités : Congo belge : Lulua : Kapanga, Eala (Musée de Tervueren).

59. *flavovittata* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *flavovittata* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 163.

Stature en ovale allongé, large et trapue. Les antennes aussi longues que le corps (♂) ou beaucoup moins longues que lui (♀), éparsément frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, un peu moins longs que les joues. Le front et les joues assez grossièrement ponctués. Le pronotum grand, bombé, pourvu d'une très petite épine latérale pointue ; les sillons transversaux peu profonds ; le disque éparsément et finement ponctué au milieu, assez grossièrement ponctué aux côtés. Les élytres convexes, grossièrement ponctués au quart basilaire, ensuite finement ; chaque élytre pourvu d'un petit tubercule rond à la base.

Brun foncé, couvert d'une pubescence brun olivâtre, moucheté de jaune clair, cette couleur jaune formant sur chaque élytre une large bande transversale prémédiane et des taches plus denses à leur moitié postérieure. Le dessous et les jambes couverts de pubescence brun grisâtre, le mésosternum et le métasternum de pubescence jaune ; les jambes tachetées de jaune ; la partie apicale des tibias brun foncé ; les antennes brunes ; la partie basilaire des articles gris blanchâtre, à partir du troisième.

Longueur : 9 à 13 millimètres. Largeur : 4 à 7 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Helwo.

Localités : Congo belge : Uellé, Dingila, Kasaï, Helwo, Katanga (Musée de Tervueren).

60. *schoutedeni* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *schoutedeni* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 164.

Stature en ovale allongé, large. Les antennes ne dépassant que peu le milieu des élytres (♂) ou n'atteignant pas leur sommet (♀), densément frangées de longs poils en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs transversaux, beaucoup plus longs que les joues. La tête finement ponctuée. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale large et émoussée au sommet, un peu courbée en arrière au sommet ; les sillons transversaux à peine indiqués ; le disque assez finement ponctué. Les élytres convexes, grossièrement ponctués, granulés à la base, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu d'une haute crête longitudinale postbasilaire, surmontée de poils noirs ; après l'épaule quelques très petits tubercules alignés, à la moitié postérieure quelques lignes irrégulières un peu élevées. Toute la surface couverte de courts poils noirs érigés.

Brun rougeâtre. Le front, les parties latérales du pronotum (pas même tout à fait jusqu'à l'épine latérale) et une large bande longitudinale au bord latéral de chaque élytre, s'étendant de la base jusque un peu au delà du milieu, le sommet de chaque élytre, et quelques taches près de la suture à la moitié antérieure, sont couverts d'une pubescence brun rougeâtre foncé ; le vertex, le disque du pronotum et les élytres marbrés de gris et de blanchâtre, variés d'un peu de jaune (surtout sur l'écusson et la base des élytres). Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence brun rougeâtre foncé, la partie apicale des cuisses et la partie basilaire des tibias, d'une pubescence jaunâtre. Les antennes brun rougeâtre foncé, les deux premiers articles et la partie basilaire et apicale des articles suivants couverts d'une pubescence jaunâtre.

Longueur : 13 à 14 millimètres. Largeur : 6 mm. à 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus de Buta.

Localités : Congo belge : Buta, Maniema (Musée de Tervueren).

61. *barbertoni* Dist.

Eumimetes barbertoni Dist. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, p. 375 ; 1904. Ins. Transvaal, p. 145, pl. XIV, fig. 6.

Stature en ovale allongé, trapue. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀), ou aussi longues que lui (♂), non frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front et les joues éparsement et assez grossièrement ponctués. Le pronotum large, bombé, éparsement et peu grossièrement ponctué, pourvu d'une épine latérale minimale émousée ; les sillons transversaux peu profonds ; les antérieurs à peine indiqués ; de chaque côté du milieu du disque une bosse obtuse ; l'écusson très large. Les élytres convexes, très grossièrement ponctués à la moitié antérieure, les points un peu moins gros vers le sommet ; chaque élytre pourvu d'une crête longitudinale très peu élevée au milieu de la base.

Brun rougeâtre, entièrement marbré de brun et de blanchâtre. Sur chaque élytre, une large bande transversale blanche un peu avant le milieu. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris blanchâtre, tachetés de brun. Les antennes couvertes de pubescence brune ; la partie basilaire des articles annelée de blanchâtre.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par DISTANT sur des individus de Barberton.

Localités : Transvaal : Barberton ; Natal : Durban (Musée Britannique).

62. *capensis* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *capensis* Breun. Festschr. E. Strand IV, p. 219.

Très proche de *barbertoni* Dist., mais l'épine latérale du pronotum un peu plus développée ; le pronotum plus densément ponctué ; les élytres plus finement ponctués aussi après les épaules.

Entièrement marbré de jaunâtre au lieu de blanc ; la bande transversale claire des élytres moins distincte ; elle remonte obliquement vers le bord latéral.

Décrit par moi sur un individu de la colonie du Cap.

Localités : Colonie du Cap : East Somerset (Musée Britannique), East London (Muséum de Paris).

63. *lundbladi* Breun.

Frea (*Crossotofrea*) *lundbladi* Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 164.

Stature très allongée, relativement étroite. Les antennes dépassant peu le milieu des élytres (♀), non frangées en dessous ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, moitié plus longs que les joues. Le front densément ponctué. Le pronotum bombé, transversaux très peu profonds ; l'écusson moitié plus large que long. Les élytres très allongés, parallèles, convexes, densément et assez grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu d'une courte crête longitudinale discale postbasilaire assez haute et de quelques lignes longitudinales un peu élevées sur le disque.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence roussâtre. Sur chaque élytre, une large bande transversale gris clair, un peu avant le milieu ; un peu de gris clair aussi sur le disque du pronotum et au tiers apical des élytres ; la crête longitudinale et une bande transversale au bord postérieur de la bande grise, n'atteignant pas la suture, sont couverts de pubescence brun foncé ; le dessous et les jambes, de pubescence brun rougeâtre et variés d'un peu de gris blanchâtre ; les cuisses (au milieu), la partie apicale des tibias, ainsi que les tarses, couverts de pubescence brun noirâtre, la moitié apicale des articles antennaires, à partir du troisième, de pubescence brun foncé, le reste des antennes de pubescence blanchâtre.

Longueur : 8 mm. 1/2. Largeur : 3 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Salisbury.

Localités : Rhodésie : Salisbury (Musée de Stockholm) ; Transvaal : Pienaars River (Musée de Prétoria).

Genre 5 : *Freopsis* Hintz

Freopsis Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192, 200.

Stature en ovale allongé. Les antennes courtes, fines, ne dépassant que peu le milieu des élytres, densément frangées en dessous ; les quatre premiers articles un peu grossis sur toute leur étendue ; les articles suivants très courts ; le scape de longueur médiocre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, très peu élevés. Les yeux finement facettés, très fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux.

Le pronotum large, pourvu d'une très longue et large épine latérale, qui est fortement courbée en arrière à son bout, de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs profonds ; le disque convexe ; l'écusson très large.

Les élytres allongés, médiocrement convexes, rétrécis dès les épaules, arrondis au sommet, pourvus de quelques lignes longitudinales discales un peu élevées à la moitié postérieure et de poils noirs érigés, plus longs à la moitié antérieure ; chaque élytre étiré entre l'écusson et le calus huméral en une crête, qui couvre en arc aplati la base du pronotum.

La tête rétractile.

La saillie prosternale de la hauteur des hanches, y formant une crête transversale tranchante ; la saillie mésosternale très large, plus large que longue, tronquée verticalement à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre.

Type : *leucostictica* White. Une seule espèce de l'Afrique centrale.

AURIVILLIUS cite dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING une autre espèce, *albomaculata* Hintz, mais elle est synonyme de *leucostictica* White, rangé dans le Catalogue parmi les *Frca.*

1. *leucostictica* White

Phymasterna leucostictica White 1858. Proc. zool. Soc. Lond. XXVI, p. 402, pl. LIII, fig. 3.

Freopsis albomaculata Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 200.

m. *nebulosa* nov.

Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues ; toute la tête finement ponctuée ; le disque du pronotum à peine ponctué ; les élytres grossièrement ponctués, les points plus ou moins alignés, plus fins vers le sommet, granulés à la base.

Noir ; couvert d'une pubescence noirâtre et parsemé de taches rondes blanches très nettes, en partie alignées sur les élytres. La tête, le pronotum et le dessous couverts d'une épaisse pubescence blanche, les jambes et les articles 5 à 11 des antennes d'une pubescence gris blanchâtre, les quatre premiers articles variés d'un peu de gris.

Longueur : 12 à 14 millimètres. Largeur 5 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par WHITE sur des individus de Sierra-Leone. *Albomaculata* Hintz est un synonyme.

m. *nebulosa* nov.

Toutes les taches blanches de la surface plus grandes, peu nettes, en partie confluentes.

Type du Gabon dans la collection ITZINGER.

Localités : Sierra-Leone, Côte de l'Or (Musée Britannique) ; Gabon (collection ITZINGER) ; Congo belge : Bas-Uélé ; Buta ; Kasai : Kondué ; Haut-Tshuapa : Yolo (Musée de Tervueren).

Genre 6 : *Mimiculus* Jord.

Mimiculus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 239.

Ne diffère de *Frea* Thoms. que par le manque d'épine latérale au pronotum ; la saillie mésosternale est légèrement inclinée à son bord antérieur (selon JORDAN).

Type : *maculatus* Jord. Une espèce du Gabon.

AURIVILLIUS cite deux espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. Une d'elles, *cervinus* Hintz, appartient au genre *Chariesthes* Chevrl. (tribu des *Tragocephalini*).

1. *maculatus* Jord.

Mimiculus maculatus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 239.

Le front et le pronotum éparsement et finement ponctués, les élytres peu densément et grossièrement ponctués.

Noir ; couvert d'une pubescence grise. Le pronotum noir aux côtés du disque. Chaque élytre orné de deux grandes taches irrégulières brun foncé (une couvrant l'épaule, l'autre sur le disque après le milieu) et de quelques petites taches pareilles au milieu, près de la suture. La partie médiane du troisième article des antennes et la partie apicale des quatrième, sixième, huitième, dixième et onzième articles sont noires.

Longueur : 9 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

Localité : Gabon : Kuilu (JORDAN).

Je ne connais pas cette espèce ; la description est faite d'après la littérature.

Genre 7 : *Cincinnatiata* Jord.

Cincinnatiata Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 238.

Stature allongée. Les antennes fines, un quart plus longues que le corps chez les ♀♀, moitié plus longues que le corps chez les ♂♂, assez densément frangées en dessous ; le scape très long, mince ; le troisième article un

peu plus long que le quatrième, distinctement plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, très peu élevés. Les yeux subdivisés ; les lobes inférieurs un peu plus longs que larges ; les joues élargies latéralement et arrondies, presque deux fois plus longues que les lobes inférieurs des yeux.

Le pronotum court et très large, inerme aux côtés, pourvu d'un sillon transversal assez profond non loin du bord antérieur et du bord postérieur ; l'écusson assez large, arrondi au sommet.

Les élytres convexes, allongés, arrondis au sommet, les épaules proéminentes.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très étroite, beaucoup moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale médiocrement large, beaucoup moins haute que les hanches, légèrement inclinée vers son bord antérieur ; les jambes assez longues ; les cuisses claviformes.

Toute la surface couverte de longs poils érigés noirs.

Type : *fasciata* Jord. Trois espèces de l'Afrique centrale.

AURIVILLIUS cite une espèce au Catalogue de JUNK-SCHENKLING. J'en ai décrit depuis deux autres.

1. *konduensis* Breun.

Cincinnatia konduensis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 165.

Les élytres granulés à la base, densément et finement ponctués, les points alignés en partie, interrompus par des lignes longitudinales un peu élevées et entremêlés de points plus gros.

Noir ; entièrement couvert d'une fine pubescence éparsse brun jaunâtre ou jaune grisâtre. Les élytres couverts d'une telle pubescence plus dense, interrompue par les gros points, de manière qu'elle forme une sorte de grillage, où cette pubescence est réduite à une large bande transversale prémédiane et de nombreuses taches au quart apical. Le métasternum également couvert d'une dense pubescence jaune ou blanche, les antennes d'une pubescence brun foncé, la base des articles (à partir du troisième) d'une pubescence jaune grisâtre.

Longueur : 11 à 16 millimètres. Largeur : 4 à 6 millimètres.

Localité : Congo belge : Sankuru, Kondué (Musée de Tervueren).

2. *fasciata* Jord.

Cincinnatia fasciata Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 238.

m. *infasciata* nov.

ab. *leucothorax* nov.

Les élytres granulés à la base, densément et finement ponctués et entremêlés de gros points, les points en partie alignés, séparés par les lignes longitudinales un peu élevées.

Noir ; la tête et le pronotum couverts d'une pubescence blanc jaunâtre, très éparsse. Les élytres mouchetés de blanc ; sur chaque élytre une bande transversale blanche prémédiane, qui n'atteint souvent pas la suture et qui est souvent bordée de noir en avant. Le dessous et les jambes couverts d'une fine pubescence gris blanchâtre très éparsse, le métasternum d'une pubescence blanche dense, les antennes d'une pubescence brun noirâtre.

Longueur : 12 à 16 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par JORDAN sur des individus de Kuilu.

m. *infasciata* nov.

Les élytres entièrement densément mouchetés de blanc, mais sans bande transversale blanche.

Type : un ♂ du Cameroun dans la collection ITZINGER.

ab. *leucothorax* nov.

Comme m. *infasciata mihi*, mais tout le pronotum couvert d'une dense pubescence blanche.

Type : un ♂ du Cameroun : Balanga, du Musée de Tervueren.

Localités : Cameroun : Balanga ; Gabon : Benito (Musée de Tervueren), Kuilu (JORDAN).

3. *schoutedeni* Breun.

Cincinnatia schoutedeni Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 165.

m. *transversefasciata* nov.

Proche de *fasciata* Jord., mais les élytres plus finement ponctués, les intervalles des points à peine élevés, les gros points un peu irréguliers.

Noir ; toute la surface couverte d'une pubescence gris verdâtre, variée de jaunâtre, surtout au bord latéral des élytres. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence grise, tachetée de noir, les antennes d'une pubescence noirâtre, la partie basilaire des articles antennaires (à partir du troisième) annelée de blanchâtre.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par moi sur des individus de Flandria.

m. *transversefasciata nov.*

Sur chaque élytre une assez large bande transversale postbasilaire noire et une autre pareille blanche après elle, atténuée vers la suture et interrompue par les gros points.

Type de Loango au Muséum de Paris.

Localités : Congo belge : Équateur, Flandria (Musée de Tervueren), Loango (Muséum de Paris).

Genre 8 : **Megalofrea Auriv.**

Megalofrea Auriv. 1920. Ark. f. Zool. XIII/9, p. 21.

Stature en ovale plus ou moins allongé. Les antennes assez fines, à peu près aussi longues que le corps (♀♀) ou moitié plus longues que lui (♂♂), densément frangées en dessous, surtout au onzième article chez les ♂♂ ; le scape assez long ; le troisième article plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, de hauteur médiocre. Les yeux assez finement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs petits, beaucoup moins longs que les joues.

Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale émoussée, rapprochée de la base, et d'un tubercule obtus avant elle, plus ou moins indiqué, ainsi que de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs, dont le premier antérieur est effacé sur le disque ; de chaque côté du milieu du disque, une bosse obtuse, parfois partagée en deux par un sillon transversal ; l'écusson très large.

Les élytres allongés, convexes, rétrécis dès les épaules, arrondis au sommet ; chaque élytre pourvu de fascicules de poils noirs, dont un discal postbasilaire et un autre pareil plus grand sur le calus huméral.

La tête rétractile.

La saillie prosternale assez large, aussi haute que les hanches, très courte, arquée ; la saillie mésosternale moins large que longue, arrondie ou inclinée ou tronquée à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre, assez minces.

Type : *humeralis Vollenh.* Quatre espèces de Madagascar.

AURIVILLIUS cite dix espèces au Catalogue de JUNK-SCHENKLING.

Je n'en admetts que quatre, en rangeant *attenuata Fairm.*, *distincta Fairm.*, *rufonubila Fairm.* et *tenuepunctata Fairm.* comme morphæ d'*humeralis Vollenh.*, *sparsuticollis Fairm.* comme morpha de *bioculata Fairm.* et *decorse Fairm.* comme aberration de couleur de *sparsuticollis Fairm.*

I. *humeralis Vollenh.*

Phymasterna ? humeralis Vollenh. 1869. Rech. Faune Madag. V, p. 10, pl. II, fig. 1.

Phymasterna sexpunctata Fairm. 1871. Ann. Soc. ent. Fr. (5) I, p. 65.

Eumimetes humeralis Gah. 1890. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, p. 464.

Eumimetes sexpunctatus Künck. 1890. Grandid. Hist. Madagasc., pl. 51, fig. 5.

Eumimetes humeralis Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 386.

m. *distincta Fairm.*

Phymasterna distincta Fairm. 1871. Ann. Soc. ent. Fr. (5) I, p. 65.

Eumimetes distinctus Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 386.

m. *attenuata Fairm.*

Eumimetes attenuatus Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 386.

m. *tenuepunctata Fairm.*

Eumimetes tenuepunctatus Fairm. 1902. Ann. Soc. ent. Fr. LXXI, p. 387.

m. *rufonubila Fairm.*

Eumimetes rufonubilus Fairm. 1896. Ann. Soc. ent. Belg. XL, p. 386.

Le troisième article des antennes distinctement plus long que le quatrième. Le front et le dessous du corps finement ponctués. L'épine latérale du pronotum très large, émoussée ; les côtés de son disque finement granulés. Sur chaque élytre, trois grands fascicules de poils noirs : un postbasilaire discal, un au calus huméral et un postmédian discal ; les poils des fascicules sont un peu rapproché du bord latéral ; un très petit tubercule à la base avant le postbasilaire ; les poils des fascicules sont courts. La saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris bleuâtre, et orné de dessins brun rougeâtre tachetés de jaune sur les joues, le bord antérieur du vertex, le bord antérieur et l'extrême base du pronotum, de chaque côté du milieu de son disque, autour des épines latérales et dans l'espace autour des trois grands fascicules de poils des élytres (près du

postmédian parfois seulement au bord postérieur). En outre, sur chaque élytre, deux grandes taches de même couleur au milieu du disque (une prémédiane et une préapicale) et diverses petites taches semblables à l'extrême base et le long du bord latéral et de la suture. Les côtés des sterna et des segments abdominaux également couverts de pubescence brun rougeâtre et tachetés de jaune.

Longueur : 11 à 20 millimètres. Largeur : 5 à 9 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par VOLLENHOF sur des individus de Madagascar. *Sexpunctata Fairm.* est un synonyme.

m. *distincta Fairm.*

Les dessins de la surface sont jaunes (non brun rougeâtre et tachetés de jaune) ; la tache prémédiane et la tache préapicale des élytres élargies en bandes transversales ; le long de la suture se trouvent moins de taches.

m. *attenuata Fairm.*

Comme m. *distincta Fairm.*, mais les trois grands fascicules de poils noirs des élytres cernés régulièrement de jaune d'ocre et ensuite encore une fois de jaune.

m. *tenuepunctata Fairm.*

Comme m. *distincta Fairm.*, mais tous les dessins jaunes plus étroits, moins apparents ; les fascicules de poils noirs sont plus petits.

m. *rufonubila Fairm.*

Comme la forme typique, mais toute la pubescence plutôt gris blanchâtre ou jaunâtre ; les dessins brun rougeâtre plus étendus sur la tête et le pronotum ; la tache prémédiane et la tache préapicale des élytres élargies en bandes transversales ; le fascicule de poils du calus huméral souvent un peu plus petit, le fascicule postmédian bordé de brun rougeâtre seulement à son bord postérieur.

Je ne peux considérer toutes ces formes comme espèces à part, les trouvant liées ensemble par des formes transitoires.

Localités : Madagascar : Nossi-Bé, Suberbieville, Antsianaka, Madiwalo (FAIRMAIRE), Diego-Suarez, Fianarantsoa, Soalala, Baie d'Antongil (Muséum de Paris).

2. *perrieri Fairm.*

Eumimetes perrieri Fairm. 1899. Ann. Soc. ent. Fr. LXVIII, p. 120.

Proche d'*humeralis Voll.*, mais les dessins tout autres ; les trois fascicules de poils sur chaque élytre plus petits, le tubercule basilaire à peine indiqué.

Le front couvert d'une pubescence grise et parsemé de petites taches brunes ; les joues, l'occiput, le pronotum, le quart basilaire des élytres, leur extrême bord latéral et sutural et les côtés des sterna et des segments abdominaux, sont densément réticulés de brun noirâtre et de blanc jaunâtre ; les trois autres quarts des élytres, le milieu des sterna et de l'abdomen, les jambes et les antennes couverts d'une dense pubescence gris clair.

Longueur : 14 à 20 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 9 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus de la vallée de Betsiboka.

Localités : Madagascar : Vallée de Betsiboka, Suberbieville (Muséum de Paris).

3. *bioculata Fairm.*

Eumimetes bioculatus Fairm. 1889. Ann. Soc. ent. Belg. XXXIII, Bull., p. 96.

Eumimetes albisparsus Gah. 1890. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, p. 464.

Eumimetes bioculatus Fairm. 1894. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVIII, p. 152.

m. *bioculata nov.*

m. *sparsuticollis Fairm.*

Eumimetes sparsuticollis Fairm. 1897. Ann. Soc. ent. Belg. XLI, p. 401.

ab. *decorsi Fairm.*

Eumimetes decorsi Fairm. 1901. Not. Leiden Mus. XXIII, p. 81.

Proche d'*humeralis Voll.*, mais le dessous du corps grossièrement ponctué ; les poils des fascicules des élytres sont longs, les dessins tout autres. La tête, le pronotum et l'écusson couverts d'une pubescence uniforme gris foncé ; le pronotum et l'écusson étroitement bordés de jaune. Les élytres couverts de pubescence gris foncé et parsemés de très nombreuses petites taches blanc jaunâtre ou jaunes ; souvent une tache jaune un peu plus grande à la place du fascicule postmédian, qui est complètement atrophié. Le dessous, les jambes et les antennes également couverts de pubescence gris foncé, le dessous tacheté de jaune d'ocre.

Longueur : 14 à 23 millimètres. Largeur 6 mm. 1/2 à 10 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par FAIRMAIRE sur des individus de Madagascar. *Albisfarsa Gah.* est un synonyme.

m. *trioculata nov.*

Comme la forme typique, mais un petit fascicule postmédian de poils noirs se trouve sur chaque élytre. Type : une ♀ de Suberbieville, de la collection ITZINGER. Une grande série dans la collection STAUDINGER.

m. *sparsuticollis Fairm.*

Comme m. *trioculata mihi*, mais toute la surface et le dessous plus densément tachetés de gris blanchâtre : ces taches en partie confluentes.

ab. *decorsi Fairm.*

Comme m. *sparsuticollis Fairm.*, mais les taches de couleur jaune, souvent encore plus confluentes.

Localités : Madagascar : Suberbieville, Plateau d'Androy, etc. (Muséum de Paris).

4. *cinerascens Fairm.*

Eumimetes cinerascens Fairm. 1901. Not. Leiden Mus. XXIII, p. 81.

Le front éparsément et assez grossièrement granulé. Le troisième article des antennes à peine plus long que le quatrième. L'épine latérale du pronotum plus mince ; les côtés du disque éparsément et grossièrement ponctués. Le dessous et les cuisses grossièrement ponctués ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Le fascicule postmédian de poils des élytres très petit.

Noir. La tête couverte d'une pubescence blanche ; une grande tache au milieu du vertex et, de chaque côté, a partie après les yeux, couvertes d'une pubescence brun foncé et tachetées de blanc. Le pronotum couvert de pubescence blanche ; une très large bande longitudinale médiane et la zone inférieure de ses parties latérales couvertes de pubescence brun foncé et tachées de blanc ; l'écusson blanc, pourvu d'une large bande longitudinale brune au milieu. Les élytres couverts de pubescence gris clair, leur quart basilaire de pubescence brun foncé, tacheté de blanc. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre, les côtés des sterns et des segments abdominaux de pubescence jaune d'ocre et parsemés de petites taches dénudées. Les antennes couvertes de pubescence gris blanchâtre, la moitié apicale des articles trois et suivants, d'une pubescence brune.

Longueur : 15 à 18 millimètres. Largeur : 7 à 8 millimètres.

Localité : Madagascar : Plateau d'Androy (FAIRMAIRE, Muséum de Paris).

Genre 9 : **Leucographus** *Wat.*

Leucographus *Wat.* 1878. Cist. Ent. II, p. 295.

Stature en ovale plus ou moins allongé, assez large. Les antennes médiocrement fortes, assez courtes, densément frangées en dessous, chez les ♂♂ ; le dernier article couvert de longs poils en dessous ; le troisième article distinctement plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux assez finement facettés, fortement échancrés.

Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale et d'une bosse obtuse de chaque côté du milieu du disque, ainsi que d'un sillon transversal peu profond non loin de la base et du bord antérieur.

Les élytres plus ou moins allongés, raideement inclinés vers la base, rétrécis dès les épaules, qui sont proéminentes, arrondis au sommet.

La tête rétractile.

La saillie prosternale large, de la hauteur des hanches, régulièrement arquée à son bord antérieur, où elle s'élargit latéralement et couvre en partie les hanches, pourvue d'un tubercule à son bord postérieur où elle est tronquée verticalement ; la saillie mésosternale très large (beaucoup plus large que longue), tronquée verticalement à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, assez fortes ; les cuisses non claviformes.

Type : *albovarius* *Wat.* Trois espèces de Madagascar.

AURIVILLIUS cite cinq espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING.

Je n'en admets que trois, et range *murinus* *All.* comme morpha d'*albovarius* *Wat.* et *nigropictus* *Fairm.* comme morpha de *variegatus* *Wat.*

1. *albovarius* *Wat.*

Leucographus albovarius *Wat.* 1878. Cist. Ent. II, p. 296.

Leucographus albovarius *Künck.* 1890. Grandid. Hist. Madagasc. Col., pl. 51, fig. 8.

m. *murina* *All.*

Leucographus murinus *All.* 1900. Bull. Mus. Paris V, p. 367.

Stature en ovale allongé, large. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues

que lui (δ) ; le scape assez fort ; le troisième article de la longueur du quatrième. Les lobes inférieurs des yeux plus larges que longs, aussi longs que les joues ; le front éparsément et grossièrement ponctué. Le pronotum à peu près deux fois plus large que long, pourvu d'une grande épine latérale large et émoussée et, de chaque côté du milieu, d'une bosse à peine indiquée ; les côtés du disque éparsément ponctués ; l'écusson court et large, triangulaire. Les élytres larges, raideement inclinés vers l'écusson, densément et assez finement ponctués ; les points après les épaules gros, mais peu profonds ; les épaules médiocrement proéminentes.

Noir ; couvert d'une pubescence brun grisâtre foncé, orné des dessins blancs ou jaunâtres suivants : une bande transversale entre les tubercules antennifères ; trois bandes longitudinales étroites, souvent interrompues, sur le disque du pronotum, ainsi qu'une autre pareille plus large au-dessous des épines latérales ; une bande longitudinale au milieu de l'écusson ; sur chaque élytre de nombreuses petites taches au tiers basilaire ; une étroite bande, en partie interrompue, s'étendant obliquement du bord latéral (à la fin du tiers basilaire) jusqu'à la suture (qu'elle atteint un peu avant le milieu) ; quelques petites taches, disposées en bande transversale postmédiane interrompue et en une bande préapicale, et quelques taches le long de la suture. Le dessous et les jambes couverts de pubescence brun noirâtre ; les côtés des sterns, les cuisses et les tarsi tachetés de blanchâtre ; les côtés de l'abdomen tachetés de gris bleuâtre ; les tibias, sauf leur partie apicale, couverts de pubescence blanche ; les antennes couvertes d'une pubescence brun foncé ; les deux premiers articles et la partie basilaire des articles suivants, d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 20 millimètres. Largeur : 10 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par WATERHOUSE sur des individus de Madagascar.

m. *murina* All.

Entièrement couvert d'une pubescence gris verdâtre ; les dessins blanchâtres moins distincts. Faute de différences structurelles je considère *murina* comme morpha d'*albovarius* Wat.

Localités : Madagascar : Antsianaka, Fort-Dauphin (Muséum de Paris).

2. *variegatus* Wat.

Leucographus variegatus Wat. 1878. Cist. Ent. II, p. 368.

Coptops pyramidalis Fairm. 1883. Le Natur. V, p. 365 ; 1884. Stett. ent. Ztg. XLV, p. 139 ; 1886. Ann. Soc. ent. Fr. (6), VI, p. 86.

Leucographus variegatus + *pyramidalis* Künck. 1890. Grandid. Hist. Madag. Col., pl. 51, fig. 7, pl. 53, fig. 8.

m. *nigropicta* Fairm.

Leucographus nigropictus Fairm. 1886. Ann. Soc. ent. Fr. (6) VI, p. 85.

Stature en ovale très allongé. Les antennes à peu près aussi longues que le corps (φ) ou un quart plus longues que lui (δ) ; le scape assez mince ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, beaucoup plus longs que les joues. Le pronotum à peine une fois et demie plus large que long, pourvu d'une assez petite épine latérale pointue ; de chaque côté du milieu du disque, un tubercule conique ; l'écusson un peu plus large que long, arrondi au bout. Les élytres allongés, parallèles, raideement inclinés vers la base, grossièrement et profondément ponctués à la moitié antérieure, les points plus épars et plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu d'un tubercule conique à la suture après l'écusson ; les épaules très proéminentes.

Noir ; couvert d'une pubescence noirâtre et orné des dessins blancs ou jaunâtres suivants : une étroite bande transversale au bord antérieur du front et des joues ; une bande transversale entre les tubercules antennifères et une autre au bord antérieur du vertex, confluant avec la précédente ; trois étroites bandes longitudinales sur le disque du pronotum ; sur chaque élytre, une bande transversale postmédiane dentelée, une autre pareille préapicale, et le bout apical. En outre, les deux tiers basilaires des élytres entièrement tachetés de blanc, les taches souvent confluentes ; le disque du pronotum aussi moucheté de blanc. Le dessous du corps et les jambes couverts d'une pubescence éparsée gris blanchâtre, tacheté de noir. Les tibias (sauf leur partie apicale) et le premier article des tarsi couverts d'une pubescence blanche ; les antennes, d'une pubescence noire ; les deux premiers articles et la partie basilaire des suivants, d'une pubescence blanche.

Longueur : 16 à 23 millimètres. Largeur : 8 à 10 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par WATERHOUSE sur des individus de Madagascar. *Pyramidalis* Fairm. est un synonyme.

m. *nigropicta* Fairm.

Les dessins blancs plus étendus ; la bande transversale au bord antérieur du front et des joues est plus large ; celle sur le vertex et les bandes longitudinales latérales du disque du pronotum sont également plus larges ; sur chaque élytre la bande transversale postmédiane et la préapicale plus larges, les taches blanches confluent en une large bande transversale prémédiane, qui se réunit avec la bande postmédiane avant qu'elle n'atteigne la suture.

Localités : Madagascar : Diego-Suarez, Fianarantsoa (Muséum de Paris).

3. *alluaudi* Fairm.

Leucographus alluaudi Fairm. 1897. Ann. Soc. ent. Belg. XLI, p. 197.

Très proche de *variegatus* Wat., dont il ne forme peut-être également qu'une morpha, mais les bandes latérales du disque du pronotum, ainsi que la bande transversale postmédiane des élytres, plus larges et plus régulières, moins dentelées ou interrompues ; le fond couvert d'une pubescence noire, non marbré de blanc : les dessins sont donc plus nets.

Localité : Madagascar : Diego-Suarez (FAIRMAIRE).

Genre 10 : **Dichostathes** Thoms.

Dichostathes Thoms. 1860. Ess. Class. Cer., p. 34, 36 ; 1864. Syst. Cer., p. 372.

Dichostathes Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 506, 509.

Dichostathes Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192.

Stature ovale, assez large. Les antennes fines, frangées ou non en dessous, assez courtes, au plus moitié plus longues que le corps chez les ♂♂ ; le scape assez long, plutôt mince, souvent triquètre ; le troisième article distinctement plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés ou presque plats. Les yeux assez finement facettés, subdivisés.

Le pronotum très large (la plus grande largeur peu avant la base), convexe, traversé d'un sillon non loin de la base et du bord antérieur, pourvu souvent d'une épine latérale (très rapprochée de la base) et d'un petit tubercule latéro-inférieur près du bord antérieur (situé après le lobe inférieur des yeux) ; l'écusson large et court.

Les élytres allongées, convexes, rétrécis dès les épaules, pourvus souvent de fascicules de poils ; les épaules plus ou moins proéminentes.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très courte, de la hauteur des hanches, assez raide tronquée à son bord antérieur et à son bord postérieur ; la saillie mésosternale très large, plus large que longue, tronquée verticalement à son bord antérieur. Les jambes assez courtes.

Type : *concretus* Pasc. Vingt espèces de l'Afrique centrale.

AURIVILLIUS cite vingt-trois espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. Quatre de ces espèces sont à exclure du genre, *annulatus* Chevrl. se rangeant dans le genre *Frea* Thoms., *brunneopictus* Fairm., *capucinus* Gerst., et *stypticus* Pasc. dans le genre *Crossotus* Serv. ; en outre *acuminatus* Jord. est un synonyme de *flavopictus* Qued., *albidus* Hintz un synonyme de *concretus* Pasc., *bimaculatus* Bat. une morpha de *flavopictus* Qued., *flavomaculatus* Hintz une morpha de *lobatus* Jord. et *fulvomaculatus* Hintz une morpha de *quadripunctatus* Chevrl.

Par contre *corticarius* Hintz, rangé dans le Genre *Crossotofrea* Hintz au Catalogue de JUNK-SCHENKLING appartient au genre présent.

Depuis, une espèce fut décrite par AURIVILLIUS et trois par HINTZ : ces trois ne sont que des morphes de *lobatus* Jord. ; et j'en ai décrit moi-même quatre autres.

1. *compactus* Fairm.

Dichostathes compactus Fairm. 1887. Ann. Soc. ent. Fr. (6) VII, p. 337.

Stature ovale. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀) ou d'un quart à un tiers plus longues que le corps (♂), non frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article à peine plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, distinctement moins longs que les joues. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une grande épine latérale large, courbée en arrière au sommet, très rapprochée de la base, d'un tubercule obtus de chaque côté du bord antérieur et d'un fascicule de poils de chaque côté du milieu du disque ; les côtés du disque assez grossièrement ponctués. Les élytres assez convexes, arrondis au sommet, grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils brun jaunâtre, situés l'un après l'autre (un basilaire, un grand postbasilaire et un postmédian), tous trois un peu rapprochés de la suture, et de nombreux petits tubercules alignés, surtout après l'épaule, se courbant ensuite en arc vers le disque (vers le fascicule postmédian et au quart apical).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun jaunâtre ; les tubercules en partie brun foncé ; les antennes brunes, couvertes d'une fine pubescence grise.

Longueur : 11 à 13 millimètres. Largeur : 6 mm. à 7 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus de Mponopona.

Localités : Colonie du Kénia : Mponopona (FAIRMAIRE) ; Territoire du Tanganyika : Ndanda (Musée de Tervueren), Lindi (collection ITZINGER), Manjani (Musée de Hambourg) ; Congo belge : Lulua, Albertville ; Katanga : Kafakumba (Musée de Tervueren) ; Afrique orientale portugaise : Baie de Delagoa (collection DAYREN) ; Transvaal (Musée de Prétoria).

2. *concretus* Pasc.

Phymasterna concreta Pasc. 1857. Trans. ent. Soc. Lond. (2) IV, p. 105.

Dichostathes natalensis Thoms. 1860. Ess. Class. Cer., p. 37 ; 1864. Syst. Cer., p. 65.

Dichostathes albidus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 195.

Proche de *compactus* Fairm., mais s'en distinguant comme suit : Les lobes inférieurs des yeux petits, aussi longs que larges, beaucoup moins longs que les joues ; l'épine latérale du pronotum plus mince, plus fortement courbée en arrière à son sommet ; le disque moins ponctué, sans fascicule de poils ; les élytres moins convexes, les points moins gros, les fascicules de poils plus petits ; pas de petits tubercules sur les élytres.

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre varié de jaune d'ocre, cette couleur formant sur les élytres des bandes longitudinales irrégulières.

Longueur : 7 mm. 1/2 à 10 mm. 1/2. Largeur 3 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Décrit par PASCOE sur des individus du Natal. *Natalensis* Thoms. et *albidus* Hintz sont des synonymes.

Localités : Natal (Musée Britannique) ; Transvaal (Musée de Prétoria) ; Nyassaland : Chiromo (Imperial Bureau of Entomology) ; Territoire du Tanganyika : Ndanda (Musée de Tervueren), Tanga (HINTZ), Lindi, Zanzibar (collection ITZINGER) ; Congo belge : Katanga, Ngagé (Musée de Tervueren).

3. *strandii* Breun.

Dichostathes strandii Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 165.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂), non frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une grande épine latérale droite, émoussée, un peu rapprochée de la base, et d'un petit tubercule de chaque côté du bord antérieur. Les élytres médiocrement convexes, arrondis au sommet, granulés à la base, ensuite très grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu de quatre fascicules de poils, dont trois sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian) et un petit au bord extérieur du basilaire (entre lui et le calus huméral), ainsi que de plusieurs rangées de petits cônes à la partie latérale, qui se courbent en arc, l'une après l'autre sur le disque (une vers la crête postmédiane, deux au quart apical) ; les épaules arrondies.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun surtout sur le vertex, le milieu du pronotum, en forme de large bande transversale peu nette après le fascicule postbasilaire des élytres, et à leur quart apical. Les antennes couverts de pubescence brune, les deux premiers articles et la partie apicale des articles suivants d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 9 à 12 millimètres. Largeur : 4 à 6 millimètres.

Décrit par moi sur un individu d'Usagara.

Localités : Territoire du Tanganyika : Usagara (collection ITZINGER), Lindi, Manow, etc.

4. *corticarius* Hintz

Crossotus corticarius Hintz 1910. Deuts. ent. Zs., p. 575.

Proche de *strandii mihi*, mais s'en distinguant ainsi : Chaque élytre pourvu de sept fascicules de poils : un discal basilaire, un postbasilaire, un huméral, un entre l'huméral et le basilaire, deux postmédiens, situés l'un à côté de l'autre et un préapical ; de chaque côté du disque du pronotum, une étroite ligne courbée noire ; une bande transversale blanche nette sur chaque élytre avant les deux fascicules postmédiens.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Localité : Territoire du Tanganyika : Kilimandjaro (HINTZ, Musée de Bruxelles).

5. *ayresi* Dist.

Dichostathes ayresi Dist. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, p. 376 ; 1904. Ins. Transvaal, p. 146, pl. 14, fig. 11.

Stature ovulaire. Les antennes courtes, ne dépassant pas le milieu des élytres (♀) ou n'atteignant pas leur sommet (♂), non frangées en dessous ; le scape non triquètre ; le troisième article un peu plus court que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus larges que longs, un peu moins longs que les joues. Le pronotum plus de deux fois plus large que long, pourvu d'une grande et large épine latérale, émoussée, très rapprochée de la base. Les élytres médiocrement convexes, arrondis au sommet, grossièrement ponctués, les points très gros après les épaules, un peu moins gros vers la suture ; chaque élytre pourvu de cinq fascicules de poils très longs, bruns et jaunes : trois à la base (un à côté de l'écusson, le deuxième, plus petit, à son côté latéral, le troisième assez petit sur le calus huméral), un postbasilaire (après le premier basilaire) et un postmédian (au milieu du disque).

Brun foncé, entièrement couvert d'une pubescence grise, variée de brun foncé et de jaune.

Longueur : 10 à 11 millimètres. Largeur : 6 à 7 millimètres.

Localités : Transvaal : Rustenburg, Waterberg (DISTANT, Musée Britannique).

6. *trilineatus* Hintz

Dichostathes trilineatus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 196.

Stature ovalaire. Les antennes ne dépassant pas le milieu des élytres chez la ♀, non frangées en dessous ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. La tête finement ponctuée. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une assez grande épine latérale, qui est légèrement courbée en arrière à son sommet et très rapprochée de la base, et d'un petit tubercule de chaque côté du bord antérieur ; le disque ponctué éparsément et assez fortement, souvent pourvu d'un petit fascicule de poils jaunes de chaque côté du milieu ; l'écusson pas trop large. Les élytres médiocrement convexes, plutôt finement ponctués ; quelques points très gros sur le disque après l'épaule ; chaque élytre pourvu de plusieurs fascicules de poils jaunes d'ocre : trois sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian), un sur le calus huméral et souvent un préapical ; les épaules arrondies.

Brun foncé, entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun ; sur le disque du pronotum plusieurs lignes longitudinales brunes.

Longueur : 8 à 9 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par HINTZ sur des individus de Pangani.

Localités : Territoire du Tanganyika : Pangani (HINTZ) ; Colonie du Kénia : Kerio River (Musée de Tervueren).

7. *similis* Breun.

Dichostathes similis Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 222.

Proche de *trilineatus* Hintz, mais les lobes inférieurs des yeux très transversaux, distinctement moins longs que les joues ; le disque du pronotum non ponctué, sans fascicule de poils ; les élytres ponctués un peu plus grossièrement.

Longueur : 7 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu du Lac Rudolf.

Localités : Ouganda : Lac Rudolf (Musée Britannique) ; Congo belge : Mahagi-Port, Djugu (Musée de Tervueren).

8. *tabularis* Kolbe

Dichostathes tabularis Kolbe 1897. Mitteil. Naturh. Mus. Hamburg XIV, p. 97, pl., fig. 9 ; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col., p. 317.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un quart plus longues que le corps (♂) ; le scape non triquètre ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front et les joues assez grossièrement ponctués. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une large épine latérale droite, émoussée, peu rapprochée de la base ; le disque grossièrement ponctué. Les élytres allongés, peu convexes, légèrement échancrés au sommet, granulés à la base, ensuite grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu d'un tubercule à la base à côté de l'écusson et de deux fascicules de poils noirs (l'un après le tubercule basilaire, l'autre après le milieu, au milieu du disque) ; les épaules anguleusement proéminentes.

Noir, entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de jaune d'ocre sur le disque du pronotum et à la moitié postérieure des élytres ; tous les points restent noirs. Sur chaque élytre, une tache ochracée demi-circulaire sur le disque après le fascicule postbasilaire. Les antennes brun noirâtre ; la partie basilaire et apicale des articles blanchâtre.

Longueur : 13 à 16 millimètres. Largeur 6 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus de Bagamoyo.

Localités : Territoire du Tanganyika : Bagamoyo (KOLBE), Mrogoro, Dar-es-Salaam (Musée de Hambourg), N'guru, Lindi (collection ITZINGER).

9. *magnus* Auriv.

Dichostathes magnus Auriv. 1925. Ark. f. Zool. 17 A, n° 12, p. 12, fig. 135.

Proche de *tabularis* Kolbe, mais le disque du pronotum fortement ridé ; la base des élytres plus fortement granulée, les deux fascicules de poils de chaque élytre beaucoup plus hauts ; toute la surface des élytres variée de jaune d'ocre ; la tache prémédiane tout de même distincte.

Localité : Nyassaland : Chiromo (AURIVILLIUS, Musée de Stockholm).

10. *quadrisignatus* Hintz

Dichostathes quadrisignatus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 196.

Stature ovalaire. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un quart plus longues que lui (♂), éparsément frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes

inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, un peu plus longs que les joues. Le front ponctué assez grossièrement. Le pronotum plus de deux fois plus large que long, pourvu d'une assez courte épine latérale, qui est très rapprochée de la base et un peu recourbée au sommet, ainsi que d'un très petit tubercule de chaque côté au bord antérieur ; les côtés du disque assez grossièrement ponctués. Les élytres médiocrement convexes, arrondis au sommet, granulés à la base, ensuite grossièrement ponctués ; les épaules médiocrement proéminentes, arrondies ; chaque élytre pourvu d'un petit tubercule à l'extrême base à côté de l'écusson et de deux fascicules ronds de poils noirs (un grand postbasilaire après le tubercule basilaire et un plus petit postmédian, situé un peu plus latéralement).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de jaune d'ocre, surtout sur le vertex, le disque du pronotum et en forme de diverses lignes irrégulières sur les élytres ; la pubescence blanchâtre assez éparse aux jambes et aux antennes.

Longueur : 10 à 13 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par HINTZ sur des individus de Kondué.

Localités : Congo belge : Sassa, Léopoldville, Kapanga, Ponthierville, Kondué (Musée de Tervueren).

II. *mülleri* *Qued.*

Dichostathes mülleri *Qued.* 1888. Berl. ent. Zs. XXXII, p. 207.

Proche de *quadrisignatus* *Hintz*, mais s'en distinguant comme suit : La stature plus large, les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues ; l'épine latérale du pronotum à peine recourbée, moins rapprochée de la base ; les épaules très proéminentes du côté latéral en forme de tubercule ; le troisième article des antennes un peu moins long que le quatrième.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 8 mm. 1/2.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus sans localité précise.

Localité : Cameroun : Lolodorf (collection ITZINGER).

12. *quadripunctatus* *Chevr.*

Phymasterna quadripunctata *Chevr.* 1855. Rev. & Mag. zool. (2) VII, p. 523.

m. *fulvomaculata* *Hintz*

Dichostathes fulvomaculatus *Hintz* 1912. Deuts. ent. Zs., p. 198.

Stature ovale. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Toute la tête assez grossièrement ponctuée. Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une épine latérale conique obtuse, ou simplement anguleux à la place d'une épine, très rapprochée de la base ; quelques points sur les côtés du disque. Les élytres médiocrement convexes, arrondis au sommet, densément et assez grossièrement ponctués ; les épaules arrondies. Chaque élytre pourvu d'un petit tubercule basilaire et de deux petits fascicules de poils noirs : un postbasilaire et un postmédian, qui est situé un peu plus latéralement.

Noir ; couvert d'une pubescence éparse gris blanchâtre, variée de jaune d'ocre et tacheté de noir ; sur chaque élytre une bande oblique blanchâtre peu apparente, entre le fascicule postbasilaire et le fascicule postmédian.

C'est la forme typique, décrite par CHEVROLAT sur des individus de Vieux-Calabar.

m. *fulvomaculata* *Hintz*

Les fascicules des poils noirs sur les élytres plus ou moins réduits, remplacés par de grandes taches brun rougâtre ; quelques autres taches pareilles sur le vertex, sur les côtés du pronotum et à la partie basilaire et apicale des élytres.

Entre cette forme et la forme typique on trouve des formes transitoires.

Localités : Sierra-Leone : N'tala (Imperial Bureau of Entomology) ; Côte d'Ivoire : Dimbokro (collection LE MOULT) ; Côte de l'Or : Ashanti ; Nigéria : Vieux-Calabar (Musée Britannique) ; Togo : Bismarckburg ; Dahomey : Ketu ; Cameroun (HINTZ) ; Congo belge : Congo da Lemba, Équateur, Flandria (Musée de Tervueren).

13. *ugandæ* *Breun.*

Dichostathes ugandæ *Breun.* 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 165.

Stature ovale. Les antennes un quart plus longues que le corps (♂) ou beaucoup moins longues que lui (♀), éparsement frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Le front éparsement et assez grossièrement ponctué. Le pronotum deux fois plus large que long ; les côtés obtusément anguleux près de la base, mais sans épine latérale ; le disque aplati sur les côtés, surtout vers la base ; de chaque côté du bord antérieur, un petit tubercule. Les élytres assez grossièrement ponctués, rudement granulés à la base, arrondis au sommet ;

chaque élytre pourvu d'un tubercule basilaire à côté de l'écusson et de deux petits fascicules de poils (un postbasilaire après lui et un postmédian, situé un peu plus latéralement) ; les épaules proéminentes en forme de tubercule.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun rougeâtre surtout sur le front, le disque du pronotum et des élytres (avant et après le milieu) ; les côtés des sterna et les jambes et tachetés de noir.

Longueur : 10 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Décrit par moi sur un individu d'Entebbe.

Localités : Ouganda : Entebbe (collection ITZINGER, Imperial Bureau of Entomology) ; Congo belge : Lomami, Kaniema (Musée de Tervueren).

14. *hauseri* Hintz

Dichostathes hauseri Hintz 1910. Deuts. ent. Zs., p. 197.

Stature ovulaire. Les antennes un quart plus longues que le corps (♂), éparsément frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article à peine plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs un peu plus longs que larges, aussi longs que les joues. Le front très finement ponctué. Le pronotum presque deux fois plus large que long, arrondi aux côtés, sans épine ; un tubercule pointu de chaque côté du bord antérieur ; les côtés du disque éparsément ponctués. Les élytres médiocrement convexes, arrondis au sommet, grossièrement ponctués, rudement granulés aux épaules, les points plus fins vers la suture ; la partie basilaire de chaque élytre, à côté de l'écusson, étirée anguleusement, couvrant la base du pronotum ; les épaules proéminentes en forme de tubercule.

Noir ; couvert d'une pubescence épars brun grisâtre, variée de gris blanchâtre et orné des dessins blancs suivants peu nets : une bande transversale au bord supérieur du front ; les joues, les côtés du disque du pronotum ; sur chaque élytre, souvent une tache basilaire entre le calus huméral et la proéminence basilaire, une large bande transversale médiane qui n'atteint pas la suture, et diverses taches au quart apical, ainsi que le long de la suture et du bord latéral. La moitié postérieure du dernier segment abdominal également couverte d'une pubescence blanche, les jambes d'une pubescence blanchâtre épars, variée de jaune, les antennes d'une pubescence brune ; les quatre premiers articles et la partie basilaire et apicale des articles suivants, d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Localité : Togo (HINTZ).

15. *rubromaculatus* Breun.

Dichostathes rubromaculatus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 222.

Proche de *hauseri* Hintz, mais le troisième article des antennes beaucoup plus long que le quatrième, les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues.

Noir ; très densément marbré de blanc ; de chaque côté du disque du pronotum, une grande tache circulaire rouge foncé ; sur chaque élytre quelques taches rouge foncé, formant une sorte de bande transversale prémédiane et une grande tache ronde postmédiane semblable ; les côtés des sterna et des segments abdominaux densément marbrés d'ochracé.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Nigéria : Oweno (Imperial Bureau of Entomology).

16. *lobatus* Jord.

Dichostathes lobatus Jord. 1894. Novit. Zool. L, p. 237.

ab. *ochraceomaculata* nov.

m. *rothkirchi* Hintz

Dichostathes rothkirchi Hintz 1919. Wiss. Ergebn. d. II centr. afr. Exped. I, p. 625.

ab. *grisea* nov.

m. *fasciculata* Hintz

Dichostathes fasciculatus Hintz 1919. Wiss. Erg. d. II centr. afr. Exped. I, p. 626.

m. *flavomaculata* Hintz

Dichostathes flavomaculatus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 197.

ab. *albomaculata* nov.

m. *maculata* Hintz

Dichostathes maculatus Hintz 1919. Wiss. Erg. d. II centr. afr. Exped. I, p. 626.

Stature ovulaire. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou d'un tiers à moitié plus longues que lui (♂), éparsément frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le front éparsément et assez grossièrement ponctué. Le pronotum deux fois plus large que long ; les côtés élargis non loin de la base, mais arron-

dis ; les côtés du disque grossièrement ponctués ; de chaque côté du bord antérieur, un petit tubercule. Les élytres peu convexes, arrondis au sommet, très grossièrement ponctués, granulés aux épaules ; les épaules très proéminentes latéralement en forme de lobe ; la partie basilaire de chaque élytre prolongée en avant, couvrant ainsi la base du pronotum.

Noir ; couvert d'une épaisse pubescence gris blanchâtre ou jaunâtre, surtout dans les fossettes des élytres ; de chaque côté, trois plus grandes taches jaunes ou jaune d'ocre (une sur le vertex, la deuxième près du bord antérieur du pronotum, la troisième, ronde, sur le disque des élytres avant le milieu, un peu rapprochée de la suture) ; en outre, sur chaque élytre, un fascicule de poils noirs sur le disque après le milieu. Le dessous du corps, les jambes et les antennes couverts d'une fine pubescence épaisse, gris blanchâtre, les côtés des sterna et de l'abdomen d'une pubescence jaune d'ocre.

Longueur : 9 à 15 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 8 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par JORDAN sur des individus de Kuilu et du Congo supérieur.

ab. *ochraceomaculata nov.*

Toute la surface uniformément mouchetée de jaune d'ocre sans taches plus grandes, sauf la tache prémédiane des élytres et une autre postmédiane pareille à la place du fascicule de poils (qui est disparu).

Type : une ♀ du Congo belge, de la collection ITZINGER.

m. *rothkirchi Hintz*

Les taches au bord antérieur du pronotum, et souvent aussi celles du vertex, sont atrophiées ; les élytres régulièrement mouchetés de blanchâtre ; la grande tache prémédiane de couleur blanche, le fascicule de poils postmédian souvent atrophié.

ab. *grisea nov.*

Toute la surface régulièrement mouchetée de blanchâtre, sans aucune tache plus grande.

Type : un ♂ du Congo belge : Sassa, au Musée de Tervueren.

m. *fasciculata Hintz*

Comme la forme typique, mais sur chaque élytre un second fascicule de poils noirs postbasilaire, situé avant la tache claire prémédiane ; cette tache prémédiane souvent disparue.

m. *flavomaculata Hintz*

Comme la forme typique, mais chaque élytre orné de plusieurs taches assez grandes (en plus de la prémédiane discale), dont une à la base à côté de l'écusson, une au milieu, un peu rapprochée du bord latéral, et une préapicale ; ces taches du moins en partie de couleur jaune d'ocre.

ab. *albomaculata nov.*

Comme m. *flavomaculata Hintz*, mais toutes les taches de couleur blanche.

Type : un ♂ du Congo belge : Leverville, au Musée de Tervueren.

m. *maculata Hintz*

Toute la surface, ainsi que les côtés des sterna et des segments abdominaux, densément couverts de taches jaune d'ocre ; chaque élytre en outre orné d'un ou de deux fascicules de poils noirs.

Je considère toutes ces formes comme des variantes de *lobatus Jord.*, les différences étant d'importance secondaire ; en outre elles sont reliées ensemble par des formes transitoires.

Localités : Cameroun : Lolodorf (collection ITZINGER) ; Gabon : Kuilu (JORDAN), Benito, Bas Ogooué (Muséum de Paris) ; Congo belge : Sassa, Équateur, Leverville, Bambesa, Barumbu, Galli-koko, Bas-Uelé, Stanleyville, Sankuru, Kondué, Région des Lacs (Musée de Tervueren) ; Angola ; Colonie du Kénia : Ilala (Musée Britannique).

17. *flavoguttatus Hintz*

Dichostathes flavoguttatus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 197.

Proche de *lobatus Jord.* m. *flavomaculata Hintz*, mais s'en distinguant comme suit : La stature plus élancée, moins large, plus convexe ; les épaules moins proéminentes, non étirées en tubercule ; les élytres moins larges à la base, plus convexes, moins grossièrement ponctués à la base.

La surface ornée de taches rondes jaunes plus nombreuses : une de chaque côté au bord antérieur du front, une sur les joues, une sur le vertex, une de chaque côté du bord antérieur du pronotum, deux de chaque côté de son disque, rapprochées de la base ; sur chaque élytre, deux à la base, entre l'écusson et le calus huméral, une prémédiane sur le disque, deux au bord latéral à la moitié antérieure, huit à dix sur la moitié postérieure ; un fascicule de poils noirs sur le disque un peu après le milieu.

Longueur : 10 à 14 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 8 mm. 1/2.

Décrit par HINTZ sur des individus de Kondué.

Localités : Congo belge : Kondué (HINTZ), Galli-koko, Lusambo, Luluabourg (Musée de Tervueren).

18. *flavopictus* *Qued.*

Crossotus flavopictus *Qued.* 1882. Berl. ent. Zs. XXVI, p. 356.

Dichostathes acuminatus *Jord.* 1894. Novit. Zool. I, p. 238.

m. *bimaculata* *Bat.*

Dichostathes (?) *bimaculatus* *Bat.* 1890. Proc. zool. Soc. Lond., p. 491.

Stature ovale. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou d'un tiers à moitié plus longues que lui (♂), frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, aussi longs que les joues. Le front éparsément et assez grossièrement ponctué. Le pronotum deux fois plus large que long, élargi parfois presque anguleusement peu avant la base, pourvu d'un petit tubercule de chaque côté du bord antérieur ; quelques points assez gros sur les côtés du disque. Les élytres peu convexes, arrondis au sommet, densément et grossièrement ponctués, granulés aux épaules ; chaque élytre pourvu d'un tubercule émoûssé à la base non loin de l'écusson et de deux fascicules de poils noirs sur le disque (un postbasilaire et un postmédian) ; les épaules un peu proéminentes, mais arrondies.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée parfois d'un peu de jaune et orné de plusieurs assez grandes taches blanches ou jaunes : une de chaque côté du milieu du vertex et plusieurs sur chaque élytre, surtout à leur moitié postérieure : la plus grande au milieu, un peu rapprochée de la suture, une deuxième au côté latéral de celle-ci (pas de grande tache prémédiane au milieu du disque, parfois une près de la suture) ; une troisième pareille avant le fascicule postmédian. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence éparsée gris blanchâtre, les côtés des sterna d'une pubescence dense jaunâtre. Les antennes brun foncé ; la partie basilaire et apicale des articles annelée de gris, à partir du troisième.

Longueur : 9 à 14 millimètres. Largeur : 5 à 8 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par QUEDENFELDT sur des individus de l'Angola. *Acuminatus* *Jord.* est un synonyme.

m. *bimaculata* *Bat.*

Toutes les taches claires plus grandes des élytres sont réduites, parfois même celles du vertex.

Localités : Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Aruwimi (BATES), Sassa, Leverville, Stanleyville, Barumbu, Luluabourg, Bambesa, Bas-Uelé, Haut-Uelé, Ituri, Kindu, Niam-Niam, Galli-koko, Sankuru, Komi, Kondué (Musée de Tervueren), Mawambi (Musée de Vienne) ; Angola (QUEDENFELDT).

19. *nigroguttatus* *Jord.*

Dichostathes nigroguttatus *Jord.* 1894. Novit. Zool. I, p. 237.

Stature ovale ou en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un tiers plus longues que lui (♂), frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Le front finement ponctué. Le pronotum plus de moitié plus large que long ; les côtés très élargis avant la base ; un très petit tubercule de chaque côté du bord antérieur ; les côtés du disque densément ponctués ; l'écusson deux fois plus large que long. Les élytres allongés, médiocrement convexes, densément et grossièrement ponctués, finement granulés aux épaules ; chaque élytre pourvu d'un large tubercule obtus à la base non loin de l'écusson et de deux fascicules de poils noirs sur le disque (un postbasilaire, un postmédian, situé un peu plus latéralement).

Noir ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre à brun grisâtre ; une pubescence gris blanchâtre couvre le front, les parties latérales du pronotum jusqu'un peu sur le disque, et, sur chaque élytre, une large bande transversale médiane (entre les deux fascicules de poils) qui n'atteint pas tout à fait la suture et quelques taches à la partie apicale. Le dessous, les jambes et les antennes couverts d'une pubescence semblable éparsée, les côtés des sterna d'une pubescence dense blanchâtre à jaunâtre.

Longueur : 10 à 12 millimètres. Largeur 5 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Décrit par JORDAN sur des individus de Kuilu.

Localités : Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Sassa, Maniema, Kindu, Équateur, Flandria, Eala, Sankuru, Komi (Musée de Tervueren).

20. *kuntzeni* *Hintz*

Dichostathes kuntzeni *Hintz* 1912. Deuts. ent. Zs., p. 196.

ab. *ochreicollis* *nov.*

Très proche de *nigroguttatus* *Jord.*, mais la stature plus petite et plus allongée ; les antennes plus courtes, ne dépassant pas le milieu des élytres (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂) ; le troisième article aussi long que le quatrième.

Noir ; couvert d'une éparsée pubescence gris blanchâtre ; une tache plus grande de chaque côté du disque du

pronotum et, sur chaque élytre, une large bande médiane, le plus souvent de couleur ochracée (qui n'atteint pas tout à fait la suture).

Longueur : 8 à 10 millimètres. Largeur : 4 mm. à 5 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par HINTZ sur des individus de Guinée espagnole et du Cameroun.

ab. ochreicollis nov.

Tout le pronotum (sauf son bord antérieur et son bord postérieur) couvert d'une pubescence ochracée.

Type : un ♂ du Gabon, de la collection SCHALL.

Localités : Sierra-Leone : Mufunde (Imperial Bureau of Entomology) ; Cameroun : Johann-Albrechtshöhe, Yaunde (HINTZ) ; Guinée espagnole : Nkolentangan (HINTZ) ; Congo belge : Uelleburg (HINTZ), Aruwimi, Eala, Panga (Musée de Tervueren) ; Ouganda (Imperial Bureau of Entomology).

Genre II : **Corus** Pasc.

Corus Pasc. 1888. Trans. ent. Soc. Lond., p. 506.

Corus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 220.

Stature allongée ou en ovale allongé. Les antennes fines ou médiocrement fortes, beaucoup moins longues, ou jusqu'à un tiers plus longues que le corps, frangées ou non ; le scape assez court, souvent triquètre ; le troisième article au moins distinctement plus long que le scape, aussi long ou un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés ; les yeux assez grossièrement facettés, subdivisés.

Le pronotum le plus souvent transversal, pourvu d'une épine ou au moins d'un tubercule latéral, souvent rapproché de la base, et souvent de tubercules discaux ainsi que de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs le plus souvent peu nets et peu profonds ; l'écusson large.

Les élytres allongés, plus ou moins convexes, arrondis ou légèrement tronqués ou échancrés au sommet, pourvus de petits fascicules même après le milieu.

La tête rétractile.

La saillie prosternale courte, de la hauteur des hanches, arquée ou légèrement tronquée à ses bords ; la saillie mésosternale moins large que longue, tronquée à son bord antérieur. Les jambes assez courtes.

Type : *caffer* Fähr. Vingt-huit espèces de l'Afrique.

AURIVILLIUS range ce genre, dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING, parmi les *Apodasyini* et cite une seule espèce : *annulicornis* Pasc.

Il se distingue du genre *Crossotus* Serv., dont il se rapproche le plus, en premier lieu par les yeux subdivisés.

Annulicornis Pasc. est un synonyme de *Crossotus caffer* Fähr. En outre, *collaris* Thoms., *costiger* Quéd., *cretaceus* Chevrl., *lacunosus* Fähr., *levidorsia* Kolbe et *lignarius* Guér., rangés tous dans le genre *Crossotus* ont leur place dans le genre actuel, ainsi que *fasciculosus* Auriv., rangé dans le genre *Frea* Thoms. et *compactus* Hintz, dans le genre *Theticus* Thoms. (tribu des *Niphonini*). J'ai décrit moi-même depuis huit *Corus* et onze espèces de *Crossotus* qui se rangent également dans le genre *Corus* : *mirabilis*, *albo punctatus*, *leonensis*, *parallelus*, *strandiellus*, *burgeoni*, *pseudocostiger*, *lesnei*, *pseudocaffer*, *flavus* et *cylindricus*.

I. *mirabilis* Breun.

Crossotus mirabilis Breun. 1935. Fol. zool. et hdrob. VII, p. 166.

Stature allongée. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un tiers plus longues que lui (♂), densément frangées de poils longs en dessous ; le scape court et assez fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères pourvus d'un petit fascicule de poils. Les lobes inférieurs des yeux plus longs que les larges, un peu moins longs que les joues. Le front et les joues éparsement et assez grossièrement ponctués. Le pronotum pourvu de longs poils érigés, épars, jaunâtres et d'une très petite épine latérale émoussée, un peu rapprochée de la base ; en outre, de chaque côté du milieu, un très haut tubercule conique, surmonté de poils ochracés, un petit tubercule émoussé au bord antérieur et un plus grand tubercule émoussé situé entre ces deux tubercules ; l'écusson deux fois plus large que long, arrondi au sommet. Les élytres très allongés, parallèles, médiocrement convexes, assez grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu d'une assez longue crête longitudinale basilaire, surmontée de poils ochracés et bruns ; au bord latéral de cette crête, une quantité de tout-petits fascicules de poils alignés, s'étendant jusqu'au delà du milieu ; après le milieu un fascicule de poils plus grand au milieu du disque et de nombreux très petits fascicules pareils, situés sur deux lignes transversales (une au commencement du quart apical, courbée près de la suture un peu vers la base, l'autre préapicale). Le dessous et les jambes couverts de longs poils jaunâtres érigés, parfois aussi tout le dessus et les antennes.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun rougeâtre à brun grisâtre, variée de jaune, plus foncée sur les côtés latéraux des élytres de la base jusqu'au delà du milieu ; une bande transversale sur le vertex, et le milieu du pronotum (entre les deux hauts tubercules et l'écusson), sont brun noirâtre à noir. Sur chaque élytre, quelques motchetures

jaune blanchâtre à la moitié postérieure, le long de la suture et du bord latéral. Les antennes couvertes de pubescence brune, la partie basilaire des articles de pubescence jaunâtre.

Longueur : 13 à 14 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Kwiro.

Localités : Côte d'Ivoire : Danani ; Colonie du Kénia : Kibouézi (Muséum de Paris) ; Congo belge : Kilindi (Musée de Tervueren) ; Territoire du Tanganyika : Kwiro (collection ITZINGER), Uhehe (Musée de Hambourg).

2. *fasciculosus* Auriv.

Eumimetes fasciculosus Auriv. 1903. Ent. Tidskr. XXIV, p. 277, fig. 10.

Stature très allongée. Les antennes un peu plus longues que le corps (δ), densément frangées en dessous ; le scape court, fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux transversaux, moitié moins longs que les joues. Le front fortement ponctué. Le pronotum pourvu d'une épine latérale minime, dirigée un peu en avant, rapprochée de la base, et d'une bosse obtuse de chaque côté du milieu ; les sillons transversaux assez profonds ; le disque grossièrement ponctué. Les élytres très allongés, rétrécis dès les épaules, où ils sont beaucoup plus larges que le pronotum, assez grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de deux fascicules de poils noirs (un postbasilaire situé sur une crête longitudinale peu élevée, l'autre au commencement du tiers apical, rapproché un peu du bord latéral).

Brun noirâtre ; le front et le pronotum couverts d'une pubescence vert olivâtre, variée d'un peu de jaune ; la tête (à part le front), l'écusson et les élytres d'une pubescence jaune. Une tache sur les joues et deux sur chaque élytre, s'étendant obliquement en arrière du bord latéral sur le disque (une à la base, l'autre après le milieu), sont brun foncé ; entre ces deux taches une large bande oblique jaune clair. Le dessous et les jambes couverts de pubescence jaune, les cuisses antérieures de pubescence vert olivâtre ; la partie apicale des tibias, le troisième et le quatrième article des tarsi, de pubescence brun foncé ; les antennes, de pubescence jaune ; la partie apicale des articles, de pubescence brune.

Longueur : 12 à 13 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus du Cameroun.

Localités : Cameroun (AURIVILLIUS) ; Congo belge : Kivu (Musée de Tervueren).

3. *compactus* Hintz

Theticus compactus Hintz 1919. Erg. d. II centr. afr. Exped. I, p. 627.

Stature en ovale allongé. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (φ), non frangées en dessous ; le scape court, fort, claviforme ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, plus de deux fois plus long que le scape ; le quatrième aussi long que les articles 5 à 8 réunis ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, mais assez élevés. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, moitié moins longs que les joues. Toute la tête assez densément et grossièrement ponctuée. Le pronotum aussi long que large, densément et assez grossièrement ponctué, pourvu d'un tubercule latéral minime, un peu rapproché de la base, et d'un très petit tubercule latéral près du bord antérieur ; de chaque côté du milieu du disque, un haut tubercule non loin du bord antérieur, réuni avec celui de l'autre côté et tronqué à son bord antérieur ; l'écusson très large et court. Les élytres allongés, très convexes, densément et peu finement ponctués sur toute leur étendue ; chacun pourvu d'une assez haute crête discale postbasilaire et de cinq tubercules postmédiens (trois antérieurs, deux postérieurs, l'intérieur des postérieurs est le plus grand) ; ces tubercules et la crête surmontés de fascicules de poils.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée de blanchâtre entre les tubercules antennifères ; au milieu du pronotum, une très large bande longitudinale noir velouté, qui s'étend de la base jusqu'au sommet des deux tubercules discaux, est arrondie à son bord antérieur et est bordée latéralement de blanc. Sur chaque élytre, une assez grande tache posthumérale brun rougeâtre plus foncé, qui s'étend du bord latéral jusqu'à la crête postbasilaire, et plusieurs taches irrégulières pareilles au tiers apical ; la partie médiane couverte de pubescence blanche, cette couleur s'étendant à la suture presque jusqu'à la base. La partie apicale du troisième et du quatrième article antennaire, et les suivants (sauf à la base) couverts de pubescence brun foncé.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

Décrit par HINTZ sur des individus de Nkolentangan.

Localités : Sierra-Leone (Musée Britannique) ; Guinée espagnole ; Nkolentangan (HINTZ) ; Congo belge : Lulua, Kapanga, Bambesa (Musée de Tervueren).

4. *albopunctatus* Breun.

Crossotus albopunctatus Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 166.

Stature allongée. Les antennes un peu moins longues que le corps ; le scape peu long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que larges, moitié plus longs que les joues. Le front densément ponctué, le reste de la tête éparsement ponctué. Le pronotum large, pourvu d'une petite épine latérale droite, émoussée, à peine rapprochée de la base, et de deux tubercules assez élevés et obtus (situés l'un après l'autre)

de chaque côté du milieu ; les côtés du disque éparsement ponctués. Les élytres allongés, convexes, grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu de deux fascicules de poils plus grands sur le disque (un basilaire et un postbasilaire), de deux petits fascicules après le milieu sur le disque (un postmédian, l'autre au commencement du quart apical) et d'une série de petits fascicules commençant un peu avant le milieu, se rapprochant beaucoup de la suture et se recourbant avant le sommet vers le bord latéral. La saillie prosternale formant une crête transversale prononcée.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun rougeâtre, un peu variée de grisâtre ; la partie postérieure du fascicule postbasilaire est blanche, formant ainsi sur chaque élytre une petite tache blanche ; deux bandes obliques un peu plus sombres sur chaque élytre, remontant vers la suture (l'antérieure atteignant la tache blanche, la postérieure à peu près au milieu).

Longueur : 15 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Décrit sur un individu de Dalguhe, Colonie du Kénia (Imperial Bureau of Entomology).

5. *lacunosus* Fahr.

Dichostathes lacunosus Fahr. 1872. Œfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 38.

Frea reticulata Dist. 1904. Ins. Transvaal, p. 144, pl. XIV, fig. 4.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), non frangées en dessous ; le scape assez court, grossièrement ponctué ; le troisième article à peine plus long que le quatrième. Les deux lobes des yeux contigus ; les lobes inférieurs transversaux, distinctement moins longs que les joues. La tête assez grossièrement ponctué. Le pronotum large, assez densément et très grossièrement ponctué, et pourvu d'une assez longue épine latérale pointue. Les élytres allongés, médiocrement convexes, grossièrement ponctués ; les points réunis en groupes, séparés par des lignes longitudinales glabres pas très régulières, qui sont réunies par des lignes transversales analogues ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils noirs (un postbasilaire sur le disque, un sur le calus huméral et un très transversal juste après le milieu, souvent partagé en deux, situés juste à côté l'un de l'autre). Le dessous et les jambes grossièrement ponctués.

Noir ; couvert d'une éparse pubescence gris clair, réticulée de jaune rougeâtre ; le dessous et les jambes, d'une pubescence gris lilas, les côtés des sterna et des segments abdominaux, ainsi que les cuisses et les tibias au côté supérieur, d'une pubescence jaune rougeâtre ; la partie apicale des tibias brun foncé ; les antennes brun noirâtre, la partie basilaire des articles, à partir du troisième, gris blanchâtre.

Longueur : 8 mm, 1/2 à 10 millimètres. Largeur : 4 à 5 millimètres.

Décrit par FÄHRÆUS sur des individus de Cafrerie. *Reticulata* Dist. est un synonyme.

Localités : Natal (Musée Britannique) ; Transvaal : Zoutpansberg (Musée de Prétoria) ; Mashoanaland ; Betschuanaland (AURIVILLIUS), Lac N'gami (DISTANT).

6. *lignarius* Guér.

Crossotus lignarius Guér. 1850. Voyage Lefebv. Abyss. Ins., p. 327, pl. V, fig. 9.

Très proche de *lacunosus* Fahr., mais la tête à peine ponctuée ; le disque du pronotum grossièrement mais éparsement ponctué. La tête et le pronotum couverts d'une dense pubescence jaune rougeâtre, le dessous et les jambes d'une pubescence brun jaunâtre uniforme ; seule la partie apicale des tibias est plus sombre.

Décrit par GUÉRIN sur des individus d'Abyssinie.

Localités : Erythrée : Asmara (Musée de Vienne) ; Abyssinie : Diré-Daua (collection STAUDINGER) ; Colonie du Kénia : Tsavo River (Muséum de Paris).

7. *collaris* Chevrl.

Crossotus collaris Chevrl. 1856. Rev. Mag. Zool (2) VIII, p. 534 ; 1858. Cent. Long., n° 57.

Crossotus collaris Thoms. 1858. Arch. Ent. II, p. 178.

Crossotus collaris Qued. 1882. Berl. ent. Zs. XXVI, p. 359.

Dichostathes collaris Bat. 1890. Proc. zool. Soc. Lond., p. 491.

Stature en ovale allongé. Les antennes dépassant à peine le milieu des élytres (♀) ou un peu moins longues que le corps (♂), à peine frangées en dessous ; le scape assez court, triquètre ; le troisième article à peu près aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs aussi longs que larges, un peu plus longs que les joues. Le front éparsement, mais grossièrement ponctué ; de chaque côté du vertex, un petit fascicule de poils. Le pronotum large, pourvu d'une épine latérale assez longue, conique et pointue, d'un petit tubercule de chaque côté du bord antérieur et de deux petits fascicules de poils (l'un près du milieu au bord antérieur, l'autre sur le disque de chaque côté du milieu) ; le disque éparsement et très grossièrement ponctué, sauf une bande longitudinale glabre au milieu ; l'écusson moitié plus large que long. Les élytres allongés, assez convexes, légèrement rétrécis dès les épaules, très grossièrement ponctués ; chacun pourvu de cinq fascicules de poils jaunâtres : trois sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian), un au côté extérieur du basilaire et un préapical au milieu du disque.

Noir ; couvert en partie d'une pubescence éparse brun rougeâtre, variée de jaune ; une large tache blanche

de chaque côté du disque du pronotum, qui n'atteint pas le bord antérieur, dentelée vers le milieu du disque, prolongée souvent un peu sur la base des élytres ; une deuxième tache blanche un peu après le milieu de chaque élytre, rapprochée du bord latéral. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris blanchâtre éparsée, tachetée de noir ; la partie apicale des tibias, le troisième et le quatrième article des tarses couverts d'une pubescence noire ; les antennes d'une pubescence brun foncé, la partie apicale des articles des antennes d'une pubescence blanche.

Longueur : 8 à 12 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2. à 6 mm. 1/2.

Décrit par THOMSON sur des individus de Vieux-Calabar.

Localités : De Sierra-Leone à l'Angola, Rhodésie du Nord, et Territoire du Tanganyika : Zanzibar. Commun partout.

8. *leonensis* Breun.

Crossotus leonensis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 167.

Très proche de *collaris* Thoms., mais le troisième article des antennes un peu plus long que le quatrième ; le disque du pronotum plus éparsément, mais plus grossièrement ponctué ; les élytres moins élargis vers les épaules, plus parallèles, un peu moins grossièrement ponctués. Au côté intérieur de la grande tache blanche du pronotum se trouve une petite tache pareille ; sur les élytres, pas de grande tache blanche, mais il y en a une petite avant le fascicule de poils postmédian et le fascicule préapical.

Longueur : 9 millimètres. Largeur : 4 millimètres.

Localité : Sierra-Leone : N'Tala (Imperial Bureau of Entomology).

9. *parallelus* Breun.

Crossotus parallelus Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 167.

Proche de *collaris* Thoms., mais la stature plus allongée, plus parallèle, les antennes frangées en dessous de poils courts (♀) ou très longs (♂) dès le troisième article. Le vertex sans fascicules de poils. Le pronotum un peu plus long, sans tubercule de chaque côté au bord antérieur et sans fascicule de poils sur le disque ; l'épine latérale beaucoup plus petite ; le disque ponctué plus densément et très grossièrement. Les élytres plus allongés, parallèles, plus densément mais un peu moins grossièrement ponctués.

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre très éparsée. La tache blanche de chaque côté du pronotum s'étend jusqu'au bord antérieur, mais du côté intérieur elle est dentelée de la même manière que chez *collaris*. Les élytres sans tache postmédiane blanche, mais les cinq fascicules de poils sont de couleur blanchâtre et ainsi très apparents. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence gris blanchâtre éparsée, tachetée de brun noirâtre, plus dense et blanc pur sur l'abdomen.

Longueur : 7 mm. 1/2 à 10 millimètres. Largeur : 3 à 4 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus de Moto.

Localités : Congo belge : Haut-Uelé, Moto, Stanleyville, Sankuru, Komi (Musée de Tervueren) ; Ouganda : Entebbe (Imperial Bureau of Entomology).

10. *strandiellus* Breun.

Crossotus strandiellus Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 167.

Très proche de *parallelus mihi*, mais les antennes, même chez le ♂, beaucoup moins longues que le corps, densément frangées en dessous de longs poils ; les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux ; sur chaque élytre seulement deux très petits fascicules de poils (un basilaire et un postmédian).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre éparsée ; la bande longitudinale sur les côtés du pronotum est jaune, de la même largeur sur toute son étendue, non dentelée vers le milieu du disque ; les antennes couvertes de pubescence brun foncé, la partie apicale des articles de pubescence brun jaunâtre.

Longueur : 8 mm. 1/2. Largeur : 4 millimètres.

Localité : Territoire du Tanganyika : Bukoba (collection ITZINGER).

11. *costiger* Qued.

Dichostathes costiger Qued. 1883. Berl. ent. Zs. XXVII, p. 145.

Stature allongée. Les antennes dépassant un peu le milieu des élytres (♀) ou n'atteignant pas tout à fait leur sommet (♂), non frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, deux fois plus longs que les joues. Le front densément et assez grossièrement ponctué. Le pronotum large, pourvu d'une assez longue épine latérale mince, un peu courbée en arrière à son sommet, et d'un petit tubercule de chaque côté du bord antérieur ; le disque grossièrement ponctué, sauf un bourrelet longitudinal médian glabre. Les élytres allongés, parallèles, légèrement tronqués au sommet, très grossièrement ponctués ; les points plus fins vers le sommet ; les épaules proéminentes ; chaque élytre pourvu de quatre fascicules de poils : trois sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian) et un au côté extérieur

du basilaire ; après l'épaule se trouvent plusieurs carènes longitudinales très peu élevées, qui se courbent en partie en arc sur le disque (une ou deux un peu avant le milieu, une vers le fascicule postmédian et une au commencement du quart apical).

Noir ; couvert de pubescence noirâtre ; le front, une large bande longitudinale sur les côtés du pronotum (couvrant l'épine latérale), le bord latéral des élytres et deux larges bandes obliques sur le disque, remontant vers le bord latéral, qu'elles n'atteignent pas, sont couverts d'une pubescence brun rougeâtre clair. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence brun jaunâtre ou brun grisâtre, tachetés de brun noirâtre ; la partie apicale des tibias noirâtre. Les antennes brun foncé ; la partie apicale des articles annelée de jaunâtre.

Longueur : 9 à 12 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus de Lunda.

Localités : Congo belge : Lulua, Lomami, Lukuga, Lusangi, Ituri, Dungu, Nioka, Kafakumba (Musée de Tervueren) ; Angola : Lunda (QUEDENFELDT) ; Rhodésie : Brokenhill (collection SOLLMANN) ; Nyassaland : Cholo, Mont Mlanje (Musée Britannique).

12. *pseudocostiger* Breun.

Corus pseudocostiger Breun.

Proche de *costiger* Qued., mais les lobes inférieurs des yeux plus de deux fois plus longs que les joues ; le front et le disque du pronotum finement ponctués, l'épine latérale moins longue, un peu plus large ; les élytres moins grossièrement ponctués.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée de brun ; une très large bande longitudinale brun foncé au milieu du pronotum, amincie vers le bord antérieur et prolongée sur la base des élytres où elle forme une très courte tache transversale de chaque côté de l'écusson ; l'écusson également brun foncé ; sur chaque élytre une tache triangulaire brun foncé au bord latéral après l'épaule ; le bout apical des tibias antérieurs et intermédiaires brun foncé.

Longueur : 9 à 10 millimètres. Largeur 4 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu du Fort-Archambault.

Localités : Afrique équatoriale : Fort-Archambault ; Haut Dahomey (Muséum de Paris) ; Soudan : Wan (Musée de Stockholm) ; Territoire du Tanganyika : Zanzibar (Musée de Leyde) ; Guinée portugaise : Rio Cassine (Musée de Gènes).

13. *burgeoni* Breun.

Crossotus burgeoni Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob., VII, p. 168.

Proche de *costiger* Qued., mais s'en distinguant comme suit : La stature un peu plus courte ; les antennes encore un peu plus courtes ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; le front ponctué plus finement ; l'épine latérale du pronotum plus petite, un peu plus pointue ; le disque ponctué plus densément ; les élytres plus convexes, plus courts, moins parallèles, moins grossièrement ponctués, sans carènes ; les fascicules de poils plus petits.

Toute la pubescence plus claire, brune ; de chaque côté du pronotum, une bande longitudinale jaunâtre. La partie basilaire de chaque élytre couverte d'une pubescence brun jaunâtre clair ; après cette partie, une tache triangulaire noirâtre, qui s'étend du calus huméral jusqu'à la suture après le fascicule postbasilaire, et de là jusqu'au bord latéral, qu'elle atteint un peu avant le milieu ; la moitié apicale couverte d'une pubescence brun grisâtre variée de brun jaunâtre ; les antennes, d'une pubescence brun foncé ; la partie apicale des articles annelée de blanc.

Longueur : 7 mm. 1/2 à 9 millimètres. Largeur 3 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus de Kaniama.

Localités : Congo belge : Lomami, Kaniama, Lulua, Elisabethvielle, Katanga (Musée de Tervueren) ; Angola (collection ITZINGER).

14. *caffer* Fahr.

Dichostathes caffer Fahr. 1872. Œfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 38.

Corus annulicornis Pasc. 1888. Trans. ent. Soc. Lond., p. 506.

Stature allongée. Les antennes ne dépassant que peu le milieu des élytres (♀), ou un peu moins longues que le corps (♂), non frangées en dessous ; le scape triquetre ; le troisième article à peine plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères peu élevés, pourvus d'un petit fascicule de poils. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, aussi longs ou beaucoup plus longs que les joues. La tête assez grossièrement ponctué. Le pronotum court et large, grossièrement ponctué, sauf un bourrelet longitudinal médian glabre ; pourvu d'une petite épine latérale droite et pointue, et de chaque côté, de trois petits tubercules coniques, situés obliquement l'un après l'autre ; les antérieurs les plus rapprochés de la ligne médiane, surmontés de petits fascicules de poils ; l'écusson court, quadrangulaire. Les élytres allongés, peu convexes, légèrement tronqués au sommet, grossièrement ponctués, les points plus ou moins alignés après les épaules ; chaque élytre pourvu de quatre petits fascicules de poils brun foncé : trois sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian), un au côté latéral du basilaire ; en outre, deux petits fascicules préapicaux.

Noir ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre, variée de brun jaunâtre et d'un peu de blanchâtre ; la cou-

leur blanche plus dense sur les côtés du disque du pronotum, où elle forme une bande longitudinale, et à la base des élytres. Sur chaque élytre, après l'épaule, une tache noirâtre, de forme triangulaire. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre, variée de jaunâtre ; les côtés des sterna couverts d'une pubescence jaune, variée de brun rougeâtre ; la partie apicale des tibias brun foncé ; les antennes de couleur brune, la partie apicale des articles annelée de blanchâtre.

Longueur : 8 mm. 1/2 à 9 mm. 1/2. Largeur : 3 mm. 1/2 à 4 millimètres.

Décrit par FÄHRÆUS sur des individus de Cafrerie. *Annulicornis Pasc.* est un synonyme.

Localités : De la colonie du Cap : Grahamstown, au sud, jusqu'à la Colonie du Kénia, à l'Ouganda et au nord du Congo belge ; partout commun.

15. *pseudocaffer Breun.*

Crossotus pseudocaffer Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 315.

Très proche de *caffer Fähr.*, mais le pronotum plus grossièrement ponctué ; l'épine latérale plus large, un peu recourbée ; sur chaque élytre, en outre un septième petit fascicule de poils, situé obliquement sur le disque après l'épaule, et un huitième près de la suture, après l'écusson ; les bandes latérales du pronotum blanches et plus distinctes. La pubescence des élytres est plus claire, blanchâtre, variée de jaune, sauf après les épaules et sur une bande transversale post-médiane, qui restent gris noirâtre. Le dessous et les jambes également couverts de pubescence blanchâtre, sauf le bout apical des tibias et les tarsi, qui restent noirâtres.

Décrit par moi sur un individu du Zululand.

Localités : Zululand : Umfului River (Musée Britannique) ; Afrique orientale portugaise : Beira (Musée de Pretoria), Nova Choupanga (Muséum de Paris).

16. *lesnei Breun.*

Crossotus lesnei Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 315.

Proche de *caffer Fähr.*, mais moins large ; le troisième article des antennes un peu plus long que le quatrième ; les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues ; le front plus haut que large, densément et finement ponctué ; l'épine latérale très petite, parfois à peine indiquée ; le disque du pronotum plus éparsément et plus grossièrement ponctué ; l'écusson moins large ; tous les fascicules des élytres très petits ; à la moitié postérieure de chaque élytre, seulement un fascicule.

Longueur 8 mm. 1/2. Largeur : 3 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus du Fort-Posset.

Localités : Afrique équatoriale française : Haut Oubangui : Fort-Posset (Muséum de Paris) ; Congo belge : Tshibamba, Kapanga (Musée de Tervueren).

17. *parvus Breun.*

Corus parvus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 220.

Proche de *caffer Fähr.*, mais la stature plus large, moins allongée ; les lobes inférieurs des yeux plus petits ; les joues presque deux fois plus longues que ces lobes ; l'épine latérale convexe à son bord antérieur, distinctement recourbée ; le pronotum et les élytres plus grossièrement ponctué ; vers le bord latéral de chaque élytre se trouvent deux séries longitudinales de tubercules plus élevés. Toute la pubescence plus sombre.

Décrit par moi sur un individu de Rhodésie (collection ITZINGER).

18. *cretaceus Chevrl.*

Crossotus cretaceus Chevrl. 1858. Thoms. Arch. Ent. II, p. 251, pl. XIV, fig. 6.

Proche de *caffer Fähr.*, mais la stature plus large et plus courte ; la tête plus finement ponctué ; l'épine latérale du pronotum plus longue, moins pointue ; de chaque côté du bord antérieur, un petit tubercule ; le disque ponctué moins grossièrement et sans fascicules ni tubercules ; les élytres ponctué moins grossièrement, les points non alignés.

Noir ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre ; une large bande longitudinale de chaque côté du pronotum, les côtés de l'écusson et une bande oblique postmédiane, qui descend vers la suture, couverts d'une pubescence jaune blanchâtre, ainsi que le dessous, les jambes et les antennes ; les jambes tachetées de brun ; les antennes non annelées.

Longueur : 9 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

Décrit par CHEVROLAT sur un individu de Vieux-Calabar.

Localités : Nigéria : Vieux-Calabar (Musée Britannique) ; Congo belge : Sassa (Musée de Tervueren).

19. *lævidorsis Kolbe*

Crossotus lævidorsis Kolbe 1893. Stett. ent. Ztg. LIV, p. 269.

m. alboplagiata nov.

Proche de *caffer Fähr.*, mais les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; le disque du pronotum

non ponctué, sauf quelques points épars sur les côtés; les points des élytres très gros après les épaules et aussi alignés; à la moitié apicale de chaque élytre ne se trouve qu'un seul fascicule de poils.

Les côtés du pronotum et la base des élytres non couverts d'une pubescence plus claire, blanchâtre; seulement quelques petites taches blanches le long de leur bord latéral et de la suture; les sterna (en partie), les cuisses et la moitié basilaire des tibias couverts d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 7 à 8 millimètres. Largeur : 3 mm. à 3 mm. 1/2.

C'est la forme typique, décrite par KOLBE sur des individus de *Derema*.

m. *alboplagiata* nov.

Une bande longitudinale de chaque côté du pronotum et une grande tache rhomboïdale en commun à la suture des élytres, sont de couleur blanche; cette tache s'étend de l'écusson jusqu'au bord latéral (un peu après le milieu) et de là à la suture (qu'elle atteint au commencement du tiers apical).

Type : un ♂ de la collection ITZINGER, du Territoire de Tanganyika.

20. *latus* Breun.

Corus latus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 220.

Proche de *caffer Fahr.*, mais la stature plus large et plus courte; les tubercules antennifères à peine élevés, sans fascicules; les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues; la tête très finement ponctué; le pronotum finement ponctué; l'épine latérale plus petite; les élytres moins allongés, moins grossièrement ponctués, les points non alignés.

Toute la pubescence un peu plus claire, jaune paille pâle, sauf à la partie médiane du disque du pronotum et à la place d'une bande transversale postbasilaire, assez large sur les élytres, ces parties couvertes de pubescence brune; les antennes également brunes, variées de blanchâtre et annelées de blanchâtre au bout apical des articles à partir du troisième.

Décrit par moi sur un individu de Dakar.

Localités : Sénégal : Dakar; Betschuanaland (Muséum de Paris); Nyassaland : Chiromo (Musée Britannique).

21. *lævepunctatus* Breun.

Corus lævepunctatus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 221.

Très proche de *latus mihi*, mais la stature plus allongée et moins large; le pronotum ponctué plus finement; l'épine latérale minime, pointue; les élytres ponctués plus finement.

Toute la pubescence beaucoup plus sombre, brune, variée de gris; sur chaque élytre une ligne discale post-médiane brun foncé, qui descend obliquement vers la suture.

Longueur : 9 millimètres. Largeur : 3 mm. 3/4.

Décrit par moi sur un individu de l'Angola : Rivière Cubia (Muséum de Paris).

22. *exiguus* Breun.

Corus exiguus Breun. 1939. Festschr. E. Strand V, p. 159.

Proche de *caffer Fahr.*, mais le troisième article des antennes un peu plus long que le quatrième; les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues; la tête et le pronotum plus densément et assez finement ponctués; l'épine latérale un peu plus longue; le disque du pronotum sans tubercules ou fascicules; les élytres plus densément et plus finement ponctués.

La partie latéro-antérieure du pronotum, la base des élytres, et une large bande transversale médiane sur les élytres (qui n'atteint pas le bord latéral), couvertes d'une pubescence gris foncé; pas de bande plus claire sur les côtés du pronotum, mais une tache claire à la base après l'épine latérale.

Longueur : 14 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2.

Type de la Colonie du Kénia : Kashitu, au Musée Britannique.

23. *luridus* Breun.

Corus luridus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 221.

Stature en ovale allongé. Les antennes fines, distinctement moins longues que le corps (♀), non frangées en dessous; le scape peu long, triqué; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, quatre fois plus longs que les joues. Le front densément et très finement ponctué. Le pronotum transversal, densément et très finement ponctué, trilobé à la base, pourvu d'un petit tubercule latéral conique pointu, rapproché de la base; l'écusson large, tronqué au sommet. Sur chaque élytre, trois petits fascicules de poils jaunes (un au milieu de la base, un postbasilaire et un postmédian). Le métasternum peu densément et très finement ponctué.

Noir, couvert d'une pubescence blanchâtre ou jaune pâle, parfois jaunâtre à la surface.
 Longueur : 9 millimètres. Largeur : 4 millimètres.
 Localité : Territoire du Tchad, Région de Zinder, N'Guimi (Muséum de Paris).

24. *obscurus* Breun.

Corus obscurus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 221.

Stature allongée, trapue. Les antennes médiocrement fortes, ne dépassant pas le milieu des élytres (♂) ; le scape court, rond ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs aussi longs que larges, aussi longs que les joues. La tête et le pronotum assez densément et peu grossièrement ponctués. Le pronotum transversal, pourvu d'une petite épine latérale conique pointue, rapprochée de la base ; de chaque côté du disque, deux petits tubercules, dont les postérieurs sont situés plus latéralement ; l'écusson deux fois plus large que long, tronqué au sommet. Les élytres allongés, convexes, densément et assez grossièrement ponctués, et pourvus par places de rides irrégulières ; sur chaque élytre, une bosse au milieu de la base et une autre postbasilaire plus grande, surmontées toutes deux d'un fascicule de poils ; un troisième fascicule postmédian, un peu rapproché de la suture, et un préapical, rapproché du bord latéral.

Noir ; couvert d'une pubescence brune, variée de gris jaunâtre ; sur chaque élytre, une tache triangulaire post-humérale brun foncé au bord latéral.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Rhodésie (Muséum de Paris).

25. *minusculus* Breun.

Corus minusculus Breun.

Stature en ovale allongé. Les antennes médiocrement fortes, un peu moins longues que le corps, non frangées en dessous ; le scape court, fort ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les joues moitié plus longues que les lobes inférieurs des yeux. La tête densément et très finement ponctuée. Le pronotum transversal, très densément et finement ponctué, pourvu de chaque côté du milieu d'une bosse obtuse et d'une petite épine latérale pointue, rapprochée de la base ; l'écusson court, transversal. Les élytres allongés, convexes, légèrement et étroitement échancrés au sommet, densément et peu finement ponctués sur toute leur étendue ; sur chaque élytre, un tubercule dentiforme au milieu de la base, une bosse allongée discale postbasilaire, surmontée d'un fascicule de poils, une autre pareille postmédiane non loin de la suture, et une autre préapicale, rapprochée du bord latéral, également surmontée de poils ; tous les points des élytres pourvus d'un petit œil clair.

Brun noirâtre ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre, un peu plus claire sur les côtés du pronotum ; le bout apical des articles antennaires, à partir du troisième, blanchâtre.

Longueur : 6 millimètres. Largeur : 2 mm. 1/4.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Lulua, Kapanga (Musée de Tervueren).

26. *nyassanus* Breun.

Corus nyassanus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 220.

Stature allongée. Les antennes médiocrement fortes, un peu moins longues que le corps (♂), frangées en dessous ; le scape court, assez fort, éparsément et finement ponctué ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le front plus haut que large. La tête densément et finement ponctuée. Le pronotum très densément et peu grossièrement ponctué ; le pronotum transversal, pourvu de sillons transversaux postérieurs profonds, d'une épine latérale mince, pointue, médiocrement longue, rapprochée de la base ; l'écusson large, quadrangulaire. Les élytres allongés, médiocrement convexes, largement arrondis au sommet, très densément et finement ponctués ; chaque élytre pourvu de trois tubercules noirs (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian). Le métasternum et les jambes densément et finement ponctués.

Noir ; couvert d'une pubescence brune, marbrée de brun jaunâtre ; de chaque côté du disque, à la base, une petite tache allongée brun foncé. Sur chaque élytre, une large bande transversale gris blanchâtre. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanchâtre ; les côtés des sterna et des segments abdominaux, d'une pubescence brun jaunâtre ; le tiers apical des tibias brun foncé, les tarsi brun foncé, couverts de pubescence gris clair. Les antennes brun foncé ; le scape couvert de pubescence brun grisâtre ; le deuxième et le troisième article, d'une pubescence gris clair, les suivants d'une pubescence grise très fine, plus dense au bout apical.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu du Nyassaland : Mont Mlanje, 2.200 mètres (Musée Britannique).

27. *cylindricus* Breun.

Crossotus cylindricus Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 168.

Stature très allongée, cylindrique. Les antennes ne dépassant pas le milieu des élytres (♀), non frangées en

dessous ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, distinctement plus long que le scape. Les lobes inférieurs des yeux triangulaires, aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. La tête éparsemment et assez grossièrement ponctuée. Le pronotum cylindrique, pourvu d'une épine latérale minime pointue ; le disque éparsemment et peu grossièrement ponctué, sauf une bande longitudinale glabre au milieu ; l'écusson deux fois plus large que long. Les élytres parallèles, allongés, très convexes, grossièrement ponctués, les points un peu moins gros vers le sommet ; chaque point avec un œil clair au fond ; chaque élytre pourvu de trois petits fascicules de poils brun foncé sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian), et de quelques lignes un peu élevées à la moitié postérieure. Tout le dessous est ponctué.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun jaunâtre, tachetée de brun foncé et variée de gris clair, surtout sur le front, à la base des élytres et au milieu de leur disque ; les antennes couvertes de pubescence brune ; la partie apicale des articles, de pubescence blanche.

Longueur : 7 mm. 1/2. Largeur : 2 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Katanga, Lubumbashi (Musée de Tervueren).

28. *flavus* Breun.

Crossotus flavus Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 169.

Stature en ovale allongé, assez large. Les antennes dépassant peu le milieu des élytres (♀), ou un peu plus longues que le corps (♂), non frangées en dessous ; le scape triquètre ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, beaucoup moins longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une épine latérale conique, d'un très petit tubercule de chaque côté du bord antérieur et d'une bosse obtuse de chaque côté du milieu ; l'écusson deux fois plus large que long. Les élytres allongés, médiocrement convexes, finement granulés à la base, ensuite grossièrement ponctués ; les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils bruns sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence jaune paille ; les bosses discales du pronotum et la moitié basilaire des élytres, surtout vers les côtés, plutôt brun rougeâtre ; la partie apicale des tibias brune.

Longueur : 10 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Sassa.

Localités : Congo belge : Sassa (Musée de Tervueren), forêt de Mœra (Musée de Vienne).

Genre 12 : *Mimocorus* nov.

Stature en ovale allongé. Les antennes assez fines, un peu plus longues que le corps, non frangées ; le scape court, très fort, très grossi à sa partie médiane ; le troisième article beaucoup plus long que le quatrième, deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, mais très élevés. Les yeux grossièrement facetés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux. Le front plus haut que large.

Le pronotum court, transversal, aplati en dessus, étranglé avant et après le milieu, pourvu au milieu du bord latéral d'une longue épine assez mince et pointue ; l'écusson large.

Les élytres allongés, médiocrement convexes, un peu plus larges que le pronotum, arrondis au sommet, pourvus de crêtes et tubercules dans toute leur étendue.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très étroite, beaucoup moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale étroite, légèrement inclinée à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre ; les cuisses linéaires.

Type : *quadricristatus mihi*. Une seule espèce de l'Afrique orientale.

I. *quadricristatus* nov.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. La tête et le pronotum assez densément et très finement ponctués ; l'écusson quadrangulaire, tronqué au sommet. Les élytres densément et peu finement ponctués ; les points très fins à la moitié postérieure ; sur chaque élytre, une haute crête trilobée au milieu de la base, une courte crête longitudinale postmédiane, très haute et tranchante, un tubercule pointu, élevé, entre ces deux crêtes ; un autre tubercule préapical au milieu du disque ; les épaules très proéminentes, en forme de crête dentelée, pareil au bord latéral de la crête postbasilaire ; une série de petits tubercules après lui (jusqu'au commencement du tiers apical), et un tubercule préapical au milieu du disque ; les épaules très proéminentes, en forme de crête dentelée, dépassant beaucoup le bord latéral ; une série de petits tubercules partant de cette crête jusqu'au commencement du tiers apical, et une autre à côté du bord latéral, partant en dessous de l'épaule et se courbant avant le sommet vers le tubercule discal préapical.

Brun ; couvert d'une pubescence brun foncé ; le front, la partie intérieure des joues et la partie entre les tubercules antennifères jusqu'au bord antérieur des lobes supérieurs des yeux couverts d'une pubescence blanche dense. De chaque côté du disque du pronotum, une assez large bande longitudinale blanche, qui s'étend latéralement jusqu'à

la pointe de l'épine latérale, de la base jusqu'à l'étranglure prémédiane. Sur chaque élytre, une grande tache blanche allongée. au tiers apical sutural ; la partie basilaire des élytres couverte d'une pubescence brun jaunâtre. Le dessous, les cuisses et les tibias densément parsemés de cils blanchâtres ; le bout apical des tibias et les tarses couverts de pubescence blanchâtre. Les trois premiers articles antennaires parsemés de cils blanchâtres ; les articles 4 à 10 des antennes blancs au bout apical.

Longueur : 8 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2.

Type du Territoire du Tanganyika : Ousambara, dans la collection SCHALL.

Genre 13 : **Crossotus** Serv.

Crossotus Serv. 1835. Ann. Soc. ent. Fr. IV, p. 52.

Crossotus Cast. 1840. Hist. Nat. Col. II, p. 467.

Crossotus Thoms. 1860. Ess. Class. Cer., p. 34 ; 1864. Syst. Cer., p. 372.

Crossotus Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 506, 508.

Crossotus + *Crossotides* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192, 193.

Stature allongée ou en ovale allongé. Les antennes médiocrement fortes, frangées ou non, moins longues ou jusqu'à moitié plus longues que le corps ; le scape peu long, souvent triquètre ; le troisième article distinctement plus long que le scape, aussi long ou un peu plus long que le quatrième ; le onzième souvent courbé du côté intérieur et plus densément frangé chez les ♂♂ ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, le plus souvent peu élevés. Les yeux assez grossièrement facettés, fortement échancrés.

Le pronotum transversal, pourvu d'une épine latérale, parfois très petite, de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs, le plus souvent peu nets et peu profonds ; l'écusson large.

Les élytres plus ou moins allongés, arrondis ou légèrement tronqués ou échancrés au sommet, pourvus de plusieurs fascicules de poils, parfois très petits, dont au moins un après le milieu.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très courte, de la hauteur des hanches, arquée ou plus ou moins raide tronquée surtout à son bord antérieur ; la saillie mésosternale moins large que longue, tronquée verticalement ou plus rarement inclinée à son bord antérieur ; les jambes peu longues, fortes.

Type : *plumicornis* Serv. Trente-quatre espèces de l'Afrique.

HINTZ a limité le genre *Crossotus* aux espèces qui ont les articles antennaires en partie très densément et en partie éparsément frangées, et rangé toutes les autres espèces dans son sous-genre *Crossotides* ; je trouve cette séparation pas nécessaire, d'autant plus que parmi les espèces réunies alors dans les *Crossotides*, les différences sont en partie plus importantes que celles entre les deux sous-genres. Je considère donc *Crossotides* comme synonyme de *Crossotus*.

AURIVILIUS cite quarante espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. Douze de ces espèces sont à exclure du genre : *seriemaculatus* Hintz et *fascicularis* Fairm. se rangeant dans le genre *Gasponia* Fairm., *caffer* Fähr., *collaris* Chevrl., *costiger* Qued., *cretaceus* Chevrl., *lacunosus* Fähr., *lavidosis* Kolbe et *lignarius* Guér. dans le genre *Corus* Pasc., *coquereli* Fairm. dans le genre *Idactus* Pasc. (tribu des *Ancylonotini*), *hovanus* Fairm. dans le genre *Epirochroides* mihi et *unifasciatus* Thoms. dans le genre *Frea* Thoms. En outre, *bimaculatus* Auriv. est une aberration de *tubericollis* Fairm. et *robustus* Jord. un synonyme de cette espèce ; *heimschi* Peyerimh. synonyme de *subocellatus* Fairm., de même *philippi* Gah. ; *meridionalis* Hintz un synonyme de *stypticus* Pasc., *obtusus* Hintz un synonyme de *albicollis* Guér., *oculatus* Hintz un synonyme de *stigmaticus* Fähr., *sennaarensis* Hintz un synonyme de *sublineatus* Gestro et *validus* Gah. une morpha de *brunneopictus* Fairm.

Par contre *brunneopictus* Fairm., *capucinus* Gerst. et *stypticus* Pasc., rangés dans le Catalogue dans le genre *Dichostathes* Thoms., appartiennent au genre actuel, ainsi que *molossus* Duviv., rangé dans le Catalogue au genre *Crossotofrea* Hintz.

Depuis j'ai décrit vingt-six espèces, dont *basimaculatus* s'est révélé synonyme de *brunneopictus* Fairm. m. *valida* Gah. et *itzingeri* synonyme de *æthiops* Dist., et dont onze se rangent dans le genre *Corus* Pasc.

1. *molossus* Duviv.

Dichostathes molossus Duviv. 1892. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVI, p. 359.

Crossotus cristatus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 235.

Stature en ovale allongé, large. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), densément frangées en dessous ; le scape médiocrement long ; le troisième article à peine plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs aussi longs que larges, plus de deux fois plus longs que les joues. Le front éparsément ponctué. Les lobes inférieurs aussi longs que larges, plus de deux fois plus longs que les joues. Le front éparsément ponctué. Le pronotum très large, pourvu d'une grande épine droite et émoussée, peu rapprochée de la base, et d'une bosse obtuse de chaque côté du milieu ; les côtés du disque densément et grossièrement ponctués. Les élytres allongés, très convexes, rétrécis dès les épaules, très grossièrement ponctués (les points plus fins vers le sommet),

très grossièrement granulés jusqu'au delà du tiers basilaire ; chaque élytre pourvu de cinq fascicules de poils brun foncé (un petit basilaire non loin de l'écusson, un grand postbasilaire après lui, deux petits un peu après le milieu, situés l'un à côté de l'autre : l'intérieur au milieu du disque, l'extérieur non loin du bord latéral, et un cinquième petit au commencement du quart apical après l'intérieur postmédian). La saillie prosternale tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale pourvue d'un tubercule conique à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre. Toute la surface couverte de courts poils noirs érigés.

Noir ; entièrement marbré de brun et de gris clair, varié d'un peu de jaune ; la couleur brune dominant sur la région postbasilaire des élytres. Le dessous du corps et les jambes brun grisâtre varié de jaune ; le dernier segment abdominal jaune d'ocre. Les antennes brunes ; la base des articles (à partir du troisième) annelée de gris clair.

Longueur : 15 à 20 millimètres. Largeur : 8 mm. à 9 mm. 1/2.

Décrit par DUVIVIER sur des individus de Djabir-Bandja. *Cristatus Jord.* est un synonyme.

Localités : Togo : Kpandu (Musée de Steil) ; Cameroun (Musée de Dresde) ; Gabon : Kuilu (JORDAN) ; Congo belge : Djabir-Bandja (DUVIVIER), Beni (Musée de Vienne), Leopoldville, Stanleyville, Leverville, Barumbu, Lukolela, Bas-Uélé, Buta, Sankuru, Kondué (Musée de Tervueren).

2. *strandii Breun.*

Crossotus strandii Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 166.

Très proche de *molossus Duviv.*, mais s'en distinguant comme suit : Les lobes inférieurs des yeux un peu plus larges que longs, moins de deux fois plus longs que les joues ; toute la tête densément et très grossièrement ponctuée ; l'épine latérale du pronotum plus longue, un peu moins large ; le disque plus densément et plus grossièrement ponctué, sans bosse obtuse ; les élytres très grossièrement ponctués à la moitié basilaire, granulés seulement aux épaules ; chaque élytre pourvu de cinq petits fascicules de poils jaune rougeâtre et d'un grand fascicule de poils brun foncé postbasilaire ; le fascicule basilaire et le postbasilaire situés au milieu du disque un peu plus latéralement que chez *molossus* ; au milieu, trois fascicules, situés obliquement l'un après l'autre (l'intérieur non loin de la suture, un peu avant le milieu, l'extérieur un peu rapproché du bord latéral après le milieu) ; le dernier fascicule comme chez *molossus* ; parfois encore un autre petit fascicule de poils jaune rougeâtre au côté extérieur de celui-ci.

Longueur : 17 à 20 millimètres. Largeur : 8 mm. 1/2 à 9 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Gabon.

Localités : Gabon (collection ITZINGER) ; Dahomey (collection TIPPMANN).

3. *sassensis Breun.*

Crossotus sassensis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 167.

Très proche de *strandii mihi*, mais la stature plus petite, plus étroite ; les lobes inférieurs des yeux plus de deux fois plus longs que les joues ; la tête et le pronotum finement ponctués, l'épine latérale du pronotum beaucoup plus courte.

Longueur : 11 mm. 1/2. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Sassa (Musée de Tervueren).

4. *plurifasciculatus Breun.*

Crossotus plurifasciculatus Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 54.

Stature en ovale allongé. Les antennes beaucoup moins longues que le corps, non frangées ; le scape médiocrement long, peu fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape. Les lobes inférieurs des yeux presque deux fois plus longs que les joues. Le front plus haut que large. Le pronotum transversal, convexe, trilobé à la base, peu densément, plutôt finement ponctué, pourvu d'une petite épine latérale conique, un peu rapprochée de la base, et de deux bosses obtuses transversales (situées l'une après l'autre) de chaque côté du disque ; l'écusson large, quadrangulaire. Les élytres allongés, convexes, arrondis au sommet, densément et finement ponctués sur toute leur étendue ; chaque élytre pourvu d'un petit tubercule dentiforme juste après la base et de quatre petits fascicules de poils noirs : un postbasilaire un peu plus grand, un postmédian au milieu du disque, un au commencement du quart apical, un peu rapproché du bord latéral, et un préapical au milieu du disque.

Noir ; couvert d'une pubescence blanchâtre et marbré d'un peu de brun ; le dessous et les jambes densément parsemés de très petites taches brunes ; les articles antennaires, à partir du troisième, couverts d'une pubescence brun clair et annelés de gris blanchâtre à la base et au sommet.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Transvaal : Albany District, du Musée de Prétoria.

5. *albomaculatus Breun.*

Crossotus albomaculatus Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 55.

Stature allongée. Les antennes dépassant à peine le milieu des élytres, non frangées en dessous ; le scape court,

fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, distinctement plus longs que les joues. Le front plus haut que large, densément et finement ponctué ainsi que la moitié antérieure du vertex. Le pronotum court, transversal, densément et finement ponctué, pourvu d'une petite épine latérale conique tronquée, un peu rapprochée de la base, et d'une petite bosse obtuse de chaque côté du disque ; l'écusson large, trapézoïdal. Les élytres allongés, médiocrement convexes, légèrement tronqués au sommet ; leur angle marginal distinct ; densément et assez finement ponctué ; tous les points pourvus d'un petit cil blanc ; sur chaque élytre, quatre petits fascicules de poils noirs (un basilaire recourbé, un postbasilaire et deux postmédians au milieu du disque, situés l'un juste à côté de l'autre).

Noir ; couvert d'une pubescence brune, variée de gris ; de chaque côté du disque du pronotum, une bande longitudinale blanche vague ; l'écusson brun à bords latéraux blanchâtres. Sur chaque élytre, une tache latérale posthumérale ovale blanche, de nombreuses petites taches blanches transversales le long de la suture. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanchâtre et très densément parsemés (sauf au milieu du métasternum) de petites taches brunes. Les antennes couvertes de pubescence brune et densément parsemées de petits cils blancs, annelées de blanc à la base et au sommet des articles à partir du quatrième.

Longueur : 15 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de provenance inconnue, certainement de l'Afrique méridionale, du Musée de Prétoria.

6. *inermis* Breun.

Crossotus inermis Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 168.

Stature très allongée, parallèle. Les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀), densément frangées en dessous ; le scape rond ; le troisième article à peine plus long que le quatrième, distinctement plus long que le scape. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Le front finement ponctué. Le pronotum peu large, pourvu d'une petite bosse obtuse latérale (au lieu d'une épine) et d'une autre pareille avant elle ; le disque pourvu de cinq proéminences très obtuses. Les élytres très allongés, parallèles, distinctement plus larges que le pronotum, légèrement échancrés au sommet, médiocrement convexes ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils brun foncé sur le disque (un basilaire, un postbasilaire, un peu rapproché de la suture, et un postmédian).

Noir. La tête, les parties latérales du pronotum et le tiers apical des élytres couverts d'une pubescence brun rougeâtre, variée de jaune ; le disque du pronotum et les deux tiers basilaires des élytres, d'une pubescence brun jaunâtre variée de blanchâtre ; la couleur blanchâtre plus dense aux bords latéraux des élytres et en forme de tache ou bande transversale avant le fascicule postmédian. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanche, éparsement tachetés de brun ; les deux ou trois derniers segments abdominaux couverts d'une pubescence brun rougeâtre ; les antennes couvertes de pubescence dense jaune grisâtre.

Longueur : 10 mm. 1/2. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Campi-Simba.

Localités : Colonie du Kénia : Campi-Simba (Musée de Tervueren) ; Gwasso-Njiro, Yamado (Musée de Gênes) ; Somalie italienne : Modagiscio (Musée de Trieste).

7. *marshalli* Breun.

Crossotus marshalli Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 169.

Stature très allongée, étroite. Les antennes un peu plus longues que le corps (♂), assez densément frangées en dessous ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, distinctement plus long que le scape. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une assez petite épine latérale pointue. Les élytres très allongés, parallèles, peu convexes, plutôt finement ponctué, les points très fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de trois très petits fascicules de poils sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian).

Noir ; couvert d'une pubescence brun grisâtre, variée de jaune et de blanchâtre, le vertex et le disque du pronotum ornés de plusieurs lignes longitudinales brunes. Les élytres ornés de lignes longitudinales jaunes peu distinctes. De chaque côté du pronotum, une large bande longitudinale (couvrant l'épine latérale). Une tache blanchâtre sur chaque élytre avant le fascicule postmédian. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanchâtre et tachetés de brun ; les antennes d'une pubescence brune, la base des articles (à partir du troisième), d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 9 mm. 1/2. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Somalie (collection ITZINGER).

8. *schoutedeni* Breun.

Crossotus schoutedeni Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 169.

Proche de *marshalli mihi*, mais la stature plus petite ; les antennes beaucoup moins longues que le corps (♀), non frangées en dessous ; le troisième article aussi long que le quatrième ; l'épine latérale du pronotum courte, conique ; les élytres régulièrement et finement ponctué, les fascicules de poils très petits.

Longueur : 7 mm. 1/2. Largeur : 3 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de la Colonie du Kénia : Mont Elgon (Musée de Tervueren).

9. *ugandæ* Breun.

Crossotus ugandæ Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 316.

m. *ovalis* Breun.

Crossotus ovalis Breun.

Stature ovulaire. Les antennes assez fines, un peu moins longues que le corps, éparsement frangées ; le scape médiocrement long, peu fort ; le troisième article aussi long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le pronotum court, transversal, éparsement et finement ponctué, pourvu d'une petite épine latérale conique et de sillons transversaux profonds ; de chaque côté du disque, deux bosses transversales obtuses (situées l'une après l'autre) ; l'écusson large, tronqué au sommet. Les élytres allongés, convexes, densément et finement ponctués ; chaque élytre pourvu de trois petits fascicules de poils noirs (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian, situés l'un après l'autre).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun rougeâtre, variée de jaunâtre et de gris ; les parties latérales du pronotum en majeure partie d'une pubescence gris blanchâtre ; l'écusson brun foncé à bords latéraux jaune pâle ; les élytres ornés de lignes longitudinales jaunes.

Longueur : 7 à 8 millimètres. Largeur : 3 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Lac Rudolf.

Localités : Ouganda : Lac Rudolf, Ferguson Golf (Imperial Bureau of Entomology) ; Province de Turkana (Musée Britannique) ; Somalie italienne : Lugh Ferrandi (Musée de Gènes).

m. *ovalis* Breun.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues ; l'épine latérale encore plus petite.

Une série d'exemplaires de la forme typique m'a convaincu qu'*ovalis* ne forme qu'une variante d'*ugandæ*.

Somalie italienne : Dolo (Musée de Trieste).

10. *capucinus* Gerst.

Dichostathes capucinus Gerst. 1884. Jahreber. Hamb. Anst. I, p. 62.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), densément frangées en dessous de poils longs ; le scape rond, assez long ; le troisième article aussi long ou un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, aussi longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale droite, courbée un peu en arrière au sommet, et de deux proéminences obtuses sur les côtés du disque (situées l'une après l'autre) ; les côtés du disque grossièrement ponctués. Les élytres allongés, convexes, très grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de quatre très longs fascicules de poils jaune rougeâtre : trois sur le disque, un peu rapprochés de la suture (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian), et un sur le calus huméral.

Brun rougeâtre ; le front et le disque du pronotum couverts d'une dense pubescence jaune rougeâtre unicolore, les joues et les parties latérales du pronotum d'une pubescence brun rougeâtre, les élytres d'une pubescence brun rougeâtre variée de jaune ; entre le fascicule postbasilaire et le postmédian se trouvent deux bandes obliques blanchâtres, tachetées de jaune (situées l'une après l'autre) ; la partie apicale des élytres de la même couleur. Le dessous couvert d'une pubescence brun rougeâtre, tacheté de jaune, le métasternum d'une pubescence blanchâtre, les antennes couvertes d'une fine pubescence jaune rougeâtre.

Décrit par GERSTÆCKER sur un individu de Pangani.

Localités : Territoire du Tanganyika : Pangani (Musée de Hambourg), Steppe des Massai (collection SOLLMANN).

11. *genalis* Auriv.

Crossotus genalis Auriv. 1913. Ark. f. Zool. VIII/21, p. 10, fig. 3.

Proche de *capucinus* Gerst., mais l'épine latérale du pronotum droite, émoussée ; avant elle, encore une proéminence obtuse de chaque côté ; les sillons transversaux du pronotum plus profonds.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence brun rougeâtre, tachetée de jaune d'ocre et de gris clair ; une bande longitudinale blanche au bord intérieur des joues, une autre pareille sur les parties latérales du pronotum et une autre gris blanchâtre sur les côtés du disque du pronotum. Sur chaque élytre, une bande gris blanchâtre s'étendant du calus huméral vers le disque ; une deuxième parallèle à elle, s'étendant du bord latéral au milieu du disque (avant le fascicule postmédian) ; la partie apicale également couverte de pubescence gris blanchâtre ainsi que le dessous ; les côtés des sterna et les jambes tachetés de brun rougeâtre, les antennes couvertes d'une pubescence grise dense.

Longueur : 8 à 10 millimètres. Largeur : 3 à 4 millimètres.

Décrit par AURIVILLIUS sur un individu de Gwasso-Njiro.

Localités : Colonie du Kénia : Gwasso-Njiro (Musée de Stockholm) ; Abyssinie : Malga Guba (Musée de Trieste), Medda Erolle (Musée de Gênes).

12. *barbatus* Gerst.

Crossotus barbatus Gerst. 1871. Arch. f. Naturgesch. XXXVII/1, p. 78.

Crossotus basalis Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 54.

Stature en ovale allongé. Les antennes assez fortes, dépassant peu le milieu des élytres (♀) ou aussi longues que le corps (♂), densément frangées de poils assez longs en dessous ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale droite émoussée et d'une proéminence obtuse avant elle ; de chaque côté du milieu du disque, une bosse obtuse. Les élytres convexes, légèrement tronqués au sommet, très grossièrement ponctués à la moitié antérieure, plus finement à la moitié postérieure ; les points plus ou moins alignés, séparés par des intervalles longitudinaux un peu élevés ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils bruns (un basilaire et un postbasilaire, rapprochés tous deux un peu de la suture, et un postmédian au milieu du disque).

Brun rougeâtre ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, marbrée de brun rougeâtre ; l'occiput et le pronotum en majeure partie d'une pubescence blanchâtre ; une bande longitudinale brun rougeâtre au milieu de l'écusson. Les élytres paraissant rayés de gris, de brun rougeâtre et de jaunâtre ; sur chaque élytre, une petite tache blanchâtre distincte avant le fascicule postmédian et une petite brune après ce fascicule. Les antennes couvertes d'une pubescence gris blanchâtre, moins dense au sommet des articles.

Longueur : 9 mm. à 11 mm. 1/2. Largeur : 4 à 5 millimètres.

Décrit par GERSTÆCKER sur des individus du Lac Jipe. *Basalis* Gah. est un synonyme.

Localités : Nyassaland ; Colonie du Kénia : Taru Desert, Voi (Musée Britannique) ; Soudan (Imperial Bureau of Entomology) ; Somalie italienne : Basso Ganana (Musée de Gênes).

13. *erlangeri* Hintz

Crossotus (*Crossotides*) *erlangeri* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 195.

Très proche de *barbatus* Gerst., mais s'en distinguant comme suit : La stature plus allongée et plus parallèle ; les antennes plus longues, un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), peu densément frangées en dessous ; les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues ; les intervalles des points des élytres distincts, mais à peine élevés, formant des bandes jaunes sur un fond gris.

Le bord inférieur des parties latérales du pronotum couvert de pubescence brune ; sur chaque élytre une tache latérale blanche, remontant très obliquement du disque vers le bord latéral.

Longueur : 9 à 11 millimètres. Largeur : 4 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par HINTZ sur des individus de Somalie.

Localités : Abyssinie : Gota (Musée de Trieste), Harrar, Diré-Daoua (Musée de Trieste) ; Somalie : Djibouti (HINTZ) ; Soudan : Salom (Imperial Bureau of Entomology).

14. *stigmaticus* Fähr.

Dichostathes stigmaticus Fähr. 1872. Œfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 37.

Crossotus (*Crossotides*) *oculatus* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 195.

Très proche de *barbatus* Gerst., mais les antennes plus longues, un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂) ; les points des élytres moins gros, non alignés et non séparés par des intervalles élevés.

Toute la surface irrégulièrement tachetée de gris blanchâtre et de brun jaunâtre ; la tache blanchâtre avant le fascicule postmédian un peu plus distincte.

Décrit par FÄHRÆUS sur des individus de Cafrerie. *Oculatus* Hintz est un synonyme.

Localités : Cafrerie (FÄHRÆUS) ; Betschuanaland, Griqualand (HINTZ) ; Nyassaland : Chiromo (Imperial Bureau of Entomology).

15. *argenteus* Hintz

Crossotus (*Crossotides*) *argenteus* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 194.

Très proche de *stigmaticus* Fähr., dont il ne forme peut-être qu'une morpha ou sous-espèce, mais a, de chaque côté, une large bande longitudinale blanche, s'étendant du bord postérieur des yeux jusqu'à la base du pronotum ; sur chaque élytre, une grande tache blanche au milieu du bord latéral, qui conflue avec celle avant le fascicule postmédian ; le métasternum couvert de pubescence blanche, parfois aussi le pronotum, sauf sa partie médiane basilaire ; parfois tout le pronotum couvert de pubescence blanchâtre.

Pourrait également être une morpha de *vagepictus* Fairmaire.

Décrit par HINTZ sur des individus de Voi et Takanugu.

Localités : Territoire du Tanganyika : Aruscha (Musée de Hambourg) ; Colonie du Kénia : Voi, Takanugu (HINTZ), Machakos (Imperial Bureau of Entomology) ; Somalie italienne : Oltre Giuba, Uarandab, Belet-Uen (Musée de Trieste).

16. *vagepictus* Fairm.

Dichostathes vagepictus Fairm. 1886. Ann. Soc. ent. Fr. (6) V, p. 456.

Très proche de *stigmaticus* Fähr., mais la stature un peu plus élancée ; les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues ; les antennes un peu moins fortes ; les élytres finement granulés à la base ; la tache blanche avant le fascicule postmédian est beaucoup plus grande.

Longueur : 8 mm. 1/2 à 11 millimètres. Largeur : 4 à 5 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Obok.

Localités : Colonie du Kénia : Maungu (collection LE MOULT) ; Obok (FAIRMAIRE) ; Somalie italienne : Oddur (Musée de Gênes), Cabredâre, Belet-Uen, Gota (Musée de Trieste) ; Abyssinie : entre Matagi et Lugh (Musée de Gênes) ; Soudan (Imperial Bureau of Entomology).

17. *lateralis* Hintz

Crossotus (*Crossotides*) *lateralis* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 194.

ab. *niveicollis* Hintz

Crossotus (*Crossotides*) *lateralis* var. *niveicollis* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 194.

Proche de *stigmaticus* Fähr., mais s'en distinguant comme suit : La stature plus allongée ; les lobes inférieurs des yeux plus longs, un peu plus longs que les joues ; de chaque côté du milieu du disque du pronotum, deux tubercules transversaux, situés l'un à côté de l'autre ; les élytres plus fortement granulés.

L'occiput et les côtés du pronotum couverts d'une pubescence blanche ; sur chaque élytre, une bande oblique blanchâtre, qui s'étend du bord latéral aux fascicules postmédiens ; tout le reste de la surface couvert d'une pubescence brun grisâtre assez foncé, variée par place d'un peu de jaune grisâtre.

C'est la forme typique, décrite par HINTZ sur des individus de Harrar.

ab. *niveicollis* Hintz

Tout le pronotum blanc.

Localités : Abyssinie : Harrar (HINTZ), Diré-Daoua (collection ITZINGER) ; Somalie italienne : Dolo, Belet-Uen, Uarandab (Musée de Trieste) ; Obok, Djibouti, Erythrée (collection LE MOULT, etc.).

18. *flavolineatus* Breun.

Crossotus flavolineatus Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 54.

Stature ovale. Les antennes médiocrement fortes, beaucoup moins longues que le corps, non frangées en dessous ; le scape peu long ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues. Le front aussi haut que large, éparsément et très finement ponctué. Le pronotum court, transversal, très finement granulé de chaque côté du milieu, pourvu d'une assez longue épine latérale tronquée au sommet et de deux bosses obtuses de chaque côté du disque (situées l'une après l'autre) ; l'écusson plus de deux fois plus large que long, tronqué au sommet. Les élytres allongés, convexes, arrondis au sommet, finement granulés à la base, ensuite densément et finement ponctués ; sur chaque élytre, un petit tubercule dentiforme basilaire et deux petits fascicules de poils (un postbasilaire et un juste après le milieu, un peu rapproché du bord latéral).

Noir ; couvert d'une pubescence grise, variée de brun rougeâtre et de jaune (surtout au quart basilaire des élytres) ; de chaque côté du vertex, à son bord postérieur, une petite tache allongée brun foncé. Les élytres ornés de lignes longitudinales jaunes nettes sur fond gris. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanchâtre, variée de brun rougeâtre et de jaune sur les côtés. Les articles antennaires couverts à partir du troisième article de pubescence brune, annelés de gris clair à la base.

Longueur : 11 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Transvaal : Pienaars River (Musée de Prétoria).

19. *strigifrons* Fairm.

Dichostathes strigifrons Fairm. 1886. Ann. Soc. ent. Fr. (6) V, p. 458, note 1.

Stature très élancée, assez étroite. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que le corps (♂), frangées en dessous de poils longs. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que les joues.

Le pronotum relativement long, pourvu d'une assez courte épine latérale émoussée et de deux bosses obtuses de chaque côté du milieu ; le disque pourvu d'un sillon transversal médian. Les élytres légèrement échancrés au sommet, fortement granulés à la base, ensuite assez grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu de trois petits fascicules de poils noirs (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian, dont le postbasilaire est assez rapproché de la suture).

Brun rougeâtre ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun grisâtre ; trois lignes longitudinales sombres sur le vertex ; une tache claire peu distincte sur chaque élytre avant le fascicule postmédian. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanchâtre, parsemés de petites taches brunes ; les antennes couvertes d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur : 5 mm. à 5 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur un individu du Soudan.

Localités : Soudan (FAIRMAIRE, Imperial Bureau of Entomology) ; Obok ; Abyssinie : Harrar (collection ITZINGER), Diré-Daoua (Musée Britannique) ; Somalie : Gaharre (Musée de Gênes).

20. *nebulosus* Fairm.

Dichostathes nebulosus Fairm. 1892. Rev. d'Ent. XI, p. 124.

Très proche de *strigifrons* Fairm., mais la stature plus grande ; les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; les élytres ponctués plus finement, à peine ou pas échancrés au sommet.

Entièrement couvert d'une pubescence jaunâtre (au lieu de blanchâtre).

Longueur : 15 à 18 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 7 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Obok.

21. *subocellatus* Fairm.

Dichostathes subocellatus Fairm. 1886. Ann. Soc. ent. Fr. (6) V, p. 458.

Crossotus philippsi Gah. 1896. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, p. 458.

Crossotus (*Crossotides*) *heimschi* Peyerimh. 1922. Bull. Soc. ent. Fr., p. 318.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), très densément frangées en dessous (♂), surtout au onzième article, ou peu densément (♀) ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, distinctement plus longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une grande épine latérale émoussée, d'une protubérance obtuse avant elle et de deux bossés transversales de chaque côté du disque (situées l'une après l'autre) ; le disque éparsement et grossièrement ponctué et pourvu d'un sillon transversal médian assez profond. Les élytres allongés, médiocrement convexes, grossièrement ponctués, les points en partie alignés, plus fins à la moitié postérieure ; granulés à la base ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils brun jaunâtre (rarement brun foncé) : un très petit basilaire, un grand postbasilaire, assez rapproché de la suture et un grand postmédian, un peu rapproché du bord latéral. La saillie mésosternale inclinée à son bord antérieur.

Brun ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de jaunâtre et de brun ; trois lignes longitudinales brun foncé sur le vertex, une autre de chaque côté du disque du pronotum, une au milieu de l'écusson. Les élytres couverts de lignes longitudinales brunes et jaune clair ; une assez grande tache blanchâtre sur chaque élytre avant le fascicule postmédian ; une tache transversale brune après ce fascicule. Le scape densément marbré de brun et de blanc, les articles suivants couverts de pubescence brune et annelés de blanchâtre à la base.

Longueur : 15 à 21 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 9 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Obok. *Philippsi* Gah. est un synonyme.

Sous le nom de *heimschi*, PEYERIMHOFF a décrit un individu de l'Erg Ignidi, se distinguant par la proéminence latérale du pronotum (avant l'épine latérale) plus prononcée, la présence d'un fascicule basilaire (qui se trouve aussi chez la forme typique !), etc. Je considère ces différences comme trop peu importantes et je range *heimschi* comme synonyme.

Localités : Obok (FAIRMAIRE) ; Somalie italienne (Musée de Trieste, etc.) ; Abyssinie : Harrar, Addis-Abéba (collection ITZINGER) ; Sahara occidental : Erg Ignidi (PEYERIMHOFF) ; Soudan : Khartoum ; Égypte : le Caire ; Arabie : la Mecque, Djidda (Musée Britannique).

22. *arabicus* Gah.

Crossotus arabicus Gah. 1896. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, p. 458.

Très proche de *subocellatus* Fairm., mais les tubercules discaux du pronotum moins prononcés ; l'épine latérale du pronotum plus large ; les points des élytres plus fins, non alignés, les fascicules de poils plus petits, noirâtres ; les élytres sans lignes longitudinales, sans tache blanchâtre et sans tache postmédiane brune.

Longueur : 12 à 18 millimètres. Largeur : 5 à 8 millimètres.

Localités : Arabie : Lalej, Djidda, la Mecque (Musée Britannique).

23. *sublineatus* Gestro

Crossotus sublineatus Gestro 1892. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, p. 788.

Crossotus (*Crossotides*) *sennaarensis* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 195.

Très proche de *subocellatus* Fairm., mais le pronotum un peu moins transversal ; l'épine latérale beaucoup moins large et plus courte, les épaules moins prononcées ; la pubescence des élytres un peu plus foncée, plutôt grise ; le scape non marbré de brun ; les fascicules souvent noirâtres.

Décrit par GERRO sur des individus de Gubbet. *Sennaarensis* Hintz est un synonyme.

Localités : Somalie italienne : Gubbet (Musée de Gênes), Dolo, Belet-Uen (Musée de Trieste) ; Soudan : Sennaar (HINTZ).

24. *brunneopictus* Fairm.

Dichostathes brunneopictus Fairm. 1891. Ann. Soc. ent. Belg. XXXV. Bull., p. 299.

m. *valida* Gah.

Crossotus validus Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 53.

Crossotus basimaculatus Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 314.

Proche de *subocellatus* Fairm., mais s'en distinguant comme suit : Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; les bosses obtuses latérales du pronotum (avant l'épine latérale) plus proéminentes, formant presque une seconde paire d'épines ; les bosses discales également plus hautes ; le disque moins grossièrement ponctué ; les élytres ponctués plus grossièrement, granulés à la base ; le fascicule postbasilaire en forme de courte crête longitudinale surmontée de poils brun foncé, le fascicule postmédian très petit ; les points non alignés.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence brune, variée de gris clair et de jaunâtre (en tout plus sombre que chez *subocellatus*) ; le vertex et le pronotum avec les mêmes lignes longitudinales sombres ; les élytres sans lignes longitudinales ; une courte bande transversale ondulée brun foncé avant le fascicule postmédian.

Longueur : 17 à 20 millimètres. Largeur : 7 mm. 1/2 à 9 millimètres.

C'est la forme typique décrite par FAIRMAIRE sur des individus de Somalie.

m. *valida* Gah.

Toute la pubescence plus claire, plus variée de blanchâtre ; sur chaque élytre, une assez grande tache brun noirâtre à l'extrême base à côté de l'écusson.

Basimaculatus mihi est un synonyme.

Localités : Territoire du Tanganyika : Kilosa ; Colonie du Kénia : Désert de Tarou (Musée Britannique) ; Gwasso-Njiro (Musée de Gênes) ; Ouganda (Musée Britannique) ; Somalie italienne : Belet-Uen (Musée de Trieste).

25. *tubericollis* Fairm.

Dichostathes tubericollis Fairm. 1891. Ann. Soc. ent. Fr. LX, p. 271.

Crossotus robustus Jord. 1894. Novit. Zool. I, p. 236.

Crossotus albomaculatus var. *vittatus* Auriv. 1914. Ark. f. Zool. VIII/29, p. 30.

ab. *bimaculata* Auriv.

Crossotus bimaculatus Auriv. 1904. Ark. f. Zool. I, p. 323.

Stature allongée, parallèle. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), un peu aplaties latéralement, frangées en dessous ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, beaucoup plus longs que les joues. Le pronotum large, un peu aplati au milieu, pourvu d'une longue épine droite émoussée, d'un tubercule obtus assez long et proéminent avant elle et de deux bosses obtuses de chaque côté du milieu (situées obliquement l'une après l'autre) ; au milieu du disque, un sillon transversal. Les élytres allongés, parallèles, un peu échancrés au bout, granulés à la base et autour des épaules, ensuite assez finement ponctués, couverts de quelques lignes longitudinales un peu élevées ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian).

Noir ; couvert d'une pubescence brun foncé, variée de jaunâtre et de gris ; le front, les joues, une large bande longitudinale au milieu du pronotum, s'atténuant vers la base, l'écusson et une tache avant le fascicule postmédian de chaque élytre, sont couverts de pubescence jaune paille ; le dessous, les jambes et les antennes, d'une pubescence brun jaunâtre, la partie apicale des articles antennaires d'une pubescence jaune clair.

Longueur : 15 à 19 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 8 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par FAIRMAIRE sur des individus du Sénégal.

Robustus Jord. et *vittatus* Auriv., ce dernier décrit comme variété d'*albomaculatus* (recte *bimaculatus*), sont des synonymes.

ab. *bimaculata* *Auriv.*

La bande médiane du pronotum et l'écusson sont de couleur brun jaunâtre, donc moins distincts.

Localités : Sénégal (FAIRMAIRE) ; Gambie ; Dahomey ; Nigeria du Nord : Bornu (Musée de Hambourg) ; Congo belge : Niam-Niam ; Ouganda (collection LE MOULT) ; Soudan (Imperial Bureau of Entomology) ; Territoire du Tanganyika (collection ITZINGER) ; Afrique orientale portugaise : Baie de Delagoa (collection STAUDINGER).

26. *klugi* *Dist.*

Crossotus klugi *Dist.* 1892. *Natur. in Transvaal*, p. 203, pl. I, fig. 8 ; 1904. *Ins. Transv.*, p. 145, pl. XIV, fig. 8.

Stature relativement courte et large. Les antennes un peu plus courtes que le corps (♂) ou beaucoup plus courtes que lui (♀), éparsément frangées en dessous ; le scape rond ; le troisième article à peine plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, un peu plus longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale mince, d'une proéminence anguleuse avant elle et de deux tubercules de chaque côté du disque (situés l'un après l'autre). Les élytres convexes, assez finement ponctués ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils noirs (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian, situé un peu plus latéralement).

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence brune, variée de gris blanchâtre ; une petite tache blanche avant le fascicule postmédian de chaque élytre. Le dessous et les jambes couverts de pubescence blanche, tachetée de brun ; les antennes, d'une pubescence brune, la partie basilaire des articles annelée de blanc.

Longueur : 11 à 15 millimètres. Largeur : 5 à 7 millimètres.

Décrit par DISTANT sur des individus de Prétoria et Rustenburg.

Localités : Transvaal : Rustenburg, Prétoria (DISTANT), Zoutpansberg (Musée de Prétoria) ; Afrique orientale portugaise : Moamba ; Sud-Ouest africain (collection LE MOULT).

27. *albicollis* *Guér.*

Crossotus albicollis *Guér.* 1844. *Iconogr. Règne anim. Ins.*, p. 249.

Crossotus (*Crossotides*) *obtusus* *Hintz* 1912. *Deuts. ent. Zs.*, p. 194.

Proche de *klugi* *Dist.*, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes densément frangées en dessous de poils longs ; l'épine latérale du pronotum plus courte ; la proéminence latérale avant elle à peine indiquée ; le fascicule de poils basilaire très petit ou disparu.

La pubescence blanchâtre plus dense sur les côtés du disque du pronotum (parfois sur tout le disque) et en forme de bande transversale médiane sur les élytres. Le dessous et les jambes couverts de pubescence brun jaunâtre, les antennes de pubescence jaune grisâtre.

Longueur : 9 mm. 1/2 à 12 millimètres. Largeur : 4 à 6 millimètres.

Décrit par GUÉRIN sur des individus du Sénégal. *Obtusus* *Hintz* est un synonyme.

Localités : Sénégal (GUÉRIN, HINTZ, etc.), Tombouctou (Muséum de Paris).

28. *freoides* *Breun.*

Crossotus freoides *Breun.*

Proche de *klugi* *Dist.*, mais le pronotum sans tubercules latéraux avant l'épine latérale ; les élytres très densément et très finement ponctués sur toute leur étendue ; sur chaque élytre, deux fascicules de poils noirâtres minimes (un postbasilaire et un postmédian).

Noir ; couvert d'une pubescence brune, marbrée de gris, cette pubescence grise plus dense sur le pronotum, le dessous, les cuisses et les tibias, qui sont parsemés de très petites taches brunes ; parfois le pronotum couvert de pubescence blanchâtre.

Longueur : 12 à 14 millimètres. Largeur : 5 à 6 millimètres.

Décrit par moi sur des individus de Belet Uen.

Localités : Somalie italienne : Belet Uen (Musée de Trieste), village Duca degli Abruzzi (Musée de Gênes).

29. *sahariensis* *Breun.*

Crossotus sahariensis *Breun.* 1938. *Festschr. E. Strand IV*, p. 219.

Stature allongée. Les antennes un peu plus longues que le corps (♂) ou un peu moins longues que lui (♀) ; les trois premiers articles très densément frangés en dessous ; les suivants à peine ; le scape assez long, peu fort ; le troisième article un plus long que le quatrième ou que le scape. Les lobes inférieurs des yeux plus longs que larges, un peu plus longs que les joues. Le front plus haut que large ; trois fines carènes longitudinales sur le vertex. Le pronotum transversal, pourvu d'une assez large épine latérale peu longue, à bords parallèles, émoussé au bout, pourvu aussi de deux bosses transversales de chaque côté du disque (situées l'une après l'autre) ; l'écusson très large, arrondi au sommet. Les élytres allongés, convexes, légèrement échancrés au sommet, densément et assez grossièrement ponctués au

quart basilaire, ensuite les points de plus en plus fins ; sur chaque élytre, un très petit fascicule de poils brun foncé au milieu de la base ; un plus grand pareil, transversal, postbasilaire, et un très petit fascicule pareil juste après le milieu, situé un peu plus latéralement ; près du bord latéral, quelques lignes longitudinales irrégulières un peu élevées jusque vers le sommet.

Noir ; couvert d'une pubescence jaune paille ; les carènes sur le vertex dénudées ; juste à côté de la ligne médiane une bande longitudinale brune à la moitié antérieure du pronotum. Une tache brun rougeâtre à la base de chaque élytre à côté de l'écusson, s'étendant parfois jusqu'en arrière du fascicule postbasilaire.

Longueur : 16 à 17 millimètres. Largeur : 6 mm. à 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus du Sahara : Azbin (Air), région de Tintaboïrac, 20 km. à l'est d'Agadès (Muséum de Paris).

30. *stypticus* Pasc.

Crossotus stypticus Pasc. 1869. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, p. 205.

Crossotus (*Crossotides*) *meridionalis* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs. p. 193.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues que lui (♂), densément frangés de poils en dessous, surtout chez le ♂ ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième. Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges, un peu moins longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale émoussée, d'un tubercule émoussé avant elle et de deux tubercules obtus de chaque côté du disque (situés l'un après l'autre) ; le disque éparsement et grossièrement ponctué ; l'écusson très large, trapézoïdal. Les élytres allongés, convexes, rudement granulés à la base et aux épaules, pour le reste grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de quatre fascicules de poils, dont trois sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un postmédian) et un sur le calus huméral.

Brun rougeâtre ; entièrement couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de jaune et de brun rougeâtre (surtout au quart basilaire des élytres) ; quelques lignes longitudinales sombres sur le vertex. Une petite tache blanchâtre sur chaque élytre avant le fascicule postmédian. Les antennes couvertes de pubescence brune ; la partie basilaire des articles, à partir du troisième, couverte d'une pubescence gris blanchâtre.

Longueur : 12 à 18 millimètres. Largeur : 5 mm. à 7 mm. 1/2.

Décrit par PASCOE sur des individus du Damaraland. *Meridionalis* Hintz est un synonyme.

Localités : Damaraland : Windhuk, Karibib, Richmond (HINTZ), Cabbalis (Musée de Tervueren) ; Afrique orientale portugaise : Baie de Delagoa (Musée Britannique), Umbelusi (Imperial Bureau of Entomology) ; Rhodésie ; Territoire du Tanganyika : Namupa (collection SCHALL).

31. *æthiops* Dist.

Crossotus æthiops Dist. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, p. 375 ; 1904. Ins. Transv., p. 145, pl. XIV, fig. 9.

Crossotus itzingeri Breun. 1935. Fol. zool. et hydrob. VII, p. 169.

Très proche de *stypticus* Pasc., mais un peu plus petit et moins large ; l'épine latérale du pronotum plus petite ; les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues ; les fascicules de poils sur les élytres sont très petits, souvent minimes ; celui du calus huméral est complètement absent.

Longueur : 11 à 16 millimètres. Largeur : 4 à 6 millimètres.

Décrit par DISTANT sur des individus de Barberton. *Itzingeri mihi* est un synonyme.

Localités : Transvaal : Barberton (DISTANT) ; Afrique orientale portugaise : Baie de Delagoa, Sikumba (collection STAUDINGER) ; Zambèze, Nova Choupanga (Muséum de Paris) ; Afrique centrale anglaise : Blantyre (Musée de Hambourg) ; Rhodésie (collection ITZINGER).

32. *plumicornis* Serv.

Crossotus plumicornis Serv. 1835. Ann. Soc. ent. Fr. IV, p. 53.

Crossotus plumicornis Cast. 1840. Hist. Nat. Col. II, p. 467.

Crossotus plumicornis Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 508.

m. *damarensis* Hintz

Crossotus plumicornis ssp. *damarensis* Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 192.

m. *natalensis* White

Crossotus natalensis White 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, p. 273.

Crossotus natalensis Fahr. 1872. (Efvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 37.

Crossotus vestiticornis Fairm. 1882. Ann. Soc. ent. Belg. XXVI. Bull., p. LVI.

Crossotus plumicornis Dist. (*nec* Serv.) 1904. Ins. Transvaal, p. 146, pl. XIV, fig. 7.

Proche de *stypticus* Pasc., mais la stature un peu plus allongée et moins large ; les tubercules antennifères un peu plus élevés ; les trois premiers articles des antennes et la moitié apicale du quatrième et du cinquième article des antennes frangés beaucoup plus densément en dessous que le reste des antennes ; ces poils assez longs.

C'est la forme typique, décrite par SERVILLE sur des individus du Sénégal.

m. *dâmarensis* Hintz

Les poils de la frange des antennes sont relativement courts, beaucoup moins longs que chez la forme typique. Cette forme domine au Sud-Ouest Africain.

m. *natalensis* White

Ces poils au contraire très longs, plus longs que chez la forme typique.

Cette forme domine en Afrique méridionale et orientale. *Vestiticornis Fairm.* est un synonyme.

Localités : Sénégal (SERVILLE) ; Afrique équatoriale française : Tombouctou, Bas-Chari, Fort-Lamy, (Muséum de Paris) ; Abyssinie : Harrar (collection ITZINGER) ; Somalie italienne : Mogadiscio (Musée de Trieste) ; Ouganda : Sud du Lac Albert (Imperial Bureau of Entomology) ; Colonie du Kénia : Tsavo River, Tsabaki (Musée de Tervueren) ; Territoire du Tanganyika : Lindi (KOLBE) ; Rhodésie (Musée de Tervueren) ; Sud-Ouest Africain : Windhuk (collection STAUDINGER) ; Namaqualand ; Colonie du Cap (Musée Britannique).

33. *bifasciatus* Kolbe

Crossotus bifasciatus Kolbe 1900. Berl. ent. Zs. XLV, p. 307, pl. IV, fig. 6.

Stature en ovale allongé. Les antennes un peu moins longues que le corps (♂) ou beaucoup moins longues que lui (♀), éparsément frangées en dessous, sauf à la moitié apicale du troisième et du quatrième article, qui sont pourvus d'une frange extrêmement dense de poils très longs ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères assez élevés. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, beaucoup moins longs que les joues. Le pronotum large, pourvu d'une courte et large épine latérale droite et émoussée, et de deux tubercules obtus de chaque côté du milieu (situés l'un après l'autre) ; au milieu du disque, un sillon transversal assez profond. Les élytres allongés, convexes, grossièrement ponctués à la moitié antérieure, les points plus fins vers le sommet ; chaque élytre pourvu de trois fascicules de poils noirs sur le disque (un basilaire, un postbasilaire, un peu rapproché de la suture, et un postmédian).

Brun rougeâtre ; couvert d'une pubescence brune ; une bande longitudinale jaune de chaque côté du pronotum (couvrant l'épine latérale) ; l'écusson également jaune. Sur chaque élytre, une large bande transversale prémédiane jaune et une deuxième pareille préapicale ; le sommet des élytres également couvert de pubescence jaune. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence jaune paille, tachetés de brun, les antennes couverts d'une pubescence brune.

Longueur : 15 à 18 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus de Mahonda.

Localités : Territoire du Tanganyika : Mahonda (KOLBE), Ndanda, Lukuledi (collection SCHALL) ; Rhodésie (collection ITZINGER) ; Zambèze : Caia (Musée Britannique).

Espèce de position incertaine.

34. *saxosicollis* Fairm.

Crossotus saxosicollis Fairm. 1893. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVII, p. 155.

Ne connaissant pas cette espèce (le type unique de FAIRMAIRE, qui devait se trouver à Zurich, étant perdu, selon M. SCHNEIDER-ORELLI), je reproduis sa description originale :

« Robustus, fusco-piceus, nitidus, pube pallido-grisea vestitus ; capite inter oculos late canaliculato, fronte subtiliter sulcatula, vertice utrinque plicatulo ; antennis rufo-piceis, elytrorum apice, parum superantibus, basi et articulo ultimo dense ciliatis ; prothorace transverso, basi elytris fere dimidio angustiore, basi transversim bisulcato, disco paulo post medium transversim elevato-plicato, ante basin quadrituberoso, tuberculis duo medianis fere contiguus, lateribus ante medium dente sat valido, apice obtuso armatis et antice obtuse tuberosis ; scutello fere lævi, apice truncato, medio impressiusculo ; elytris brevibus, sat fortiter convexis, ad humeros angulatis, apice fere truncatulis, basi grosse, profunde ac dense punctatis, rugosulis et utrinque tuberculo sat grosso sed planato, haud rugoso signato, punctis medio minoribus et apice obsoletis, stria suturali impressa ; subtus dense vestitus, segmento ventrali ultimo late sinuato, pedibus punctis denudatis sparsutis. — Ogaden.

« L'unique individu de ce *Crossotus* est malheureusement dépouillé de sa vestiture, dont il ne reste des traces en dessus que dans les points et les dépressions, mais qui est intacte et plus grossière en dessous ; il est remarquable par les deux gros plis ou tubercules transversaux du corselet, la base étant munie de trois tubercules dont le médian est fortement bilobé ; l'écusson est nettement tronqué. »

Genre 14 : **Phanis** *Fairm.*

Phanis Fairm. 1893. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVII, p. 42.

Stature en ovale allongé. Les antennes assez courtes, médiocrement fortes, éparsément frangées en dessous ; le scape peu long, triquètre ; le troisième article un peu moins long que le quatrième, plus long que le scape ; les articles 5 et suivants, aplatis latéralement. Les yeux assez grossièrement facettés, très fortement échancrés ; les lobes inférieurs un peu transversaux.

Le pronotum large, trilobé à la base, pourvu de deux épines latérales larges et émoussées (l'antérieure distinctement plus courte), d'un large tubercule inférieur émoussé de chaque côté du bord antérieur, d'une fine carène longitudinale au milieu du disque, et d'un bourrelet longitudinal obtus de chaque côté du disque.

Les élytres allongés, médiocrement convexes, arrondis au sommet, pourvus de fascicules de poils.

La tête rétractile.

La saillie prosternale assez large, de la hauteur des hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale assez large, moins large que longue, tronquée verticalement à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre.

Toute la surface couverte de longs poils érigés noirs.

Type : *armicollis Fairm.* Une seule espèce d'Abyssinie.

1. *armicollis Fairm.*

Phanis armicollis Fairm. 1893. Ann. Soc. ent. Belg. XXXVII, p. 42.

Les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un peu plus longues (♂). Les joues un peu plus longues que les lobes inférieurs des yeux. La tête éparsément et assez grossièrement ponctuée. Le pronotum densément et grossièrement ponctué ; l'écusson large. Les élytres couverts d'un réseau de lignes très peu élevées ; grossièrement ponctués, les points plus fins vers le sommet ; granulés à la base ; chaque élytre pourvu de quatre fascicules de poils longs, dont trois sur le disque (un basilaire, un postbasilaire et un grand postmédian, qui est situé un peu plus latéralement) et un quatrième postbasilaire au bord latéral du postbasilaire discal.

Noir ; la tête, le pronotum et la base des élytres couverts d'une pubescence brun rougeâtre ; le reste des élytres, d'une pubescence grise ; le réseau de lignes, d'une pubescence brun rougeâtre. Une large bande longitudinale jaune ou blanchâtre de chaque côté du disque du pronotum. Une courte bande oblique blanchâtre sur chaque élytre avant le fascicule postmédian. Le dessous et les jambes couverts d'une pubescence blanchâtre éparsée, variée de jaune rougeâtre, les antennes couvertes d'une pubescence brune, la partie basilaire et apicale des articles, à partir du troisième, d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 12 à 16 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus de Schoa.

Localités : Abyssinie : Schoa (Musée de Gênes) ; Forêt de Djem-Djem (Musée Britannique).

Genre 15 : **Gasponia** *Fairm.*

Gasponia Fairm. 1892. Rev. d'Ent. XI, p. 123.

Stature allongée, assez large. Les antennes fortes, très courtes, ne dépassant pas le milieu des élytres ; les articles 3 à 5 très densément frangés en dessous de longs poils noirs ; les articles 4 à 11 pourvus latéralement d'un très fin sillon longitudinal ; le scape rond ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les yeux assez grossièrement facettés, fortement échancrés.

Le pronotum large, pourvu d'une longue épine latérale assez mince, d'une protubérance obtuse latérale avant elle, de deux bosses obtuses, peu élevées, de chaque côté du disque et d'un sillon transversal peu profond près du bord antérieur et du bord postérieur ; l'écusson large.

Les élytres allongés, plus larges que le pronotum, convexes, arrondis au sommet, pourvus de fascicules de poils alignés.

La tête rétractile.

La saillie prosternale assez large, de la hauteur des hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale moins large que longue, tronquée verticalement à son bord antérieur ; les jambes assez courtes.

Type : *gaurani Fairm.* Deux espèces de l'Afrique orientale et méridionale.

AURIVILLIUS range ce genre, dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING, parmi la tribu des *Ceroplesini*, à cause du sillon latéral des articles antennaires. Mais comme ce sillon est très étroit, tout autre que chez les *Ceroplesini*, et que l'ensemble des autres caractères concorde avec les *Crossotini*, je le range dans la tribu actuelle.

AURIVILLIUS cite une espèce. *Fascicularis Fairm.*, dont *seriemaculatus Hintz* est un synonyme, et qui sont tous deux rangés dans le Catalogue parmi les *Crossotus Serv.*, vient également se ranger dans le genre actuel.

1. *gaurani Fairm.*

Gasponia gaurani Fairm. 1892. Rev. d'Ent. XI, p. 123.

Crossotus penicillatus Gah. 1904. Ins. Transvaal, p. 146, pl. XIV, fig. 10.

Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, beaucoup plus longs que les joues. Le front à peine ponctué. L'épine latérale du pronotum pointue ; de chaque côté du milieu, deux tubercules obtus. Les élytres très grossièrement ponctués à la moitié antérieure.

Noir ; entièrement couvert d'une dense pubescence brun jaunâtre ; les fascicules de poils noirs sur les élytres sont cernés de blanc. Une bande longitudinale dorsale à la moitié apicale des tibias, est de couleur brun foncé. Les antennes brun foncé ; les deux premiers articles et la partie basilaire du troisième et du quatrième article couverts d'une pubescence brun jaunâtre, les articles 5 à 11, d'une pubescence brun grisâtre.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus d'Obok. *Penicillatus Gah.* est un synonyme.

Localités : Obok (FAIRMAIRE) ; Territoire du Tanganyika : Bihawana (collection SCHALL) ; Transvaal : Waterberg (Musée Britannique).

2. *fascicularis Fairm.*

Crossotus fascicularis Fairm. 1887. Ann. Soc. ent. Fr. (6) VII, p. 337.

Crossotus seriemaculatus Hintz 1912. Deuts. ent. Zs., p. 193.

Très proche de *gaurani Fairm.*, mais s'en distinguant comme suit : Les lobes inférieurs des yeux seulement un peu plus longs que les joues ; le front assez densément ponctué ; l'épine latérale du pronotum émoussée ; de chaque côté du disque du pronotum deux bosses très peu élevées ; les élytres moins grossièrement ponctués.

Le pronotum couvert d'une pubescence moins dense, tacheté de noir sur le disque. Les articles 6 à 11 des antennes couverts d'une pubescence brun grisâtre et annelés de blanc au bout apical.

Longueur : 11 à 15 millimètres. Largeur 5 mm. à 6 mm. 1/2.

Décrit par FAIRMAIRE sur des individus de Tabora. *Seriemaculatus Hintz* est un synonyme.

Localités : Territoire du Tanganyika : Tabora (FAIRMAIRE), Lindi, Lukuledi (HINTZ), Usagara (collection ITZINGER).

Genre 16 : **Tambusa** Dist.

Tambusa Dist. 1905. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, p. 205.

Stature allongée ; les antennes à peu près de la longueur du corps, frangées en dessous ; le scape court, très fort, très convexe au milieu de son bord supérieur, ensuite un peu étranglé, le troisième article aussi long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape ; tous les articles suivants assez courts ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux assez grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs petits. Le front beaucoup plus large que haut, pourvu d'un petit tubercule au bord intérieur des lobes inférieurs des yeux.

Le pronotum transversal, pourvu d'une grande épine latérale un peu recourbée (ayant le bord antérieur convexe), d'une haute crête longitudinale tranchante de chaque côté du disque et d'un petit tubercule médian postérieur.

Les élytres allongés, convexes, légèrement échancrés au sommet, pourvus de crêtes et de tubercules.

La tête rétractile.

La saillie prosternale peu large, moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale large, légèrement inclinée vers son bord antérieur. Les jambes de longueur moyenne ; les cuisses claviformes.

Type : *marleyi Dist.* Une seule espèce de l'Afrique méridionale.

Dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING, ce genre était rangé dans la tribu des *Ancylonotini*. N'ayant le scape ni granulé à sa partie apicale, ni cicatrisé, il doit être exclu de cette tribu et se range dans la tribu actuelle.

1. *marleyi Dist.*

Tambusa marleyi Dist. 1905. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, p. 205, fig.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Le front et le pronotum irrégulièrement ridés ; les crêtes discales du pronotum arrondies à leur bord antérieur, tronquées verticalement à leur bord postérieur ; les épaules proéminentes. Chaque élytre pourvu d'une haute crête (formée par de petits tubercules), qui s'étend en arc de l'épaule à la suture (les tubercules devenant plus petits vers la suture), qu'elle atteint avant le milieu, de trois grands tubercules au commencement du quart apical (situés obliquement l'un après l'autre, le sutural le plus en avant) et de nombreux très petits tubercules dispersés irrégulièrement.

Brun ; couvert d'une pubescence brun rougeâtre ; le disque du pronotum après les tubercules et l'espace entre les crêtes courbées des élytres d'une pubescence brun foncé ; le front, le pronotum avant les tubercules discaux, et, sur chaque élytre, une bande transversale après les crêtes courbées, ainsi que la partie près de la suture avant le sommet, sont couverts de pubescence blanchâtre ou jaune pâle.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur 4 mm. 1/2 à 6 mm. 1/2.

Décrit par DISTANT sur des individus de Durban.

Localités : Natal : Durban ; Lourenço-Marquez (Musée Britannique).

Genre 17 : **Hecyroides** Breun.

Hecyroides Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 62.

Stature allongée ; les antennes assez fines, atteignant le milieu des élytres (♂♂) ou pas même (♀♀), non frangées en dessous ; le scape très court, fort ; le deuxième article moitié moins long que le scape ; le troisième article deux fois plus long que le scape, distinctement plus long que le quatrième ; les articles 5 à 11 réunis à peine aussi longs que le troisième et le quatrième pris ensemble ; les tubercules antennifères très distants l'un de l'autre, très peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs un peu transversaux. Le front plus large que haut.

Le pronotum court, transversal, très convexe, légèrement trilobé à la base ; les bords latéraux fortement arrondis ; le disque pourvu de bosses ; l'écusson large, quadrangulaire.

Les élytres allongés, convexes, distinctement plus larges que le pronotum à la base, rétrécis au quart apical, arrondis au sommet, pourvus de crêtes.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très étroite, moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale peu large, inclinée à son bord antérieur. Les jambes peu longues, fortes ; les cuisses claviformes.

Type : *lateriplagiatus Breun.* Une seule espèce de l'Afrique orientale.

1. *lateriplagiatus Breun.*

Hecyroides lateriplagiata Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 62.

Le scape éparsément et finement ponctué. Les lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les joues. La tête assez densément et finement ponctuée ; de chaque côté du milieu du vertex, une petite bosse allongée. Le pronotum très densément et très finement ponctué, pourvu de chaque côté du milieu du disque d'une petite bosse avant le milieu. Les élytres densément et finement ponctués sur toute leur étendue ; sur chaque élytre une crête longitudinale obtuse médiocrement élevée, et un bourrelet longitudinal, qui dépasse presque le bord latéral au commencement du quart apical. Les côtés des sterna et de l'abdomen très finement ponctués.

Noir ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée de brun et de blanchâtre sur le pronotum et les élytres ; de chaque côté du disque du pronotum, une large bande longitudinale brun rougeâtre. Sur chaque élytre, une grande tache latérale médiane brun foncé, qui s'approche un peu de la suture après le milieu et dont le bord antérieur remonte très obliquement vers le bord latéral ; le bord postérieur est un peu échancré ; cette tache limitée vers le disque par une pubescence blanchâtre, qui est interrompue par quelques lignes longitudinales jaunes. Au milieu du pronotum, parfois une étroite bande longitudinale claire. Les articles antennaires, à partir du cinquième, couverts de pubescence brune et annelés de jaune pâle à la base.

Longueur : 12 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de Kilosa.

Localités : Territoire du Tanganyika : Kilosa (Musée Britannique) ; Somalie italienne : Dolo (Musée de Gênes).

Genre 18 : **Mimoranova** Breun.

Mimoranova Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 63.

Stature allongée. Les antennes médiocrement fortes, éparsément frangées, un peu moins longues que le corps ; le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, moitié plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, très peu élevés. Les yeux assez grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs obliques. Le front beaucoup plus large que haut.

Le pronotum deux fois plus large que long, pourvu d'une grande et longue épine conique au milieu du bord latéral, qui porte une petite bosse à son bord antérieur, et d'un grand tubercule conique émoussé de chaque côté du milieu du disque ; l'écusson très large, quadrangulaire.

Les élytres allongés, médiocrement convexes, parallèles, aussi larges que le pronotum (y compris les épines latérales), largement arrondis au sommet.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre.

Type : *bifuscomaculata* Breun. Une seule espèce de Madagascar.

I. *bifuscomaculata* Breun.

Mimoranova *bifuscomaculata* Breun. 1938. Nov. Ent. VIII, p. 63.

Les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues ; la tête et le pronotum densément et très finement ponctués ainsi que les élytres sur toute leur étendue ; sur chaque élytre, une bosse discale postbasilaire à peine indiquée.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence jaune pâle et densément marbré de brun ; de chaque côté du disque du pronotum, après le tubercule discal, une tache brun foncé, qui s'étend en s'élargissant à peine jusqu'à la base du pronotum ; la partie latérale du disque et l'épine latérale couverts de pubescence jaune. Sur chaque élytre, une bande dilacérée jaune peu large, qui descend obliquement du bord latéral (après l'épaule) au milieu du disque, et une bande transversale dilacérée jaune blanchâtre assez large au commencement du tiers apical, qui est bordée de brun foncé en arrière. Les articles antennaires, à partir du cinquième, bruns sur la moitié apicale, blanchâtres sur la moitié basilaire.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 5 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Madagascar.

Localités : Madagascar : Sud-Est de Midongy (collection LE MOULT), Antongil (Muséum de Paris).

Genre 19 : *Ecyroschema* Thoms.

Ecyroschema Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 48, 365.

Ecyroschema Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 503.

Stature très allongée. Les antennes médiocrement fortes, beaucoup moins longues que le corps, non frangées en dessous ; le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, deux fois plus long que le scape ; le quatrième beaucoup plus long que le cinquième ou que les suivants ; les tubercules antennifères très rapprochés l'un de l'autre et très élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs plus longs que larges. Le front beaucoup plus haut que large, à peine plus large qu'un des lobes inférieurs des yeux, très légèrement trapézoïdiforme.

Le pronotum cylindrique, un peu plus large que long ou même un peu plus long que large, pourvu d'un tubercule émué de chaque côté du milieu du disque ; les sillons transversaux à peine indiqués.

Les élytres très allongés, parallèles, convexes, arrondis au sommet, couvert de crêtes ou lignes élevées.

La tête rétractile.

La saillie prosternale très étroite, beaucoup moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale peu large, inclinée à son bord antérieur. Les jambes peu longues, assez fortes ; les cuisses légèrement claviformes.

Type : *favosum* Thoms. Trois espèces de l'Afrique méridionale.

LACORDAIRE rangeait ce genre dans une tribu à part, mais je ne trouve pas de différences suffisantes pour le séparer des *Crossotini*.

AURIVILLIUS cite deux espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. J'en ai décrit depuis une troisième.

I. *favosum* Thoms.

Ecyroschema favosum Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 48.

Ecyroschema favosum Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 504.

Ecyroschema favosum Dist. 1904. Ins. Transvaal, p. 144, pl. XIV, fig. 2, 2 a.

Les trois premiers articles antennaires densément et très finement granulés ; les tubercules antennifères rapprochés l'un de l'autre et très élevés. Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues. Le front assez densément et très finement ponctué. Le pronotum un peu plus large que long, très densément et très finement granulé sur les côtés ; l'écusson large, triangulaire, arrondi au sommet. Les élytres très finement granulés et couverts d'une réticulation irrégulière de lignes un peu élevées ; au milieu de la base de chaque élytre une bosse allongée, peu élevée.

Brun ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée par place d'un peu de brun ; au milieu du bord latéral de chaque élytre, souvent une tache triangulaire gris jaunâtre ; le bout apical des tibias et une tache dorsale médiane sur eux, ainsi que les tarses, en majeure partie couverts de pubescence brune ; le deuxième article des antennes, le troisième (sauf à la base), la moitié apicale des articles 4 à 7 et les articles 8 à 11, sont couverts de pubescence brune.

Longueur : 7 mm. 1/2 à 9 millimètres. Largeur 2 mm. 1/2 à 3 millimètres.

Décrit par THOMSON sur des individus du Cap.

Localités : Colonie du Cap : East Somerset (Musée Britannique) ; Transvaal : Pienaars River (DISTANT) ; Nyasaland : Cholo (Imperial Bureau of Entomology) ; Congo belge : Haut Uelé, Uelé, Yebo-Moto, Boma (Musée de Tervueren).

2. *rugatum* Pasc.

Ecyroschema rugatum Pasc. 1888. Trans. ent. Soc. Lond., p. 503.

Très proche de *favosum* Thoms., mais s'en distinguant comme suit : Les tubercules antennifères encore plus rapprochés l'un de l'autre, séparés seulement par une étroite fissure ; les trois premiers articles antennaires plus fortement granulés ; le pronotum un peu plus long que large ; les élytres plus allongés, plus régulièrement ridés en formant un réseau de lignes élevées ; la pubescence plutôt de couleur brun grisâtre ; l'écusson et toute la base des élytres couverts d'une pubescence jaunâtre ; la tache médiane latérale des élytres peu distincte.

Longueur : 8 millimètres. Largeur : 2 mm. 1/3.

Décrit par PASCOE sur un individu du Lac N'gami.

Localités : Transvaal : Waterberg (Musée de Prétoria) ; Lac N'gami (Musée Britannique).

3. *multituberculatum* Breun.

Ecyroschema multituberculatum Breun.

Proche de *favosum* Thoms., mais s'en distinguant ainsi : Beaucoup plus petit, le scape à peine granulé ; les lobes inférieurs des yeux deux fois plus longs que les joues ; les élytres sans réticulation de lignes élevées ; sur chaque élytre, au milieu de la base, une courte crête longitudinale très élevée, après elle une courte crête médiane pareille et après encore un autre au commencement du tiers apical ; juste obliquement après la crête médiane se trouve un haut tubercule au milieu du disque ; un autre pareil au commencement du tiers apical, rapproché du bord latéral, et un troisième pareil préapical au milieu du disque.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre ; la partie médiane des élytres, du bord latéral à la crête médiane, d'une pubescence brun foncé ; entre la crête postbasilaire et la crête médiane se trouve une bande transversale blanchâtre qui remonte en arc vers l'épaule.

Longueur : 4 millimètres. Largeur : 1 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus du Natal : Weenen (Imperial Bureau of Entomology).

Genre 20 : *Stheniopygus* Breun.

Stheniopygus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 231.

Stature allongée. Les antennes médiocrement fortes, dépassant à peine le milieu des élytres (♀), non frangées ; le scape peu long, fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième ou que le scape ; les tubercules antennifères médiocrement élevés ; les yeux fortement facettés, fortement échanrés ; les lobes inférieurs un peu plus larges que longs ; le front aussi haut que large.

Le pronotum transversal, convexe, pourvu d'un tubercule conique latéral, rapproché de la base, d'un fin sillon transversal près du bord postérieur et d'un autre antérieur, effacé sur le disque.

Les élytres allongés, convexes, légèrement rétrécis à la moitié postérieure, largement arrondis au sommet.

La tête rétractile.

La saillie prosternale aussi haute que les hanches, régulièrement arquée ; la saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre ; les cuisses claviformes.

Type : *medioalbus* Breun. Une seule espèce du Congo.

1. *medioalbus* Breun.

Stheniopygus medioalbus Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 232.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que les joues ; le pronotum densément et finement ponctué ; l'écusson large, trapézoïdiforme ; les élytres très densément et peu grossièrement ponctués, les points plus fins et moins denses vers le sommet.

Noir ; la tête, les côtés du pronotum, la partie basilaire des élytres, plus du tiers apical des élytres, les cuisses, les tibias et les deux premiers articles des antennes, sont marbrés de rouge et de brun foncé ; le disque du pronotum, le reste des élytres et le dessous couverts de pubescence blanchâtre ; les côtés de l'abdomen marbrés de brun foncé, les tarsi couverts de pubescence brun foncé, les articles antennaires, à partir du troisième, d'une pubescence noire, annelés de blanchâtre à la base.

Longueur : 10 millimètres. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : forêt d'Ituri, 1.300 mètres (Musée Britannique).

Genre 21 : **Plectropygus** *Gah.*

Plectropygus Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 56.

Neosthenias Schwarz. 1929. Senckenberg. XI, p. 373.

Stature très allongée. Les antennes assez fortes, dépassant à peine le milieu des élytres (♀) ou atteignant le tiers apical des élytres (♂), densément frangées en dessous, sauf au scape ; le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, plus de deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères très distants l'un de l'autre, à peine élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux.

Le pronotum un peu plus large que long, très convexe, pourvu, au lieu d'une épine latérale, d'un large tubercule obtus, rapproché un peu de la base, de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs peu profonds ; le disque pourvu de cinq bosses obtuses très peu élevées. Les élytres très allongés, cylindriques, largement arrondis au sommet, pourvus de fascicules au tiers basilaire.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, beaucoup moins haute que les hanches, régulièrement arquée, très élargie en arrière, la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Les jambes peu longues, fortes ; les cuisses claviformes.

Type : *mucoreus Gah.* Une seule espèce de l'Afrique centrale.

Neosthenias Schwarz. est un synonyme.

I. **mucoreus** *Gah.*

Plectropygus mucoreus Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 56.

Neosthenias latefasciatus Schwarz. 1929. Senckenberg. XI, p. 374, fig. 29.

Les lobes inférieurs des yeux un peu moins longs que les joues. Le front, les joues et le bord antérieur du vertex éparsément et assez finement ponctués. Le disque du pronotum peu densément et assez grossièrement ponctué ; l'écusson large, arrondi au bout. Les élytres densément et grossièrement ponctués ; chaque élytre pourvu de deux petits fascicules de poils noirs (un basilaire juste au côté intérieur du calus huméral, un postbasilaire au milieu du disque, obliquement peu après le basilaire).

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence noire et marbré de rosâtre, y compris les deux premiers articles des antennes ; le métasternum et les élytres (sauf à la partie basilaire et apicale) couverts de pubescence jaune blanchâtre, cette pubescence interrompue au milieu et le long du bord latéral par la couleur du reste de la surface, les articles antennaires noirs à partir du troisième ; l'extrême base des articles annelée de gris blanchâtre ; leur bout apical de jaune.

Longueur : 19 à 22 millimètres. Largeur 6 à 7 millimètres.

Décrit par GAHAN sur un individu de Mbugani. *Latefasciatus Schwarz.* est un synonyme.

Localités : Colonie du Kénia : Mbugani (Musée Britannique), Monts Gologo (SCHWARZER) ; Nyassaland : Mont Mlanje (Musée Britannique) ; Rhodésie du Nord : Brokenhill (collection SOLLMANN).

Genre 22 : **Mycerinus** *Thoms.*

Mycerinus Thoms. 1857. Arch. Ent. I, p. 300 ; 1860. Ess. Class. Cer., p. 43 ; 1864. Syst. Cer., p. 366.

Mycerinicus Kolbe 1893. Stett. ent. Ztg. LIV, p. 71 ; 1894. Ibid. LV, p. 28.

Stature allongée ou très allongée, cylindrique. Les antennes peu fortes, non frangées en dessous, un peu moins longues que le corps (♂) ou dépassant peu le milieu des élytres (♀) ; le scape peu long, assez fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième ou que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, à peine élevés. Les yeux assez grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux. Le front convexe, aussi haut que large.

Le pronotum transversal, cylindrique, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs peu indiqués ; les antérieurs effacés sur le disque.

Les élytres allongés ou très allongés, très convexes, cylindriques, très peu plus larges que le pronotum, arrondis au sommet. Les ailes plus ou moins réduites.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, un peu moins haute que les hanches, arrondie au bord postérieur, prolongée en avant un peu au delà des hanches, tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale étroite, légèrement inclinée à son bord antérieur. Le métasternum raccourci. Les jambes peu longues, assez fortes ; les cuisses claviformes ; les tibias larges, un peu aplatis.

Type : *dorcadioides* Serv. Six espèces de l'Afrique.

Ce genre fut décrit par THOMSON sur l'espèce de SERVILLE. Plus tard KOLBE, disant que l'espèce que THOMSON considérait comme le *dorcadioides* de SERVILLE n'était pas cette espèce, mais une qui devait rentrer dans les *Niphonini*, a redécrit le genre comme *Mycerinicus*. D'après mon avis c'est un synonyme, car l'espèce de THOMSON était bien celle de SERVILLE, avec les crochets divariqués.

AURIVILLIUS cite six espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. Mais l'une d'elles, *leucoloma* Cast., est à exclure de ce genre ; elle appartient au genre *Pterolophia* Newm. (tribu des *Niphonini*) ; j'ai décrit depuis une nouvelle espèce.

1. *dorcadioides* Serv.

Apomecyna dorcadioides Serv. 1835. Ann. Soc. ent. Fr. IV, p. 78.

Apomecyna dorcadioides Cast. 1840. Hist. Nat. Col. II, p. 491.

Mycerinus dorcadioides Thoms. 1857. Arch. Ent. I, p. 301.

Mycerinicus dorcadioides (Serv.) Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg. LV, p. 27.

Stature très allongée. Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues. Le front densément et très finement ponctué. De chaque côté du pronotum, après le milieu, quelques points assez gros ; l'écusson large, arrondi au sommet. Les élytres très allongés, très éparsement et finement ponctués ; les points couverts par la pubescence. Le métasternum un peu raccourci. Les ailes un peu réduites, n'atteignent pas le sommet des élytres.

Noir ; entièrement couvert d'une dense pubescence blanchâtre ; sur chaque élytre, deux bandes longitudinales grises vagues ; le côté intérieur de la moitié apicale des tibias antérieurs et la moitié apicale du côté dorsal des tibias intermédiaires et postérieurs, sont frangés de brun foncé.

Longueur : 14 à 19 millimètres. Largeur : 4 mm. à 5 mm. 1/2.

Décrit par SERVILLE sur des individus du Sénégal.

Localités : Sénégal (Musée Britannique, etc.) ; Afrique équatoriale française : Fort-Lamy (Muséum de Paris).

2. *subcostatus* Kolbe

Mycerinicus subcostatus Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg. LV, p. 28 ; 1897. Deutsch Ost Afr. IV, p. 318, pl. IV, fig. 48 ;

Très proche de *dorcadioides* Serv., mais plus grand ; les lobes inférieurs des yeux seulement un peu moins longs que les joues ; la pubescence de la surface plutôt gris clair, blanc pur sur les bords latéraux des élytres.

Longueur : 17 mm. 1/2 à 21 mm. Largeur : 5 à 6 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus d'Irumba.

Localités : Territoire du Tanganyika : Irumba (KOLBE), Madibiri (Musée de Stockholm) ; Colonie du Kénia : Nairobi (Musée de Tervueren) ; Abyssinie (Muséum de Paris) ; Soudan : Khartoum (Musée de Gênes).

3. *limbatus* Kolbe

Mycerinicus limbatus Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg. LV, p. 28.

Proche de *dorcadioides* Serv., mais la stature un peu moins allongée ; le disque du pronotum finement ponctué ; l'écusson plus large et plus court ; les élytres plus densément ponctués, les points moins couverts par la pubescence ; le métasternum presque deux fois plus large que long ; les ailes presque complètement atrophiées.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence jaune grisâtre à gris plus ou moins foncé, plus claire sur le bord latéral des élytres ; sur le vertex et le disque du pronotum, plusieurs bandes longitudinales vagues, jaunes, rosâtres ou blanchâtres ; sept bandes pareilles plus nettes sur les élytres, qui n'atteignent pas le sommet, dont la médiane en commun à la suture ; les tibias non frangés de foncé.

Longueur : 13 à 14 millimètres. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus de Niger : Bénéué.

Localités : Haut Dahomey (Muséum de Paris) ; Niger : Bénéué (KOLBE) ; Congo belge : Katanga (Musée de Tervueren).

4. *punctiventris* Kolbe

Mycerinicus punctiventris Kolbe 1893. Stett. ent. Ztg. LIV, p. 71.

Très proche de *limbatus* Kolbe, mais les élytres moins densément ponctués ; les points non couverts par la pubescence ; les segments abdominaux également distinctement ponctués ; les tibias frangés de brun foncé comme chez *dorcadioides* Serv.

Localité : Togo : Bismarckburg (KOLBE).

5. *multilineatus* Breun.

Mycerinicus multilineatus Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 321.

Proche de *punctiventris* Kolbe, mais le disque du pronotum densément et finement ponctué ; les élytres densément et finement ponctués.

Brun ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre, plutôt grisâtre sur la moitié postérieure du pronotum, entre la première et la deuxième bande longitudinale ochracée, entre la deuxième et la troisième, et entre la cinquième et le bord latéral des élytres ; une étroite bande longitudinale médiane brune à la moitié postérieure du pronotum, prolongée par le milieu de l'écusson et le long de la suture élytrale jusqu'un peu au delà de leur milieu. Chaque élytre orné de cinq étroites bandes longitudinales ochracées. Le front, le milieu du vertex et la plus grande partie du scape marbrés de brun foncé. Les tibias non frangés de brun foncé.

Longueur : 13 millimètres. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Cameroun : Buear (Musée Britannique).

6. *brevis* Auriv.

Mycerinus brevis Auriv. 1914. Ark. f. Zool. VIII/29, p. 30.

Proche de *limbatus* Kolbe, mais plus large et moins allongé ; les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues ; l'écusson très court et très large ; les élytres non ponctués ; le métasternum deux fois plus large que long ; les jambes un peu plus courtes et plus robustes.

La pubescence claire, jaune, rosâtre ou blanchâtre, formant aussi des bandes sur le front, les joues et au bord postérieur des segments abdominaux.

Longueur : 12 à 15 millimètres. Largeur : 4 mm. 1/2 à 5 millimètres.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus de Kambowe.

Localités : Congo belge : Katanga (Musée de Tervueren), Kambowe (AURIVILLIUS) ; Rhodésie : Brokenhill (collection SOLLMANN), Gatoama (Imperial Bureau of Entomology).

Genre 23 : *Niphecyra* Kolbe

Niphecyra Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg. LV, p. 29.

Stature très allongée. Les antennes plutôt fines, peu densément frangées de poils courts à partir du deuxième article, au plus aussi longues que le corps ; le scape court, assez fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs un peu transversaux.

Le pronotum transversal, convexe, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs (le premier antérieur réduit sur le disque), d'un petit tubercule latéral, un peu rapproché de la base, et d'une petite bosse latérale conique, rapprochée du bord antérieur.

Les élytres très allongés, parallèles, médiocrement convexes, arrondis au sommet.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, un peu moins haute que les hanches, arrondie au bord postérieur, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale peu large, inclinée ou tronquée à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre.

Type : *interpres* Kolbe. Trois espèces de l'Afrique centrale.

AURIVILLIUS cite deux espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. J'en ai décrit une troisième.

1. *rufolineata* Qued.

Hecyrida rufolineata Qued. 1888. Berl. ent. Zs. XXXII, p. 208.

Niphecyra rufolineata Kolbe 1894. Stett. ent. Ztg. LV, p. 30.

Les antennes distinctement moins longues que le corps (♂) ou dépassant à peine le milieu des élytres (♀). Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues. Le front beaucoup plus haut que large, densément et peu finement ponctué. Le disque du pronotum densément et grossièrement ponctué ; l'écusson large, arrondi au sommet. Les élytres étroits, densément et grossièrement ponctués, les points un peu moins gros vers le sommet. La saillie mésosternale inclinée.

Noir ; couvert d'une pubescence grise ; celle-ci est rougeâtre sur les parties suivantes : une bande transversale au bord antérieur du front, prolongée des deux côtés par les joues et les parties latérales du pronotum, une bande transversale au milieu du front, les bords des yeux, quatre bandes longitudinales sur le disque du pronotum, dont les latérales sont larges et couvrent les épines latérales, quatre lignes longitudinales sur chaque élytre, le bord latéral et le bord sutural des élytres, et le bord postérieur des quatre premiers segments abdominaux ; une pubescence jaune couvre les bords latéraux de l'écusson ; l'abdomen est parsemé de très petites taches dénudées ; les antennes sont couvertes d'une fine pubescence grise, le bout apical des articles d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 10 à 15 millimètres. Largeur : 3 mm. à 4 mm. 1/2.

Décrit par QUEDENFELDT sur des individus de l'Angola.

Localités : Angola (QUEDENFELDT) ; Congo belge : Lulua, Lomami, Elisabethville (Musée de Tervueren) ; Ouganda : Kampala, Gilo, Tero, Bugalla (Imperial Bureau of Entomology).

2. *interpres* Kolbe

Niphecyra interpres Kolbe 1894. Stett. Ent. Ztg. LV, p. 29.

Proche de *rufolineata* Qued., mais s'en distinguant comme suit : La stature plus grande ; les antennes distinctement moins longues que le corps (♀) ou aussi longues (♂) ; le front aussi haut que large, éparsément ponctué ; le disque du pronotum très éparsément ponctué, surtout après le milieu ; l'épine latérale un peu plus large et plus longue ; cinq bosses obtuses à peine élevées sur le disque ; l'écusson plus large ; au milieu de la base de chaque élytre se trouve une crête longitudinale très peu élevée ; la saillie mésosternale tronquée à son bord antérieur.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence jaune grisâtre, les dessins rougeâtres par suite moins nets.

Longueur : 15 à 19 millimètres. Largeur : 4 mm. 3/4 à 6 millimètres.

Décrit par KOLBE sur des individus d'Ituri.

Localités : Congo belge : Ituri (KOLBE) ; Territoire du Tanganyika : Itumba, Usagara (Musée Britannique).

3. *uniformis* Breun.

Niphecyra uniformis Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 321.

Proche d'*interpres* Kolbe, mais s'en distinguant comme suit : Les lobes inférieurs des yeux à peine plus longs que les joues, le front éparsément et finement ponctué ; quelques points plus gros sur les côtés du disque du pronotum ; trois bosses obtuses à peine élevées sur le disque du pronotum (une médiane et deux latérales antérieures) ; l'écusson un peu moins large ; les élytres sans crête basilaire ; la saillie mésosternale tronquée obliquement en avant.

Brun rougeâtre, couvert d'une pubescence brune, brun jaunâtre sur les élytres ; sur chaque élytre, quatre lignes longitudinales ochracées rougeâtres. Le dessous couvert d'une pubescence jaune grisâtre, variée d'ochracé rougeâtre, surtout au bord postérieur des segments abdominaux ; le bout apical des articles antennaires à partir du troisième souvent jaune clair.

Longueur : 19 à 22 millimètres. Largeur : 6 mm. à 6 mm. 1/2.

Localité : Congo belge : Lulua, Kapanga (Musée de Tervueren).

Genre 24 : *Hecyra* Thoms.

Hecyra Thoms. 1857. Arch. Ent. I, p. 180.

Hecyrida Thoms. 1860. Ess. Class. Cer., p. 38, 39.

Hecyrida Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 517, 518.

Stature allongée. Les antennes médiocrement fortes, densément frangées en dessous ; le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, au moins deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux. Le front rectangulaire.

Le pronotum transversal, pourvu d'un fin sillon transversal antérieur et d'un autre postérieur (l'antérieur effacé au milieu du disque) ; au bord latéral, de deux épines obtuses (une rapprochée de la base, l'autre non loin du bord antérieur), et parfois de bosses discales obtuses.

Les élytres allongés, convexes, parallèles, arrondis au sommet, pourvus de petits fascicules.

La tête rétractile.

La saillie prosternale peu large, arrondie à son bord postérieur, aussi haute que les hanches, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale étroite, tronquée verticalement à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, fortes.

Type : *terrea* Bert. Cinq espèces de l'Afrique.

Ce genre fut décrit sous le nom d'*Hecyra* ; l'auteur lui-même changea plus tard ce nom en *Hecyrida*, ce qui n'était pas nécessaire, de sorte que le premier nom reste valable.

AURIVILLIUS cite onze espèces dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING. Mais cinq de ces espèces sont à exclure du genre : *asiatica* Pic et *formosana* Pic se rangeant dans le genre *Macchotypha* Thoms., *costata* Auriv. dans mon genre *Parasphyra*, *plagicollis* Gah. dans mon genre *Hecyromorpha*, et *lutulenta* Gestro dans le genre *Pseudohecyra mihi*. En outre, *asperata* White est un synonyme de *terrea* Bert., et *blanchardi* Chevrl. un synonyme d'*obscurator* F. J'ai décrit deux autres espèces, dont je range l'une (*rufithorax mihi*) comme aberration de *tenebrioides* Fahr. Pic a décrit depuis une autre espèce, *uniformis*, mais elle appartient au genre *Macchotypha* Thoms.

1. *terrea* Bert.

- Crossotus terreus* Bert. 1849. Nov. Comment. Ac. Bonon. X, p. 431, pl. X, fig. 5.
Hecyra improba Thoms. 1857. Arch. Ent. I, p. 181.
Nyphona asperata White 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, p. 270.
Hecyrida improba Fähr. 1872. Œfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 35.
Hecyrida terrea Dist. 1904. Ins. Transvaal, p. 147, pl. XIV, fig. 3.

Stature assez large. Les antennes médiocrement fortes, un peu plus longues que le corps (♂) ou distinctement moins longues que le corps (♀) ; le troisième article deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères médiocrement élevés. Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues. Le front plus haut que large, éparsement et assez finement ponctué. Le pronotum éparsement et peu grossièrement ponctué, pourvu de deux longues et larges épines latérales obtuses (l'antérieure conique, la postérieure très large) ; le disque grossièrement et irrégulièrement ridé et granulé, pourvu de cinq bosses obtuses, dont la médiane est allongée, partagée par un sillon longitudinal et peu haute, les deux antérieures sont plus rapprochées l'une de l'autre que les deux postérieures ; l'écusson large, arrondi au sommet. Les élytres très largement arrondis au sommet, granulés à la base, ensuite peu densément et grossièrement ponctué ; les points un peu moins gros vers le sommet ; pourvus de plusieurs séries longitudinales de petits tubercules après les épaules, et parsemés de nombreux tubercules et petits fascicules de poils brun foncé ; sur chaque élytre un tubercule conique au milieu de la base, surmonté d'un fascicule de poils foncé, une bosse allongée peu après lui, un peu rapprochée de la suture, surmontée d'un long et grand fascicule de poils et de très petits fascicules à l'épaule.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence gris jaunâtre à rosâtre, parsemé de courts cils blanchâtres ; une grande tache brun foncé au milieu du vertex, une ou deux taches pareilles allongées le long du milieu du pronotum ; l'écusson brun foncé, sauf aux bords latéraux. Sur chaque élytre, une grande tache brun foncé couvrant le tiers basilaire du bord latéral jusqu'au grand fascicule discal, et quelques lignes brun foncé à la moitié postérieure, dont une discale s'étendant obliquement vers le bord latéral juste après le milieu ; le bord latéral des élytres pourvu au tiers apical de nombreux fascicules de poils blanchâtres. Le dessous et les jambes marbrés de brun foncé ; le tiers apical des tibias, la plus grande partie des tarsi et les articles antennaires, à partir du troisième (sauf à la base et au bout apical), sont couverts de pubescence brun foncé.

Longueur : 17 à 22 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par BERTOLONI sur des individus d'Imhambane. *Improba* Thoms. et *asperata* White sont des synonymes.

Localités : Natal (THOMSON) ; Sud-Ouest Africain (AURIVILLIUS) ; Angola (QUEDENFELDT) ; Transvaal, Matabeleland, Lac N'Gami (DISTANT) ; Afrique orientale portugaise (Musée Britannique, etc.), Congo belge (Musée de Tervueren). Partout commun.

2. *obscurator* F.

Lamia obscurator F. 1801. Syst. El. II, p. 291.

Omopsides blanchardi Chevrl. 1858. Rev. Zool. (2) X, p. 307 ; Cent. Longic., n° 87.

Proche de *terrea* Bert., mais s'en distinguant comme suit : La stature un peu moins large, les antennes un peu moins longues que le corps (♂), ou beaucoup moins longues que le corps (♀). Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues. Les épines latérales du pronotum un peu moins longues ; la postérieure à bords latéraux parallèles, tronquée au sommet ; le disque fortement et irrégulièrement ridé ; les tubercules discaux un peu moins élevés. Les élytres un peu moins largement arrondis au sommet, ponctué un peu plus grossièrement ; le fascicule postbasilaire plus petit, plus éloigné du basilaire, pas plus rapproché de la suture ; pas de séries longitudinales de tubercules après les épaules ; les fascicules de poils de la moitié postérieure des élytres sont plus petits ; pas de fascicules au bord latéral apical.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brune et peu nettement marbré de jaune grisâtre, sans dessins foncés ou clairs ; le bout apical des articles antennaires, à partir du deuxième, jaunâtre.

Longueur : 15 à 20 millimètres. Largeur 5 mm. à 6 mm. 1/2.

Décrit par FABRICIUS sur des individus de Guinée. *Blanchardi* Chevrl. est un synonyme.

Localités : Nigeria : Vieux-Calabar (Musée Britannique) ; Congo belge, dans presque tout le pays sauf à l'est (Musée de Tervueren).

3. *tenebrioides* Fähr.

Hecyrida tenebrioides Fähr. 1872. Œfvers. Vet. Ak. Förh. XXIX/2, p. 36.

ab *rufithorax* Breun.

Hecyra rufithorax Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 322.

Proche de *terrea* Bert., mais s'en distinguant comme suit : La stature beaucoup moins large ; les antennes un peu moins longues que le corps (♂) ou beaucoup moins longues que le corps (♀). Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues. Le front densément et plus grossièrement ponctué. Le pronotum plus densément ponctué ; les épines latérales beaucoup plus courtes ; la postérieure plus mince ; le tubercule médian du disque un peu plus élevé, souvent non sillonné au milieu, les quatre latéraux presque réunis deux à deux en sens longitudinal ; l'écusson plus large, tronqué

au sommet. Les élytres beaucoup moins largement arrondis au sommet, ponctués plus finement ; sur chaque élytre les deux fascicules de poils discaux (le basilaire et le postbasilaire) plus petits ; les autres minimes ; pas de fascicules de poils au tiers apical du bord latéral.

Toute la pubescence plus foncée, plutôt brun grisâtre ; seulement les sterna, les joues, des taches sur les jambes et l'extrême base et le bout apical des articles antennaires (à partir du deuxième), sont couverts d'une pubescence plus claire, jaune grisâtre ; la surface sans taches brun foncé nettes. Les élytres ornés de lignes longitudinales rougeâtres ; les bords latéraux du pronotum jaunâtres ; sur chaque élytre, une étroite bande gris plus clair, s'étendant obliquement en arrière un peu avant le milieu de la suture vers le bord latéral, bordée en arrière par une étroite bande foncée en zigzag ; parfois une autre bande claire pareille au commencement du quart apical.

Longueur : 12 à 19 millimètres. Largeur : 3 mm. 3/4 à 6 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par FÄHRÆUS sur des individus de Cafrerie.

ab. *rufithorax* Breun.

Une grande partie du front, les joues, le pronotum, le dessous et les cuisses couverts de rouge, ainsi que les côtés de l'écusson ; les élytres densément marbrés de rouge, sauf au quart basilaire ; les tibias annelés de rouge ; la partie apicale des articles antennaires rouge clair à partir du deuxième.

Localités : Territoire du Tanganyika (HINTZ) ; Congo belge, commun partout (Musée de Tervueren) ; Nyassaland, Afrique orientale portugaise (Musée Britannique).

4. *pallida* Breun.

Hecyra pallida Breun. 1938. Festschr. E Strand IV, p. 229.

Les antennes assez fines, aussi longues que le corps ; le troisième article plus de deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères peu élevés. Les lobes inférieurs des yeux distinctement plus longs que les joues. Le front plus haut que large, assez densément et finement ponctué à sa moitié supérieure. Les deux épines latérales du pronotum sont courtes, l'antérieure large et obtuse, la postérieure conique ; des points assez gros sur les côtés du disque ; l'écusson large, arrondi au sommet. Les élytres assez densément et très finement ponctués sur toute leur étendue ; sur chaque élytre deux petits fascicules de poils situés l'un après l'autre (un basilaire et un postbasilaire).

Brun rougeâtre ; couvert de pubescence jaune paille, variée par place de blanchâtre et de brun ; les élytres ornés de quelques lignes longitudinales discales rougeâtres et d'une tache médiane latérale brune vague ; l'abdomen brun foncé ; les segments frangés de jaune à leur bord postérieur.

Longueur : 11 mm. 1/2. Largeur : 4 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Congo belge : Haut Uelé, Dihi (Musée de Tervueren).

5. *graueri* Hintz

Hecyrida graueri Hintz 1916. Ann. Naturhist. Hofmus. Wien XXX, p. 236.

Le front finement ponctué. Le pronotum pourvu de chaque côté de la ligne médiane d'un petit tubercule après le bord antérieur. Sur chaque élytre, une série de tubercules à côté de l'écusson, et quelques tubercules situés obliquement l'un après l'autre au milieu et après le milieu ; les élytres peu densément ponctués, les points plus denses et très gros après les épaules et à la place de la tache latérale foncée.

Brun noirâtre ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun rougeâtre. Le front, les joues, une tache au bord postérieur du vertex, une tache quadrangulaire sur le pronotum, l'écusson et, sur chaque élytre, une grande tache au bord latéral avant le milieu et quelques taches plus petites au milieu et avant le sommet, ainsi que le dessous ; les segments abdominaux frangés de brun jaunâtre au bord postérieur ; les cuisses et les tibias marbrés de brun foncé et de brun rougeâtre, les tarsi brun foncé ; les articles annelés de gris blanchâtre à la base.

Longueur : 11 millimètres.

Localité : Congo belge : Beni, Ukaika (HINTZ).

Genre 25 : *Neohecyra* Breun.

Neohecyra Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 323.

Stature en ovale allongé. Les antennes aussi longues que le corps, médiocrement fortes, frangées en dessous ; le scape assez court, fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, plus de moitié plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs transversaux ; le front aussi haut que large, trapézoïdiforme.

Le pronotum transversal, convexe, pourvu de sillons transversaux antérieurs et postérieurs distincts, d'un assez court tubercule latéral émoussé, rapproché un peu de la base, d'un tubercule antérieur pareil situé un peu plus haut et

d'un troisième tubercule latero-inférieur plus long près du bord antérieur ; de chaque côté du milieu du disque, un grand tubercule conique.

Les élytres allongés, très convexes, légèrement rétrécis dès les épaules, largement arrondis au sommet, parsemés de crêtes et de fascicules de poils.

La tête rétractile.

La saillie prosternale assez large, aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, dépassant en avant les hanches, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale assez large, tronquée verticalement en avant. Les jambes de longueur médiocre, robustes ; les cuisses claviformes.

Type : *compacta Breun.* Une seule espèce de Rhodésie.

I. *compacta Breun.*

Neohecyra compacta Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 323.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Le front éparsement et assez grossièrement ponctué ; l'écusson large, trapézoïdiforme. Chaque élytre pourvu d'une courte crête longitudinale basilaire assez élevée, surmontée de fascicules de poils ochracés, d'un petit fascicule de poils noirs sur le calus huméral, et d'un autre pareil entre la crête et le fascicule huméral ; en outre les élytres parsemés d'assez nombreux petits fascicules de poils noirs formant entre autres une ligne transversale ondulée au commencement du quart apical ; le bord latéral des élytres frangé au tiers apical de longs poils jaunâtres.

Noir ; couvert d'une pubescence brune, variée d'ochracé surtout sur le disque du pronotum (sauf à sa partie médiane) et à la base des élytres autour de l'écusson. Sur chaque élytre, une tache jaunâtre près de la suture après le milieu, et une grande tache latérale médiane brune, un peu plus foncée ; les bords latéraux de l'écusson sont noirs. Le dessous couvert en grande partie d'une pubescence rosâtre ; les antennes d'une pubescence brun foncé ; les trois premiers articles marbrés de rosâtre, les suivants annelés de blanchâtre à la base.

Longueur : 16 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur un individu de Rhodésie : Nord-Est, près de Petauke, 800 mètres (Musée Britannique).

Genre 26 : **Parhecyra** *nov.*

Stature allongée. Les antennes plutôt fines, très densément frangées dès le milieu du troisième article, un peu plus longues (♀) ou un quart plus longues (♂) que le corps ; le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs plus longs que larges. Le front plus haut que large ; un petit fascicule de poils de chaque côté du milieu du vertex.

Le pronotum un peu plus large que long, très convexe, pourvu d'un fin sillon transversal juste avant la base et après le bord antérieur, et d'une mince épine assez longue (à bord parallèles, tronquée au sommet) au bord latéral, un peu rapprochée de la base.

Les élytres allongés, convexes, largement arrondis au sommet, pourvus de tubercules et crêtes.

La tête rétractile.

La saillie prosternale peu large, aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, assez fortes.

Type : *costata Auriv.* Une seule espèce du Sud-Ouest Africain, rangée dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING dans le genre *Hecyra* Thoms.

I. *costata Auriv.*

Hecyrida costata Auriv. 1908. Denkschr. d. medic. naturw. Ges. Jena XIII/I, p. 433.

Les lobes inférieurs des yeux deux fois plus longs que les joues. Le front assez densément et peu grossièrement ponctué. Le pronotum densément et finement ponctué et pourvu de quelques points assez gros sur les côtés du disque ; un peu avant le milieu du disque, un petit tubercule et, de chaque côté de la ligne médiane, au bord antérieur, un petit fascicule de poils noirs ; l'écusson triangulaire, tronqué au sommet. Les élytres finement granulés aux épaules, ensuite densément et finement ponctué ; au milieu de la base de chaque élytre, un petit tubercule, surmonté d'un fascicule de poils noirs ; après lui une courte crête longitudinale, surmontée également de fascicules de poils, et, entre cette crête et le calus huméral, une série longitudinale de petits tubercules, qui s'étendent de la base jusqu'à la fin du tiers basilaire.

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre, variée de brun sur les parties latérales du pronotum et sur les élytres ; varié de gris sur une large bande longitudinale médiane au pronotum et sur les élytres ; le dessous et les jambes densément parsemés de petites taches brunes ; sur chaque élytre une étroite bande longitudinale noire, qui s'étend du fascicule postbasilaire jusqu'au milieu de l'élytre en se courbant un peu vers la suture ; les antennes couverts de pubescence grise et marbrés de brun, l'extrême base et le bout apical des articles sont blancs.

Longueur : 13 à 15 millimètres. Largeur 4 mm. 1/2 à 5 mm. 1/2.

Décrit par AURIVILLIUS sur des individus d'Omaheke.

Localités : Sud-Ouest Africain : Kalkfontain (Musée de Stockholm), Omaheke (AURIVILLIUS), Okahandja, Otjwarongo (Musée de Hambourg).

Genre 27 : **Hecyromorpha** *nov.*

Stature allongée. Les antennes plutôt fines, très densément frangées, un peu plus longues (♀) ou un quart plus longues (♂) que le corps ; le scape court, fort ; le troisième article aussi long que le quatrième, moitié plus long que le scape ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs un peu plus longs que larges.

Le pronotum un peu plus large que long, convexe, pourvu d'un fin sillon transversal près du bord antérieur et du bord postérieur, d'une mince épine latérale assez longue (à bords parallèles, tronquée au sommet), un peu rapprochée de la base, et, sur les côtés du disque, non loin de la base, d'une seconde paire de petits tubercules.

Les élytres allongés, convexes, largement arrondis au sommet, pourvus de crêtes et de fascicules.

La tête rétractile.

La saillie prosternale assez large, aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, dépassant en avant un peu les hanches, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale tronquée obliquement à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, assez fortes.

Type : *plagicollis* Gah. Une seule espèce de l'Afrique méridionale, qui était rangée dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING dans le genre *Hecyra* Thoms.

1. *plagicollis* Gah.

Hecyrida plagicollis Gah. 1904. Ins. Transvaal, p. 147, pl. XV, fig. 5.

Les lobes inférieurs des yeux à peine plus longs que les joues. Le front assez densément et peu grossièrement ponctué. Le disque du pronotum pourvu de nombreux gros points à la moitié postérieure ; l'écusson triangulaire, tronqué au sommet. Les élytres densément et grossièrement ponctués, et pourvus de nombreux très petits fascicules de poils après le milieu ; au milieu de la base, un tubercule surmonté d'un fascicule et une courte crête après lui ; un autre petit fascicule à côté de l'écusson.

Noir ; la surface couverte d'une pubescence brun jaunâtre, marbrée de gris et de noirâtre et variée de blanchâtre sur les côtés du disque du pronotum ; tous les fascicules de poils sont noirs. Sur chaque élytre, quelques lignes noires à la base, une autre ligne ondulée au milieu et une autre pareille contournant une tache latérale postmédiane. Le dessous et les jambes couverts de pubescence gris blanchâtre et marbrés de brun ; les antennes couvertes d'une pubescence brun foncé, le bout apical de tous les articles et la base des articles 5 et suivants, sont blancs.

Longueur : 11 à 12 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2 à 4 millimètres.

Décrit par GAHAN sur des individus de Waterberg.

Localités : Transvaal : Waterberg (Musée Britannique) ; Betschuanaland : Gaberones (Muséum de Paris) ; Sud-Ouest Africain : Omarutu, Otjwarongo (Musée de Hambourg).

Genre 28 : **Pseudohecyra** *nov.*

Stature allongée, trapue. Les antennes assez fortes, frangées en dessous dès le troisième article, plus densément sur le dixième et surtout le onzième, un peu plus longues que le corps ; le scape court, fort ; le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, très élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs distinctement plus longs que larges. Le front un peu plus haut que large.

Le pronotum convexe, pourvu d'une grande épine latérale obtuse, rapprochée de la base, d'un tubercule conique latéro-supérieur avant le milieu et de deux tubercules coniques de chaque côté du disque, dont le postérieur est petit, l'antérieur grand et haut ; un fin sillon transversal au bord antérieur et au bord postérieur.

Les élytres allongés, convexes, rétrécis dès les épaules, légèrement échancrés au sommet et pourvus de tubercules et crêtes au tiers basilaire.

La tête rétractile.

La saillie prosternale aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, prolongée un peu au delà des hanches, tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Les jambes assez longues ; les tibias antérieurs et intermédiaires légèrement courbés.

Type : *tutulenta* Gestro. Une seule espèce de Somalie, qui était rangée dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING dans le genre *Hecyra* Thoms.

I. *lutulenta* Gestro

Hecyrida lutulenta Gestro 1892: Ann. Mus. Civ. Genova (2) XII, p. 789.

Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; quelques gros points au bord antérieur des lobes supérieurs des yeux. Le disque du pronotum peu densément et peu grossièrement ponctué ; l'écusson large, trapézoïdal. Les élytres peu densément et assez grossièrement ponctués ; sur chaque élytre, un tubercule conique au milieu de la base et une courte et haute crête longitudinale discale postbasilaire.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence blanchâtre, variée par places de brun clair ; le dessus, les cuisses et le scape densément couverts de petites taches brunes ; les articles antennaires suivants couverts de pubescence brun clair sauf vers la base.

Longueur : 23 millimètres. Largeur : 9 millimètres.

Décrit par GESTRO sur un individu de Somalie : Obbir (Musée de Gènes).

Genre 29 : **Biobessa** Gah.

Biobessa Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 56.

Stature allongée. Les antennes peu fortes, un peu moins longues (♂) ou beaucoup moins longues (♀) que le corps, éparsément frangées en dessous dès le troisième article ; le scape peu long, assez fort ; le troisième article trois quarts plus long que le scape, distinctement plus long que le quatrième ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, très peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, subdivisés ; les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que larges. Le front aussi haut que large ; de chaque côté du milieu du vertex, un petit fascicule de poils.

Le pronotum à peine plus large que long, très convexe, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs peu distincts (dont le deuxième antérieur effacé sur le disque), d'une petite épine conique latérale, un peu rapprochée de la base et de cinq petits tubercules discaux peu élevés.

Les élytres allongés, très convexes, largement arrondis au sommet et pourvus de petits fascicules de poils sur toute leur étendue.

La tête rétractile.

La saillie prosternale étroite, aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, saillante et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale peu large, tronquée obliquement à son bord antérieur. Les jambes peu longues, fortes ; les cuisses claviformes.

Type : *beatrice* Gah. Une seule espèce de l'Afrique orientale.

I. *beatrice* Gah.

Biobessa beatrice Gah. 1898. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, p. 56.

ab. *albicans* nov.

Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues. Quelques points épars sur les côtés du disque du pronotum et autour de ses épines latérales ; l'écusson large, arrondi au sommet, Les élytres assez densément et plutôt grossièrement ponctués, les points couverts par la pubescence ; sur chaque élytre, deux petits fascicules de poils discaux (un basilaire et un postbasilaire) et une quantité de très petits fascicules pareils à la moitié postérieure sauf au bout apical.

Noir ; couvert d'une pubescence jaune paille, variée de roussâtre sur le front, les joues, les épaules, au tiers postérieur des élytres, sur l'abdomen, sur les jambes et le scape ; tous les fascicules de poils sont de couleur ochracé rougâtre ; le reste des élytres couvert parfois d'une pubescence blanchâtre.

Longueur : 10 à 15 millimètres. Largeur : 3 mm. 1/2 à 5 millimètres.

C'est la forme typique, décrite par GAHAN sur des individus du désert de Taru.

ab. *albicans* nov.

La pubescence jaune paille remplacée par une pubescence blanche, la pubescence roussâtre par une pubescence jaune paille.

Type : une ♀ de Somalie italienne : Belet-Uen, au Musée de Trieste

Localités : Colonie du Kénia : Désert de Taru (Musée Britannique), Ikutha (collection ITZINGER), Tsavo River (Musée de Tervueren) ; Somalie italienne : Uarandab. Belet-Uen (Musée de Trieste).

Genre 30 : **Parabiobessa** Breun.

Parabiobessa Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 322.

Stature très allongée. Les antennes assez fortes, distinctement moins longues que le corps (♀), frangées en des-

sous et pourvues de cils érigés au bout apical des articles ; le scape très court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, plus de deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères très distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, échancrés ; les lobes inférieurs quadrangulaires. Le front plus haut que large.

Le pronotum un peu plus large que long, très convexe, pourvu d'un petit tubercule conique latéral, rapproché de la base, d'un autre pareil un peu rapproché du bord antérieur, situé un peu plus haut, sur le disque, et de deux sillons transversaux postérieurs à peine indiqués.

Les élytres très allongés, convexes, parallèles, largement arrondis au sommet, pourvus de fascicules au tiers basilaire.

La tête rétractile.

La saillie prosternale peu large, un peu moins haute que les hanches, arrondie au bord postérieur, un peu prolongée au delà des hanches et tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale légèrement inclinée à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, assez robustes ; les cuisses très légèrement claviformes.

Type : *ugandæ* Breun. Une seule espèce de l'Ouganda.

I. *ugandæ* Breun.

Parabiobessa ugandæ Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 322.

Les lobes inférieurs des yeux moitié plus longs que les joues. Quelques points très gros et plusieurs assez fins sur les côtés du disque du pronotum ; l'écusson large, arrondi au sommet. Les élytres finement granulés aux épaules, ensuite assez densément et finement ponctués jusqu'au sommet ; sur chaque élytre, un petit fascicule de poils brun foncé au milieu de la base et un deuxième pareil postbasilaire plus grand après lui, ainsi qu'une fine crête longitudinale peu élevée entre ces fascicules et le calus huméral, formée également par quelques très petits fascicules de poils.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée de rosâtre sur les joues, les cuisses, le métasternum et le bord postérieur des segments abdominaux ; plutôt gris blanchâtre sur les côtés du disque du pronotum, autour de l'écusson et au milieu des élytres ; le milieu de l'écusson et une étroite bande longitudinale au milieu de la moitié postérieure du pronotum sont brun foncé. Sur chaque élytre, quatre lignes longitudinales discales ochracées, réunies avant le sommet. Le métasternum et l'abdomen parsemés de nombreuses petites taches dénudées. Sur chaque élytre, plusieurs petites taches brunes, formant une étroite bande longitudinale médiane et une postmédiane, descendant toutes deux obliquement vers le bord latéral. Les cuisses et les tibias parsemés de nombreuses petites taches brunes ; les tarses couverts de pubescence gris blanchâtre et marbrés de taches brunes. Les antennes couvertes d'une pubescence brune et marbrées de gris ; la partie apicale et la partie basale des articles annelées de blanc à partir du troisième.

Longueur : 14 millimètres. Largeur : 4 mm. 3/4.

Décrit par moi sur un individu de l'Ouganda : Rououenzori, 2.000 à 3.000 mètres (Musée Britannique).

Genre 31 : **Falsobiobessa** nov.

Stature allongée, trapue. Les antennes fortes, distinctement moins longues que le corps, éparsement frangées de poils courts en dessous ; le scape court, fort ; le troisième article beaucoup plus long que le quatrième ou que le scape ; les tubercules antennifères médiocrement élevés. Les yeux finement facettés, subdivisés ; les lobes inférieurs transversaux. Le front plus haut que large ; de chaque côté du milieu du vertex, un petit fascicule de poils noirs.

Le pronotum transversal, convexe, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs, d'une grande et large épine latérale conique, obtuse au sommet, un peu rapprochée de la base et de sept bosses obtuses discales, peu élevées (trois antérieures et quatre postérieures, les deux antérieures latérales assez élevées, coniques).

Les élytres allongés, convexes, distinctement plus larges que le pronotum, arrondis au sommet, couverts de nombreux fascicules de poils.

La tête rétractile.

La saillie prosternale aussi haute que les hanches, arrondie en arrière, tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale tronquée verticalement à son bord antérieur. Les jambes de longueur médiocre, robustes ; les cuisses claviformes.

Type : *fasciculosa* Breun. Une seule espèce du Territoire du Tanganyika.

I. *fasciculosa* nov.

Les joues trois quarts plus longues que les lobes inférieurs des yeux. L'écusson large, quadrangulaire. Les élytres densément et grossièrement ponctués ; les points très gros après les épaules ; sur chaque élytre, une bosse discale également étiré en un fascicule ; un autre très grand fascicule de poils noirs ; un tubercule dentiforme basilaire avant elle, de poils noirs rangés à peu près en trois ou quatre séries longitudinales sur toute l'étendue des élytres ; leur bout apical couvert de faisceaux de poils, qui dépassent un peu le bord et le font paraître ondulé.

une courte carène longitudinale ; au côté intérieur et extérieur de cette carène, encore une autre carène longitudinale peu élevée.

Noir ; couvert d'une pubescence gris blanchâtre ; le bord antérieur du front, la lèvre supérieure, le bord extérieur des mandibules, une grande partie des joues, les tubercules antennifères et une tache de chaque côté du milieu du vertex sont de couleur rosâtre ; une bande transversale médiane sur le front, quelques petites taches sur le front et le vertex, une tache allongée médiane à la moitié postérieure du pronotum, une assez large bande longitudinale de chaque côté du disque non loin du milieu et le bord postérieur de ses épines latérales, sont couverts d'une pubescence brun foncé ; en outre le pronotum couvert de très nombreuses petites taches dénudées ; l'écusson brun foncé avec les bords latéraux jaunâtres. Le cinquième basilaire des élytres couvert d'une pubescence brun foncé à noirâtre ; les trois crêtes longitudinales et le bord postérieur du tubercule basilaire noir velouté ; sur le reste des élytres, une quantité de très petites taches brun foncé, dont deux près de la suture un peu avant le milieu, plusieurs au milieu, formant une sorte de bande transversale en zigzag, qui s'étend du bord latéral jusqu'au milieu du disque, plusieurs autres formant une sorte de bande transversale ondulée au commencement du quart apical et une série de taches pareilles le long de la suture et du bord latéral ; en outre, sur chaque élytre, une tache rosâtre au bord antérieur du tubercule basilaire et une autre pareille au bord antérieur de la carène juxtasuturale ; quatre courtes bandes longitudinales rosâtres à la fin du quart basilaire (dont les trois intérieures situées au bord postérieur des trois carènes longitudinales et la quatrième située après l'épaule) et une ligne discale rosâtre, courbée en arc (avec l'ouverture du côté basilaire) au quart apical ; l'extrême bord latéral des élytres et les épipleures au tiers apical (jusqu'à l'angle apical sutural) également rosâtres ; une bande oblique de chaque côté du métasternum et une tache oblongue de chaque côté du milieu du cinquième segment abdominal, sont rosâtres. Sur les côtés des sterna et des segments abdominaux se trouvent de nombreuses petites taches dénudées. Les jambes en grande partie (surtout en dessus) rosâtres ; les cuisses annelés de brun foncé après le milieu et avant le sommet ; le quart apical des tibias (sauf une tache rosâtre dorsale) brun foncé ; une tache dorsale sur les deux premiers articles des tarsi et la plus grande partie du troisième et du quatrième article des tarsi, sont brun foncé. Les antennes brun foncé ; les six premiers articles parsemés de cils blanchâtres ; la plus grande partie du scape, la base et le bout apical du deuxième article, l'extrême base du troisième et une tache préapicale en dessous sur cet article, la moitié basilaire du quatrième et une tache préapicale sur cet article et le quart basilaire du cinquième, sont couverts de pubescence rosâtre ; la partie basilaire des articles 6 à 11 et presque tout le dessous de ces articles, d'une pubescence jaune blanchâtre.

Longueur : 18 à 25 millimètres. Largeur : 7 mm. 1/2 à 9 mm. 1/2.

Décrit par WHITE sur des individus du Silhet. *Elongata* Pic (décrit par l'auteur comme variété de *suffusa* Pasc.), est un synonyme.

Localités : Indes britanniques : Silhet (Musée de Stockholm), Bengale, Jalpeiguri, Gasalduba (Musée de Dehra Dun) ; Laos : Louang Prabang (Muséum de Paris) ; Tonkin : Hoa Binh (Pic) ; Birmanie : Assam (GAHAN) ; Sumatra (AURIVILLIUS) ; Formose (MATSUSHITA).

2. *assamensis* Breun.

Mecchotypa assamensis Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 324.

Très proche de *delicatula* White mais : Plus petit, le disque du pronotum plus finement ponctué ; ses tubercules latéraux plus obtus ; les élytres ponctués plus finement et pourvus de quelques lignes un peu élevées à la moitié postérieure.

La pubescence plus uniforme, grise, presque sans dessins rosâtres.

Longueur : 16 millimètres. Largeur : 6 mm. 1/2.

Décrit par moi sur des individus d'Assam : Naga-Hills, Koshima (Musée de Stockholm). C'est peut-être une forme chétive de *delicatula* White.

3. *formosana* Pic

Hecyrida formosana Pic 1917. Mel. exot. Ent. XXVI, p. 7.

Mecchotypa thoracica ssp. *formosana* Schwarz. 1925. Ent. Bl. XXI, p. 65.

Mecchotypa formosana Matsush. 1933. Journ. Fac. Agric. Hokk. XXXIV, p. 355.

Très proche de *delicatula* White (peut-être à considérer comme sous-espèce de celle-ci), mais le front très finement ponctué ; le pronotum plus court ; son disque moins grossièrement ponctué ; les tubercules latéraux, surtout l'antérieur, plus courts et plus obtus ; les élytres non granulés à la base, le quart apical des élytres parsemé de taches brunes plus nombreuses.

Longueur : 18 à 19 millimètres. Largeur 7 à 7 mm. 1/3.

Localité : Formose (Pic).

4. *marmorea* Pasc.

Mecchotypa marmorea Pasc. 1864. Trans. ent. Soc. Lond. (3) III, p. 85.

Très proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : La stature un peu moins allongée, les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ou un tiers plus longues que le corps (♂) ; les lobes inférieurs des yeux

à peine moins longs que les joues ; le front plus finement ponctué ; presque pas de gros points au bord postérieur des yeux ; les côtés du pronotum moins densément ponctués ; les élytres un peu moins allongés ; le tubercule basilaire au milieu de chaque élytre moins élevé ; presque pas de carène postbasilaire.

Toute la tête et le pronotum couverts d'une pubescence rosâtre, sauf une étroite bande longitudinale au milieu du pronotum, interrompue au milieu, et une étroite bande longitudinale courbée de chaque côté du milieu, prolongée jusqu'au bord postérieur des lobes supérieurs des yeux ; pas de bande noir velouté à la base des élytres ; tout le quart apical des élytres marbré de brun et de rosâtre ; les taches rosâtres au bord postérieur de la partie basilaire brun foncé, sont plus nombreuses et moins nettes ; les deux premiers articles antennaires et le tiers basilaire du troisième article, sont rosâtres.

Longueur : 22 millimètres. Largeur : 9 millimètres.

Localité : Bornéo : Sarawak (PASCOE).

5. *adusta* Pasc.

Mœchotypa adusta Pasc. 1869. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, p. 207.

Mœchotypa insulcata Pic 1926. Mel. exot. Ent. XLVI, p. 7.

Proche de *delicatula* White, mais le front et le pronotum très éparsément ponctués.

La pubescence ressemble à celle de *marmorea* Pasc., mais la partie médiane des élytres est couverte d'une pubescence gris blanchâtre plus uniforme, ornée de petites taches brunes le long de la suture et du bord latéral, d'une grande tache latérale médiane brun foncé et d'une autre plus petite près de la suture un peu avant le milieu ; la partie apicale plus sombre, contrastant plus fortement avec la couleur claire de la partie médiane.

Longueur : 18 à 20 millimètres. Largeur : 7 mm. 1/2 à 8 millimètres.

Décrit par PASCOE sur des individus du Laos. *Insulcata* Pic est un synonyme.

Localités : Laos, Cambodge, Siam (Musée Britannique) ; Tonkin, Cochinchine (Muséum de Paris).

6. *ceylonica* Breun.

Mœchotypa ceylonica Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 230.

Proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes un peu plus longues que le corps ; les tubercules antennifères médiocrement élevés ; les lobes inférieurs un peu plus longs que les joues ; le front non ponctué. Les bosses discales du pronotum plus élevées, les tubercules latéro-supérieurs moins proéminents, plus larges ; l'épine latérale postérieure plus large, émoussée au bout. Les élytres non granulés à la base, moins densément et très finement ponctués ; sur chaque élytre, quatre fascicules de poils brun jaunâtre (un au milieu de la base, un postbasilaire après lui, un sur le calus huméral et un entre lui et le postbasilaire).

Noir ; couvert de pubescence jaune paille. Les élytres ornés de lignes longitudinales rougeâtres discales ; le front, le quart basilaire des élytres et leur tiers apical, ainsi qu'une tache triangulaire médiane latérale, sont de couleur brune. Le dessous et les jambes couverts de pubescence rosâtre ; une tache brune au milieu du dernier segment abdominal ; les antennes couvertes de pubescence brune, annelées de jaunâtre à la base à partir du troisième article.

Longueur : 21 millimètres. Largeur : 8 millimètres.

Décrit par moi sur un individu de Ceylan (Musée Britannique).

7. *suffusa* Pasc.

Niphona suffusa Pasc. 1862. Journ. of Ent. I, p. 336.

Mœchotypa arida Thoms. 1864. Syst. Cer., p. 55.

Mœchotypa arida Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 519, pl. 102, fig. 2.

Proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : La stature moins allongée ; les antennes un peu moins longues que le corps chez la ♀. Le pronotum à peine ponctué, les tubercules discaux peu développés. Les élytres moins allongés, moins densément ponctués ; sur chaque élytre deux hauts fascicules de poils noirs au milieu du disque (un basilaire, un postbasilaire), un troisième à côté du postbasilaire et un quatrième petit sur le calus huméral.

La pubescence comme chez *marmorea* Pasc., mais le quart apical des élytres couvert de la même pubescence gris blanchâtre que toute leur surface, sauf la partie basilaire, et éparsément orné de taches brun foncé ; la suture, le bord latéral et trois étroites lignes longitudinales discales sur chaque élytre, sont de couleur rosâtre. Le dessous couvert en majeure partie de rosâtre.

Longueur : 20 à 23 millimètres. Largeur 8 mm. 1/2 à 9 millimètres.

Décrit par PASCOE sur des individus du Cambodge. *Arida* Thoms. est un synonyme.

Localités : Cambodge (PASCOE) ; Siam (Musée Britannique) ; Laos (THOMSON) ; Tonkin, Cochinchine (Muséum de Paris).

8. *javana* Schwarz.

Mœchotypa javana Schwarz. 1929. Senckenberg. XI, p. 374, fig. 30, 31.

Proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes un peu moins longues que le corps

(?) ou un tiers plus longues que le corps (♂) ; les tubercules antennifères plus distants l'un de l'autre. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Le front à peine ponctué. Les sillons transversaux du pronotum moins profonds ; le tubercule latéral postérieur plus court ; l'antérieur également un peu plus court et plus large ; les bosses discales moins prononcées, le pronotum plus de deux fois plus large que long. Les élytres plus convexes, parallèles, très finement granulés à la base et aux épaules ; ensuite très finement ponctué, frangés de poils plus courts au bout apical ; sur chaque élytre une courte crête longitudinale obtuse peu élevée, au milieu de la base.

Noir ; entièrement couvert d'une pubescence brun foncé à brun grisâtre ; quelques taches au bord antérieur du front, la lèvre supérieure, le bord extérieur des mandibules, une tache entre les tubercules antennifères, une partie des joues, de chaque côté une tache après les lobes inférieurs des yeux et une de chaque côté du bord postérieur du vertex, sont de couleur rosâtre ; une tache de chaque côté du milieu du disque (parfois réunie à celle de l'autre côté) et une de chaque côté sur le tubercule latéral postérieur du pronotum, sont également rosâtres. Les élytres densément réticulés de gris blanchâtre, sauf à leur cinquième basilaire et au quart apical (où se trouvent tout de même quelques fines réticulations pareilles près de la suture) ; sur chaque élytre deux grandes taches rosâtres, une au milieu de la base et une au bord antérieur du calus huméral ; quelques très petites taches pareilles au commencement de la réticulation claire ; une ligne rosâtre discale arquée (avec l'ouverture du côté basilaire) au quart apical et quelques fines réticulations rosâtres avant le sommet. Une grande partie des hanches et le bord postérieur du métasternum et des segments abdominaux, sont de couleur rosâtre ; les cuisses annelées de rosâtre au quart apical.

Longueur : 22 à 24 millimètres. Largeur : 8 mm. 1/2 à 9 millimètres.

Localité : Java (SCHWARZER, etc.).

9. *thoracica* White

Niphona thoracica White 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, p. 266.

Mæchotypa thoracica Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 519, note 1.

Mæchotypa thoracica Rits. 1890. Not. Leyd. Mus. XII, p. 37.

Mæchotypa infasciculata Pic 1926. Mém. exot. Ent. XLVI, p. 7.

Proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : Les antennes un tiers plus longues que le corps chez le ♂, plus densément frangées en dessous ; le scape également frangé ; le troisième article deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères un peu plus rapprochés l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues. Le front à peine ponctué. L'épine latérale postérieure du pronotum plus longue, moins large ; ses bords parallèles, son sommet tronqué ; le tubercule antérieur également plus proéminent ; de chaque côté du disque, une grande bosse très élevée, se terminant en deux grands tubercules coniques ; l'écusson plus large. Les élytres finement granulés au quart basilaire, ensuite densément et finement ponctué jusqu'au sommet ; chaque élytre pourvu d'un tubercule élevé au milieu de la base et d'une bosse postbasilaire allongée après lui, tous deux surmontés d'un fascicule de poils ; un troisième petit fascicule de poils entre cette bosse et le calus huméral.

Brun foncé ; couvert d'une pubescence jaune paille, variée d'un peu de rosâtre sur les tubercules antennifères, sur les bosses discales du pronotum, sur quatre lignes longitudinales sur chaque élytre (sauf au quart basilaire et apical), sur le scape et sur les jambes. Une tache rosâtre sur toutes les hanches et de chaque côté du métasternum. Le milieu de l'écusson brun foncé. Sur chaque élytre, une tache médiane demi ronde, brun foncé, au bord latéral. Le tiers apical des tibias brun foncé ; les cuisses annelées de brun foncé après le milieu. Les antennes brun foncé ; les deux premiers articles couverts de pubescence jaune paille, l'extrême base des articles suivants jaune grisâtre.

Longueur : 16 à 22 millimètres. Largeur : 7 mm. à 8 mm. 1/2.

Décrit par WHITE sur des individus du Nord de l'Inde. *Infasciculata* Pic est un synonyme.

Localités : Indes britanniques : Silhet (WHITE), Darjeeling, Assam (Musée de Calcutta) ; Laos : Louang-Prabang, (Muséum de Paris) ; Tonkin : Hoa-Binh (PIC) ; Bornéo : Mont Kina-Balou (Musée de Stockholm).

10. *umbrosa* Lac.

Mæchotypa umbrosa Lac. 1872. Gen. Col. IX, p. 519, note 1.

Proche de *thoracica* White, mais s'en distinguant comme suit : La stature plus large ; les antennes un peu plus fortes, beaucoup moins longues que le corps ; les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues ; le front densément et plutôt grossièrement ponctué. L'épine latérale et le tubercule latéral formant des bosses obtuses, larges, très courtes ; les bosses discales peu développées ; les côtés du disque assez densément et grossièrement ponctué ; l'écusson deux fois plus large que long. Les élytres plus convexes, plus grossièrement ponctué, frangés de poils courts au sommet ; les fascicules de poils, surtout le postbasilaire, plus développés.

La pubescence à peu près la même, mais la pubescence rosâtre un peu restreinte ; une tache médiane au bord postérieur du vertex, trois bandes longitudinales sur le disque du pronotum (dont la médiane interrompue), et le fascicule postbasilaire sont de couleur brun foncé ; le quart apical des élytres marbré de brun foncé.

Longueur : 23 à 25 millimètres. Largeur : 9 mm. à 9 mm. 1/2.

Décrit par LACORDAIRE sur des individus du Laos.

Localités : Laos (LACORDAIRE) ; Birmanie (Musée Britannique).

II. *attenuata* Pic

Mœchotypa attenuata Pic 1934. Mél. exot. Ent. LXIII, p. 13.

Proche d'*umbrosa* Lac., mais s'en distinguant comme suit : La stature plus allongée ; les antennes un peu moins longues que le corps (♀) ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre et très peu élevés ; le front à peine ponctué. Le pronotum plus court, plus densément et plus grossièrement ponctué. Les élytres plus allongés, légèrement rétrécis dès les épaules, frangés de longs poils au sommet ; le bout sutural un peu prolongé ; le fascicule basilaire réuni avec le postbasilaire ; entre cette crête et la suture, encore une crête longitudinale pourvue de longs poils serrés, et un troisième fascicule pareil entre elle et le calus huméral.

Noir ; couvert (y compris les trois premiers articles des antennes) d'une pubescence grise, variée de brun rougeâtre ; l'écusson brun rougeâtre avec les bords latéraux jaune blanchâtre. Le tiers basilaire des élytres couvert de pubescence et de poils brun rougeâtre, variée d'ochracé ; sur chaque élytre, une étroite bande noirâtre un peu avant le milieu, remontant un peu obliquement de la suture vers le disque, et une tache triangulaire pareille au milieu du bord latéral. Le dessous et les jambes couverts en majeure partie d'assez longs poils gris blanchâtre ; les cuisses annelées deux fois de brun à leur moitié apicale ; la majeure partie du tiers apical des tibias et les tarsi sont brun foncé ; les articles antennaires à partir du quatrième, sont brun foncé, annelés de jaune blanchâtre à leur partie basilaire.

Longueur : 17 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Localité : Tonkin : Chapa (Pic).

12. *jeanvoinei* Pic

Mœchotypa jeanvoinei Pic 1934. Mél. exot. Ent. LXIII, p. 14.

Proche d'*attenuata* Pic, mais s'en distinguant comme suit : La stature encore plus allongée ; les antennes plus fines, un tiers plus longues que le corps (♂) ; le scape très court et excessivement fort ; le troisième article presque trois fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères rapprochés l'un de l'autre et très élevés. Le front plus étroit, assez densément et grossièrement ponctué. Les côtés du disque du pronotum densément et grossièrement fovéolés ; les deux bosses latérales à peine indiquées ; les bosses discales plus élevées ; l'écusson plus large et plus court. Les élytres parallèles ; l'angle apical sutural non prolongé ; moins convexes, plus grossièrement ponctués ; le fascicule de poils basilaire et le postbasilaire isolés ; au bord intérieur et au bord extérieur du fascicule postbasilaire, un très petit fascicule de poils noirâtre.

La pubescence comme chez *attenuata* Pic, mais le tiers basilaire des élytres couvert de la même pubescence que le reste ; la tache latérale médiane noirâtre est plus grande ; pas de bande prémédiane oblique noirâtre, mais plusieurs petites taches semblables à la moitié postérieure et sur le vertex ; une bande rosâtre sur les joues. Sur chaque élytre, trois courtes lignes longitudinales rosâtres (une au bord postérieur du fascicule postbasilaire, les deux autres à côté d'elle vers le bord latéral) et quelques lignes rosâtres irrégulières au quart apical. Le dessous et les jambes en grande partie couverts de pubescence rosâtre, les parties brun foncé à peu près comme chez *attenuata* Pic ; le tiers apical du scape, le deuxième article et la base des articles 3 à 5 sont rosâtres, la base des suivants est blanche.

Longueur : 16 millimètres. Largeur : 6 millimètres.

Localité : Tonkin : Chapa (Pic).

13. *asiatica* Pic

Hecyrida asiatica Pic 1903. Échange XIX, p. 121 ; Longic. IV/2, p. 31.

Mœchotypa asiatica Schwarz. 1929. Senckenberg. XI, p. 374.

Proche de *thoracica* White, mais la stature plus étroite ; le scape plus court ; les tubercules antennifères moins élevés ; les lobes inférieurs des yeux deux fois plus longs que les joues. Les sillons transversaux antérieurs du pronotum plus profonds ; les tubercules latéraux plus courts et plus obtus ; les tubercules discaux beaucoup moins élevés ; toute la partie médiane densément et grossièrement ponctuée ; l'écusson moins large. Les élytres à peine granulés à la base, plus finement ponctués, plus allongés ; les trois fascicules de poils de chacun d'eux un peu plus petits.

La pubescence à peu près la même ; la partie médiane claire des élytres avec l'indication de lignes longitudinales rosâtres.

Longueur : 14 à 17 millimètres. Largeur : 5 mm. 1/2 à 6 millimètres.

Décrit par Pic sur des individus du Yunnan.

Localités : Chine : Province du Yunnan (Pic), Province de Kouei-Tchéou : Pin-fa (Muséum de Paris) ; Tonkin : Hoa-Binh (collection Pic) ; Laos : Louang Prabang (Muséum de Paris) ; Assam : Ruby Mines ; Indes Britanniques : Nilghiri-Hills (Musée Britannique) ; Yanaungmyin Reserve, Pinyinmana (Musée de Dehra Dun).

14. *strandii* Breun.

Mœchotypa strandii Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 324.

Proche d'*asiatica* Pic, mais les lobes inférieurs des yeux distinctement moins longs que les joues ; le front éparsemment et finement ponctué ; le pronotum non ponctué ; les tubercules discaux peu élevés ; les latéraux beaucoup plus larges et plus obtus ; les élytres ponctués plus finement.

La pubescence identique, sauf que la tête et le pronotum sont couverts d'une pubescence uniforme brune, variée de rosâtre.

Longueur : 19 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Décrit par moi sur des individus de Cochinchine (Muséum de Paris).

15. *trifasciculata* Breun.

Mecotypa trifasciculata Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 324.

Proche d'*asiatica* Pic, mais la stature plus large ; les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; le front aussi haut que large, éparsément et grossièrement ponctué ; le pronotum plus long ; le disque plus inégal, plus profondément ponctué ; les tubercules discaux moins développés ; l'écusson plus large ; les élytres plus larges ; en outre des fascicules d'*asiatica*, un autre sur le calus huméral. La pubescence est la même.

Longueur : 16 à 18 millimètres. Largeur : 6 à 7 millimètres.

Décrite par moi sur un individu du cap Saint-Jacques.

Localités : Cochinchine : Cap Saint-Jacques ; Tonkin : Gia-dinh, Tuyen-Quan (Muséum de Paris).

16. *uniformis* Pic

Hecyrida uniformis Pic 1922. Mél. exot. Ent. XXXVII, p. 14.

Proche d'*asiatica* Pic, mais le front plus large, éparsément et grossièrement ponctué ; les bosses discales du pronotum peu élevées ; l'écusson plus large ; les élytres plus finement ponctué.

La pubescence de la surface beaucoup plus sombre, plus uniforme, brun noirâtre uniforme sur les élytres, qui sont seulement parsemés de très petits cils blanchâtres ; la pubescence du dessous, des jambes et des antennes comme chez *asiatica* Pic.

Localité : Tonkin : Ly-Con-Gin (collection Pic).

17. *sikkimensis* Breun.

Mecotypa sikkimensis Breun. 1936. Festschr. E. Strand I, p. 324.

Très proche d'*asiatica* Pic, mais la stature plus large ; les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues ; le front densément et grossièrement ponctué ; les élytres plus larges ; sur chaque élytre, un quatrième petit fascicule de poils sur le calus huméral.

La pubescence est la même, mais plus variée de rosâtre. Le dessous et les jambes couverts en majeure partie de pubescence rosâtre.

Longueur : 18 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Décrit par moi sur des individus de Darjeeling.

Localités : Indes Britanniques : Sikkim, Pedong (Musée Britannique), Province de Dehra Dun ; Bengale : Kalimpong, Samsingh (Musée de Dehra Dun). Sur *Mucuna imbricata*.

18. *coomani* Pic

Mecotypa coomani Pic 1934. Mél. exot. Ent. LXIII, p. 14.

Stature allongée. Les antennes assez fines, frangées en dessous, un peu plus longues que le corps ; le scape court, fort ; le troisième article deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères assez rapprochés l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les lobes inférieurs des yeux aussi longs que larges, trois fois plus longs que les joues. Le front plus haut que large, trapézoïdiforme, éparsément et peu finement ponctué ainsi que le vertex. Le pronotum transversal, pourvu de sillons transversaux profonds (seulement le premier antérieur effacé sur le disque) ; de chaque côté du disque, une grande bosse élevée, arrondie, saillante à son bord antérieur ; une large épine émoussée, médiocrement large (à bords parallèles, rapprochée de la base) et un tubercule saillant, mais également obtus, situé un peu plus haut non loin du bord antérieur ; le disque très éparsément et peu grossièrement ponctué ; l'écusson trapézoïdiforme, coupé droit au sommet. Les élytres allongés, convexes, peu densément et assez finement ponctué sur toute leur étendue ; les points se transformant en fins granules vers la base ; sur chaque élytre, une bosse discale basilaire allongée et une autre postbasilaire après elle, toutes deux surmontées d'un fascicule de poils.

Noir ; couvert d'une pubescence brune, variée de gris surtout sur le pronotum et la partie médiane des élytres ; leur partie basilaire et une tache latérale médiane demi ronde sont brun foncé ; le bord antérieur des tubercules discaux du pronotum et de la bosse basilaire des élytres, une courte bande longitudinale au bord postérieur de leur bosse postbasilaire et une autre pareille entre elle et le bord latéral sont de couleur rosâtre. Le dessous et les jambes couverts de pubescence rosâtre, la plus grande partie du premier et du dernier segment abdominal, le tiers apical des tibias et les deux

derniers articles des tarsi sont brun foncé : les cuisses annelées de brun après le milieu ; les tibias tachetés de brun avant le milieu. Les antennes couvertes de pubescence brun foncé, variée de rosâtre sur le scape ; la partie basilaire des articles suivants jaune blanchâtre.

Longueur : 17 millimètres. Largeur : 7 millimètres.

Localité : Tonkin : Hoa-Binh (Pic).

19. *diphysis* Pasc.

Scotinauges diphysis Pasc. 1871. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, p. 277, pl. XIII, fig. 4.

Tylophorus wulffiusi Bless. 1873. Hor. Soc. ent. ross. IX, p. 215, pl. VII, fig. 3.

Tylophorus wulffiusi Gnagl. 1884. Best. Tab. VIII, p. 537.

Mœchotypa fuliginosa Kolbe 1886. Arch. f. Naturg. LII/1, p. 221, pl. XI, fig. 38.

Mœchotypa davidis Fairm. 1887. Rev. d'Ent. VI, p. 328.

Mœchotypa fuliginosa Lewis 1893. Entom. XXVI, p. 152.

Mœchotypa wulffiusi Jac. 1911. Käf. Russl., pl. LXXI, fig. 7.

Mœchotypa diphysis Matsush. 1933. Journ. Fac. Agric. Hokk. XXXIV, p. 355.

Mœchotypa fuliginosa Heyr. 1934. Cas. česk. spol. ent. XXXI, p. 172.

Proche de *delicatula* White, mais s'en distinguant comme suit : La stature plus large et plus courte, en ovale allongé ; les antennes un peu plus fortes, un quart plus longues que le corps (♂) ou un peu moins longues que le corps (♀) ; le scape encore plus fort ; les tubercules antennifères plus distants l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Le front aussi haut que large, peu densément et finement ponctué. Le pronotum plus long ; l'épine latérale postérieure encore plus large ; tout le disque densément granulé et ponctué ; l'écusson plus de deux fois plus large que long. Les élytres moins allongés, plus grossièrement ponctués, éparsément couverts de grandes bosses rondes assez plates, à peine frangés au sommet ; sur chaque élytre, un petit tubercule au milieu de la base, une grande bosse postbasilaire, un peu plus rapprochée de la suture, tous deux surmontés de fascicules de poils noirs (le postbasilaire très grand), et un petit fascicule de poils noirs obliquement après l'épaule.

Noir ; couvert d'une pubescence brun noirâtre, les bords latéraux de l'écusson de couleur jaune paille. Le disque du pronotum éparsément marbré de jaune paille, les élytres densément (sauf à la partie basilaire). Le dessous, les antennes et les jambes couverts assez éparsément de cils jaune blanchâtre ; les hanches, les trochanters, le bord postérieur du métasternum, quelques taches sur les côtés des sterna et une de chaque côté du milieu des quatre premiers segments abdominaux sont de couleur rosâtre ; les cuisses annelées de rosâtre à la base et avant le sommet ; les tibias étroitement annelés de rosâtre peu après la base, largement au milieu ; les deux premiers articles des tarsi couverts d'une pubescence jaune grisâtre ; parfois tous les dessous du dessous sont de cette couleur ; la base des articles antennaires, à partir du quatrième, annelés de gris blanchâtre.

Longueur : 18 à 26 millimètres. Largeur : 8 mm. à 10 mm. 1/2.

Décrit par PASCOE sur des individus de l'île Tsushima. *Wulffiusi* Bless, *davidis* Fairm. et *fuliginosa* Kolbe sont des synonymes.

Localités : Sibérie orientale : Oussouri, Port Bruce (BLESSIG) ; Corée (KOLBE) ; île Tsushima (PASCOE) ; Chine : Pékin, Kalgan (Muséum de Paris).

20. *semenovi* Heyr.

Mœchotypa semenovi Heyr. 1934. Cas. česk. spol. ent. XXXI, p. 172.

Proche de *diphysis* Pasc., mais la stature un peu moins large ; les tubercules antennifères plus rapprochés l'un de l'autre ; les bosses discales du pronotum distinctes ; les épines latérales moins longues et plus émoussées ; les élytres moins élargis aux épaules, avec les bosses discales moins distinctes, et finement ponctués sur toute leur étendue.

Noir ; les parties latérales du pronotum et les élytres finement réticulés de jaune, sauf vers le bord latéral des élytres où cette réticulation devient blanche. Pas de taches claires en dessous ; la base des articles antennaires, à partir du troisième, annelée de blanc.

Longueur : 14 à 19 millimètres. Largeur : 6 à 7 millimètres.

Localité : Chine : Province du Sétchouen, Guifu-Shan, 1.500-2.000 mètres (HEYROWSKY).

21. *alboannulata* Pic

Mœchotypa alboannulata Pic 1934. Mél. exot. Ent. LXIII, p. 13.

Mœchotypa alboannulata Heyr. 1934. Cas. česk. spol. ent. XXXI, p. 173.

Très proche de *semenovi* Heyr., mais les lobes inférieurs des yeux moitié moins longs que les joues ; le fascicule postbasilaire des élytres plus grand, les élytres seulement très finement ponctués à la base et au bord latéral ; la réticulation élytrale de couleur blanche, réduite à trois bandes transversales : une prémédiane, une postmédiane et une apicale.

Localité : Chine : Province du Sétchouen, Tatsienlou (Pic).

Genre 33 : **Mæchohecyra** Breun.

Mæchohecyra Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 231.

Stature allongée, trapue. Les antennes peu fortes, beaucoup moins longues que le corps (♀♀) ou un peu plus longues que le corps (♂♂), frangées en dessous ; le scape peu long, assez fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape ; le onzième article pourvu d'un fascicule de poils au côté intérieur avant le sommet ; les tubercules antennifères assez distants l'un de l'autre, médiocrement élevés. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs quadrangulaires, un peu plus larges que longs.

Le pronotum transversal, trilobé à la base, pourvu d'une assez petite épine latérale mince, émoussée, rapprochée de la base, d'un tubercule émoussé avant elle et de deux grandes bosses rondes obtuses de chaque côté du milieu du disque (situées l'une après l'autre) ; les élytres allongés, très convexes, légèrement rétrécis dès l'épaule, largement arrondis au sommet, pourvus de fascicules de poils au tiers basilaire.

La tête rétractile.

La saillie prosternale peu large, aussi haute que les hanches, prolongée en avant un peu au delà des hanches, tronquée verticalement à son bord antérieur ; la saillie mésosternale peu large, tronquée obliquement à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre, robustes.

Type : *verrucicollis* Gah. Deux espèces de l'Asie méridionale et orientale dont une était rangée dans le Catalogue de JUNK-SCHENKLING parmi les *Mæchotypa* Thoms. J'en ai depuis lors décrit une autre.

1. *verrucicollis* Gah.

Mæchotypa verrucicollis Gah. 1895. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, p. 60.

Le front beaucoup plus haut que large, un peu moins large qu'un des lobes inférieurs des yeux ; les lobes inférieurs des yeux plus de deux fois plus longs que les joues ; le front peu densément et très finement ponctué ; quelques granules entre les bosses discales et le tubercule latéral du pronotum ; l'écusson triangulaire, arrondi au sommet. Les élytres granulés à la partie basilaire, surtout aux épaules et près de la suture, ensuite densément et assez grossièrement ponctué jusqu'au sommet ; sur chaque élytre, trois tubercules (un basilaire discal, un autre à côté de lui vers le calus huméral et un postbasilaire après le basilaire intérieur), surmontés tous d'un fascicule de poils ; un quatrième fascicule juste après le basilaire extérieur, et un cinquième à la suture juste après l'écusson.

Noir ; couvert d'une pubescence brun jaunâtre ; l'écusson (sauf aux bords latéraux), le quart basilaire des élytres (sauf une ligne longitudinale au bord antérieur du tubercule basilaire intérieur), et une grande tache latérale médiane triangulaire sur chaque élytre, sont de couleur brun foncé ; le quart apical des élytres marbré de brun foncé. Le dessous et les jambes couverts de pubescence rosâtre ; une partie des côtés des sterna, une bande longitudinale médiane sur l'abdomen, la partie médiane et apicale des cuisses, les deux derniers articles des tarses, les tibias et une grande partie des deux premiers articles des tarses, ainsi que les antennes (sauf l'extrême base des articles à partir du troisième, qui est couverte de pubescence jaune grisâtre), sont de couleur brun foncé.

Longueur : 22 à 25 millimètres. Largeur : 7 mm. 1/2 à 9 mm. 1/2.

Décrite par GAHAN sur des individus de Bhamo.

Localités : Indes britanniques : île Ceylan (Musée Britannique), Madras (Musée de Dehra Dun), Shembaganur (collection HEYROWSKY) ; Birmanie : Bhamo (GAHAN), Laos, Tonkin (Muséum de Paris).

2. *indica* Breun.

Mæchohecyra indica Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 231.

Proche de *verrucicollis* Gah., mais les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues ; le front beaucoup plus large qu'un des lobes inférieurs des yeux, densément et finement ponctué ; le tubercule antéro-latéral du pronotum plus proéminent ; les côtés du disque densément et grossièrement ponctué. Les élytres à peine granulés, non granulés près de la suture, entièrement couverts de longs poils érigés ; la partie basilaire des élytres et la tache latérale médiane à peine plus foncées que le reste de la surface ; les élytres marbrés dans toute leur étendue de brun. Le dessous et les jambes également couverts de pubescence brun jaunâtre (plutôt que rosâtre) ; les cuisses annelées de brun foncé seulement au milieu ; seulement la moitié apicale des tibias brun foncé.

Décrite par moi sur un individu des Indes britanniques : Chikkaballapura (Musée Britannique).

Genre 34 : **Paramæchotypa** Breun.

Paramæchotypa Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 230.

Stature allongée. Les antennes médiocrement fortes, un tiers plus longues que le corps, frangées en dessous ;

le scape court, fort ; le troisième article distinctement plus long que le quatrième, plus de deux fois plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants l'un de l'autre, peu élevés. Les yeux grossièrement facettés, subdivisés, mais les deux lobes contigus ; les lobes inférieurs quadrangulaires, un peu plus larges que longs. Le front plus haut que large, trapézoïdiforme.

Le pronotum court, très large, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs, profonds et presque droits, d'une longue épine conique émoussée au bord latéral, rapprochée de la base, d'un petit tubercule latéro-antérieur juste après le deuxième sillon transversal antérieur et d'un haut tubercule conique de chaque côté du milieu du disque.

Les élytres allongés, parallèles, convexes, arrondis au sommet ; le bout sutural étiré en un court lobe arrondi. La tête rétractile.

La saillie prosternale très étroite, beaucoup moins haute que les hanches, régulièrement arquée ; la mésosternale tronquée obliquement à son bord antérieur ; les jambes de longueur médiocre, assez robustes.

Type : *fasciculata* Breun. Une seule espèce du Bhoutan.

1. *fasciculata* Breun.

Paramœchotypha fasciculata Breun. 1938. Festschr. E. Strand IV, p. 230.

Les lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues ; le front peu densément et assez grossièrement ponctué ; la partie médiane du pronotum densément et grossièrement ponctué ; l'écusson triangulaire, arrondi au sommet ; les élytres densément et assez grossièrement ponctués.

Brun foncé, couvert d'une pubescence brun jaunâtre, variée de gris et de rosâtre, et vaguement tacheté de brun foncé, en formant surtout une tache plus grande au milieu du bord latéral de chaque élytre. Les cuisses et les tibias annelés de brun foncé au milieu et avant le sommet ; les deux derniers articles des tarsi brun foncé ; les antennes, à partir du troisième article, couvertes de pubescence brun foncé, sauf au tiers basilaire des articles, qui est couvert d'une pubescence brun jaunâtre.

Longueur : 21 millimètres. Largeur : 8 millimètres.

Décrit par moi sur un individu du Bhoutan (Musée Britannique).

Appendice

Genre *Paralasiocercis* novum

Stature en ovale allongé. Les antennes fines, moins longues que le corps, frangées en dessous ; le scape médiocrement long, peu fort ; le troisième article aussi long que le quatrième, distinctement plus long que le scape ; les tubercules antennifères distants, plats. Les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés ; les lobes inférieurs assez grands, rectangulaires. Le front beaucoup plus large que haut.

Le pronotum plus de deux fois plus large que long, pourvu de deux sillons transversaux antérieurs et de deux postérieurs très distincts (le premier antérieur effacé sur le disque), pourvu d'une grande et longue épine conique pointue au milieu du bord latéral et d'un assez haut tubercule de chaque côté du milieu du disque.

Les élytres allongés, convexes, légèrement rétrécis dès l'épaule, largement arrondis au sommet ; sur chaque élytre un tubercule basilaire ; à côté de l'écusson, une courte crête longitudinale postbasilaire assez élevée après le tubercule, et deux très petits tubercules (situés l'un après l'autre, l'antérieur au côté extérieur du tubercule basilaire, le postérieur au côté extérieur de la crête postbasilaire).

La tête rétractile.

La saillie prosternale très large, à peine élevée, arquée ; la saillie mésosternale très large, légèrement arrondie à son bord antérieur ; le métasternum de longueur normale ; les cavités cotyloïdes intermédiaires ouvertes. Les jambes de longueur médiocre ; les cuisses pédonculées ; les tibias intermédiaires sans sillon ; les crochets divariqués.

Type : *albicollis* Fairm. Une espèce de Madagascar, rangée jusqu'à présent dans le genre *Lasiocercis* Wat. Elle se distingue aisément d'*irichroa* Fairm. par le troisième article des antennes, qui est distinctement plus long que le scape.

I. *albicollis* Fairm.

Lasiocercis albicollis Fairm. 1897. Ann. Soc. ent. Belg. XLI, p. 400.

Les lobes inférieurs des yeux beaucoup plus longs que les joues ; le front éparsément et finement ponctué ; l'écusson triangulaire, arrondi au sommet ; les élytres densément et finement ponctués, les points de plus en plus fins vers le sommet, finement granulés aux épaules.

Noir ; couvert d'une pubescence brune, variée de brun jaunâtre ; la moitié antérieure du pronotum (avant le tubercule discal et l'épine latérale) couverte d'une pubescence jaune paille ; sa moitié postérieure d'une pubescence brun foncé, sauf une courte ligne longitudinale médiane jaune paille au milieu de la base. L'écusson brun foncé, sauf une ligne médiane jaune paille. Les élytres couverts de pubescence brun foncé au quart basilaire, cette couleur s'étendant jusqu'un peu au delà du milieu au bord latéral ; ensuite, une très large bande jaune rougeâtre varié de blanchâtre, qui remonte vers la suture, où elle s'étend de la fin du quart basilaire jusqu'un peu au delà du milieu ; cette bande bordée à son bord postérieur d'un peu de brun foncé. Les jambes couvertes de pubescence jaune paille, les cuisses annelées de brun foncé au milieu ; le tiers apical des tibias et la moitié apicale du quatrième article des tarsi, brun foncé. Le bout apical du troisième article antennaire et la base des articles 3 à 11 couverts d'une pubescence jaune blanchâtre.

Longueur : 8 mm. 1/2 à 11 millimètres. Largeur 4 mm. 1/2 à 5 millimètres.

Décrit par FAIRMATRE sur un individu de Madagascar : Antsianaka. Également de Fianarantsoa au Muséum de Paris.

Index des Crossotini.

Les noms en caractères gras indiquent les Genres et Sous-Genres.

Les noms en caractères droits sont ceux des espèces, morphæ ou aberrations.

Les noms en italiques sont ceux des Genres, espèces, morphæ ou aberrations synonymes.

N O M S	PAGES	FIGURES	N O M S	PAGES	FIGURES
<i>acuminatus</i> Jord. (Dichostathes)	53		<i>assimilis</i> Breun. (Frea)	36	
<i>acutecostata</i> Fairm. (Epirochroa)	19		<i>attenuata</i> Fairm. (Megalofrea)	44	
<i>adusta</i> Pasc. (Mœchotypa)	91		<i>attenuata</i> Pic (Mœchotypa)	93	
<i>ædificatoria</i> Hintz (Frea)	38		<i>attenuatus</i> Jord. (Frea)	27	
<i>æthiops</i> Dist. (Crossotus)	72		<i>aureocinctus</i> Auriv. (Frea)	26	
<i>albescens</i> Breun. (Frea)	32		<i>ayresi</i> Dist. (Dichostathes)	48	
<i>albicans</i> Breun. (Biobessa)	87				
<i>albicollis</i> Fairm. (Paralasiocercis)	98		<i>barbatus</i> Gerst. (Crossotus)	67	
<i>albicollis</i> Guér. (Crossotus)	71		<i>barbertoni</i> Gah. (Frea)	40	
<i>albidus</i> Hintz (Dichostathes)	48		<i>basalis</i> Gah. (Crossotus)	67	
<i>albisparsa</i> Gah. (Megalofrea)	44		<i>basalis</i> Jord. (Frea)	28	
<i>albithorax</i> Breun. (Frea)	24		<i>basimaculatus</i> Breun. (Crossotus)	70	
<i>alboannulata</i> Pic (Mœchotypa)	95		<i>beatrice</i> Gah. (Biobessa)	87	
<i>albolineata</i> Auriv. (Frea)	33		<i>bifasciatus</i> Kolbe (Crossotus)	73	
<i>albomaculata</i> Breun. (Dichostathes)	52		<i>bifuscomaculata</i> Breun. (Mimoranova) ..	77	
<i>albomaculata</i> Hintz (Froopsis)	41		<i>bimaculata</i> Auriv. (Crossotus)	71	
<i>albomaculatus</i> Breun. (Crossotus)	64		<i>bimaculata</i> Bat. (Dichostathes)	53	
<i>albomarmorata</i> Breun. (Frea)	24		<i>Biobessa</i> Gah.	87	
<i>alboplagiata</i> Breun. (Corus)	60		<i>bioculata</i> Fairm. (Megalofrea)	44	
<i>alboplagiata</i> Kolbe (Frea)	31		<i>blanchardi</i> Chevrl. (Hecyra)	83	
<i>albopunctatus</i> Breun. (Corus)	55		<i>brevicornis</i> Gah. (Frea)	33	
<i>albisparvus</i> Gah. (Megalofrea)	44		<i>brevis</i> Auriv. (Mycerinus)	81	
<i>albovarius</i> Wat. (Leucographus)	45		<i>brunneopictus</i> Fairm. (Crossotus)	70	
<i>albovittata</i> Breun. (Frea)	35		<i>burgconi</i> Breun. (Corus)	58	
<i>alluaudi</i> Fairm. (Leucographus)	47		<i>burgconi</i> Breun. (Frea)	26	
<i>annulata</i> Chevrl. (Frea)	34				
<i>annulicornis</i> Pasc. (Corus)	58		<i>caffer</i> Fahr. (Corus)	58	
<i>arabicus</i> Gah. (Crossotus)	69		<i>capensis</i> Breun. (Frea)	40	
<i>argenteus</i> Hintz (Crossotus)	67		<i>capucinus</i> Gerst. (Crossotus)	66	
<i>arida</i> Thoms. (Mœchotypa)	91		<i>castaneomaculata</i> Auriv. (Frea)	31	
<i>armicollis</i> Fairm. (Phanis)	74		<i>cervinocincta</i> Fairm. (Epirochroa)	19	
<i>asiatica</i> Pic (Mœchotypa)	93		<i>ceylonica</i> Breun. (Mœchotypa)	91	
<i>asperata</i> White (Hecyra)	83		<i>Cincinnati</i> Jord.	41	
<i>assamensis</i> Breun. (Mœchotypa)	90		<i>cincta</i> Jord. (Frea)	25	

N O M S	PAGES	FIGURES	N O M S	PAGES	FIGURES
<i>cinerascens</i> Fairm. (Megalofrea)	45		<i>fuliginosa</i> Kolbe (Mœchotypa)	95	
<i>circumscripta</i> Hintz (Frea)	31		<i>fulvomaculata</i> Hintz (Dichostathes) ...	50	
<i>collaris</i> Chevrl. (Corus)	56		<i>fulvovestita</i> Fairm. (Frea).....	33	
<i>compacta</i> Breun. (Neohecyra)	85		<i>fuscomaculata</i> Qued. (Frea)	22	
<i>compactus</i> Fairm. (Dichostathes)	47				
<i>compactus</i> Hintz (Corus)	55		<i>gabonicus</i> Thoms. (Frea)	34	
<i>concretus</i> Pasc. (Dichostathes)	48		Gasponia Fairm.....	74	
<i>congoana</i> Breun. (Frea)	26		<i>gaurani</i> Fairm. (Gasponia)	75	
<i>coomani</i> Pic (Mœchotypa).....	94		<i>genalis</i> Auriv. (Crossotus)	66	
<i>corticarius</i> Hintz (Dichostathes).....	48		Geteuma Thoms	20	
Corus Pasc.	54		<i>graueri</i> Hintz (Hecyra)	84	
<i>costata</i> Auriv. (Parhecyra)	85		<i>grisea</i> Breun. (Dichostathes)	52	
<i>costiger</i> Qued. (Corus).....	57		<i>grisea</i> Jord. (Frea)	27	
<i>cretaceus</i> Chevrl. (Corus)	59		<i>griseobasalis</i> Breun. (Frea)	28	
<i>cristatus</i> Jord. (Crossotus)	63		<i>griseomaculata</i> Breun. (Frea)	37	
<i>Crossotides</i> Hintz.....	63		<i>griseovaria</i> Fairm. (Epirochroa)	10	
Crossotofrea Hintz.....	34		<i>grisescens</i> Auriv. (Frea)	28	
Crossotus Serv.	63		<i>griseus</i> Hintz (Frea).....	28	
<i>curta</i> Chevrl. (Frea)	26				
<i>cylindricus</i> Breun. (Corus)	61		<i>haroldi</i> Qued. (Frea)	25	
Cyrtofrea Auriv.	33		<i>hauseri</i> Hintz (Dichostathes).....	51	
			Hecyra Thoms	82	
<i>damarensis</i> Hintz (Crossotus)	73		<i>Hecyrida</i> Thoms.....	82	
<i>davidis</i> Fairm. (Mœchotypa)	95		Hecyroides Breun.....	76	
<i>decorsi</i> Fairm. (Megalofrea)	45		Hecyromorpha Breun.....	86	
<i>delicatula</i> White (Mœchotypa)	89		<i>heimschi</i> Peyerimh. (Crossotus).....	69	
Dichostathes Thoms.....	47		<i>hintzi</i> Flav. (Frea)	22	
<i>diphysis</i> Pasc. (Mœchotypa)	95		<i>hovanus</i> Fairm. (Epirochroides)	21	
<i>distincta</i> Fairm. (Megalofrea)	44		<i>humeralis</i> Kolbe (Frea)	30	
<i>dorcadioides</i> Serv. (Mycerinus)	80		<i>humeralis</i> Voll. (Megalofrea)	43	
Ecyroschema Thoms	77		<i>improba</i> Thoms. (Hecyra)	83	
<i>elongatula</i> Pic (Mœchotypa)	89		<i>indica</i> Breun. (Mœchohecyra)	96	
Epirochroa Fairm.....	19		<i>inermis</i> Breun. (Crossotus)	65	
Epirochroides Breun.....	20		<i>infasciata</i> Breun. (Cincinnati)	42	
<i>erlangeri</i> Hintz (Crossotus)	67		<i>infasciculata</i> Pic (Mœchotypa).....	92	
<i>Eumimetes</i> Lac.	21		<i>insulcata</i> Pic (Mœchotypa).....	91	
<i>exiguus</i> Breun. (Corus).....	60		<i>interpres</i> Kolbe (Niphecyra)	82	
			<i>irrorata</i> Jord. (Frea)	35	
Falsobiobessa Breun.....	88		<i>itzingeri</i> Breun. (Crossotus)	72	
<i>fasciata</i> Brancs. (Frea)	24				
<i>fasciata</i> Hintz (Frea).....	22		<i>jaguarita</i> Chevrl. (Frea)	25	
<i>fasciata</i> Jord. (Cincinnati).....	42		<i>javana</i> Schwarz. (Mœchotypa).....	91	
<i>fascicularis</i> Fairm. (Gasponia)	75		<i>jeanvoinei</i> Pic (Mœchotypa).....	93	
<i>fasciculata</i> Breun. (Paramœchotypa) ...	97		<i>johannæ</i> Gah. (Frea)	32	
<i>fasciculata</i> Hintz (Dichostathes)	52				
<i>fasciculosa</i> Breun. (Falsobiobessa)	88		<i>kinduensis</i> Breun. (Frea)	26	
<i>fasciculosus</i> Auriv. (Corus)	55		<i>klugi</i> Dist. (Crossotus)	71	
<i>fasciolata</i> Fairm. (Epirochroa).....	20		<i>konduensis</i> Breun. (Cincinnati)	42	
<i>fasciolata</i> Hintz (Frea)	29		<i>kuntzeni</i> Hintz (Dichostathes).....	53	
<i>favosum</i> Thoms. (Ecyroschema)	77				
<i>flava</i> Breun. (Frea)	38		<i>lacunosus</i> Fahr. (Corus).....	56	
<i>flavicollis</i> Auriv. (Frea).....	27		<i>lævopunctata</i> Thoms. (Frea)	27	
<i>flavoguttatus</i> Hintz (Dichostathes) ...	52		<i>lævopunctatus</i> Breun. (Corus)	60	
<i>flavolineatus</i> Breun. (Crossotus)	68		<i>lævidorsis</i> Kolbe (Corus)	59	
<i>flavomaculata</i> Hintz. (Dichostathes) ...	52		<i>lata</i> Breun. (Frea)	38	
<i>flavomarmorata</i> Breun. (Frea)	35		<i>latefasciatus</i> Schwarz. (Plectropygus) ...	79	
<i>flavopictus</i> Qued. (Dichostathes)	53		<i>lateralis</i> Hintz (Crossotus).....	68	
<i>flavoscapulata</i> Fairm. (Frea)	31		<i>lateriplagiatus</i> Breun. (Hecyrides)	76	
<i>flavosparsa</i> Auriv. (Frea)	30		<i>latus</i> Breun. (Corus)	60	
<i>flavovittata</i> Breun. (Frea)	39		<i>leonensis</i> Breun. (Corus)	57	
<i>flavus</i> Breun. (Corus)	62		<i>lesnei</i> Breun. (Corus)	59	
<i>floccifera</i> Qued. (Frea)	27		Leucographus Wat.	45	
<i>flocciferoides</i> Breun. (Frea)	33		<i>leucostictica</i> White (Freopsis)	41	
<i>formosana</i> Pic (Mœchotypa)	90		<i>leucothorax</i> Breun. (Cincinnati)	42	
<i>frater</i> Lam. (Frea)	26		<i>lignarius</i> Guér. (Corus)	56	
Frea Thoms.....	21		<i>limbatus</i> Kolbe (Mycerinus)	80	
<i>freoides</i> Breun. (Crossotus)	71		<i>lineata</i> Auriv. (Frea)	31	
Freopsis Hintz.....	40		<i>lineata</i> Hintz (Frea)	37	

N O M S	PAGES	FIGURES	N O M S	PAGES	FIGURES
<i>lobatus</i> Jord. (Dichostathes)	51		<i>perrieri</i> Fairm. (Megalofrea)	44	
<i>lundbladi</i> Breun. (Frea)	40		Phanis Fairm.	74	
<i>luridus</i> Breun. (Corus)	60		<i>philippsi</i> Gah. (Crossotus)	69	
<i>lutulenta</i> Gestro (Pseudohecyra)	87		<i>pilosa</i> Breun. (Frea)	23	
<i>maculata</i> Hintz (Dichostathes)	52		<i>plagicollis</i> Gah. (Hecyromorpha)	86	
<i>maculata</i> Hintz (Frea)	36		Plectropygus Gah.	79	
<i>maculatus</i> Jord. (Mimiculus)	41		<i>plumicornis</i> Serv. (Crossotus)	72	
<i>maculicornis</i> Thoms. (Frea)	22		<i>plurifasciculatus</i> Breun. (Crossotus)	64	
<i>magnus</i> Auriv. (Dichostathes)	49		<i>proxima</i> Breun. (Frea)	23	
<i>malachitica</i> Jord. (Frea)	29		<i>pseudocaffer</i> Breun. (Corus)	59	
<i>marleyi</i> Dist. (Tambusa)	75		<i>pseudocostiger</i> Breun. (Corus)	58	
<i>marmorata</i> Gerst. (Frea)	31		Pseudohecyra Breun.	86	
<i>marmorata</i> Pasc. (Mœchotypa)	90		<i>puncticollis</i> Jord. (Frea)	29	
<i>marshalli</i> Breun. (Crossotus)	65		<i>punctiventris</i> Kolbe (Mycerinus)	80	
<i>marshalli</i> Breun. (Frea)	32		<i>pyramidalis</i> Fairm. (Leucographus)	46	
<i>medialbus</i> Breun. (Stheniopygus)	78		<i>quadricristatus</i> Breun. (Mimocorus)	62	
Megalofrea Auriv.	43		<i>quadridentata</i> Coqu. (Geteuma)	20	
<i>meridionalis</i> Hintz (Crossotus)	72		<i>quadripunctatus</i> Chevrl. (Dichostathes)	50	
Mimiculus Jord.	41		<i>quadrisignatus</i> Hintz (Dichostathes)	49	
Mimocorus Breun.	62		<i>reticulata</i> Dist. (Corus)	56	
<i>Mimosfrea</i> Hintz	21		<i>robustus</i> Jord. (Crossotus)	70	
Mimoranova Breun.	76		<i>rosacea</i> Breun. (Frea)	39	
<i>minusculus</i> Breun. (Corus)	61		<i>rothkirchi</i> Hintz (Dichostathes)	52	
<i>mirabilis</i> Breun. (Corus)	54		<i>rubromaculatus</i> Breun. (Dichostathes)	51	
<i>mniszecchi</i> Thoms. (Frea)	29		<i>rufithorax</i> Breun. (Hecyra)	84	
Mœchohecyra Breun.	96		<i>rufolineata</i> Qued. (Niphecyra)	81	
Mœchotypa Thoms.	89		<i>rufonubila</i> Fairm. (Megalofrea)	44	
<i>molossus</i> Duviv. (Crossotus)	63		<i>rugatum</i> Pasc. (Ecyroschema)	78	
<i>mucoreus</i> Gah. (Plectropygus)	79		<i>sahariensis</i> Breun. (Crossotus)	71	
<i>mülleri</i> Qued. (Dichostathes)	50		<i>sassensis</i> Breun. (Crossotus)	64	
<i>multilineatus</i> Breun. (Mycerinus)	80		<i>saxosicollis</i> Fairm. (Crossotus)	73	
<i>multituberculatum</i> Breun. (Ecyroschema)	78		<i>schoutedeni</i> Breun. (Cincinnati)	42	
<i>murina</i> All. (Leucographus)	46		<i>schoutedeni</i> Breun. (Crossotus)	65	
<i>Mycerinicus</i> Kolbe	79		<i>schoutedeni</i> Breun. (Frea)	39	
Mycerinus Thoms.	79		<i>Scotinages</i> Pasc.	89	
<i>natalensis</i> White (Crossotus)	73		<i>semenovi</i> Heyr. (Mœchotypa)	95	
<i>natalensis</i> Thoms. (Dichostathes)	48		<i>senilis</i> White (Frea)	25	
<i>nebulosa</i> Breun. (Fropsis)	41		<i>senmaarensis</i> Hintz (Crossotus)	70	
<i>nebulosus</i> Fairm. (Crossotus)	69		<i>seriemaculatus</i> Hintz (Gasponia)	75	
Neohecyra Breun.	84		<i>sexpunctata</i> Fairm. (Megalofrea)	43	
<i>Neosthenias</i> Schwarz.	79		<i>sikkimensis</i> Breun. (Mœchotypa)	94	
<i>nigrobasalis</i> Breun. (Frea)	29		<i>similis</i> Breun. (Dichostathes)	49	
<i>nigrofasciata</i> Breun. (Frea)	22		<i>sparsa</i> Klug. (Frea)	23	
<i>nigroguttatus</i> Jord. (Dichostathes)	53		<i>sparsilis</i> Jord. (Frea)	24	
<i>nigropicta</i> Fairm. (Leucographus)	46		<i>sparsuticollis</i> Fairm. (Megalofrea)	45	
<i>nigrovittata</i> Breun. (Frea)	23		Stheniopygus Breun.	78	
Niphecyra Kolbe.	81		<i>stigmaticus</i> Fahr. (Crossotus)	67	
<i>niveivollis</i> Hintz (Crossotus)	68		<i>strandi</i> Breun. (Crossotus)	64	
<i>nyassana</i> Auriv. (Frea)	32		<i>strandi</i> Breun. (Dichostathes)	48	
<i>nyassanus</i> Breun. (Corus)	61		<i>strandi</i> Breun. (Frea)	26	
<i>obscurator</i> F. (Hecyra)	83		<i>strandi</i> Breun. (Mœchotypa)	93	
<i>obscurus</i> Breun. (Corus)	61		<i>strandiella</i> Breun. (Frea)	24	
<i>obtusus</i> Hintz (Crossotus)	71		<i>strandiellus</i> Breun. (Corus)	57	
<i>ochraceomaculata</i> Breun. (Dichostathes)	52		<i>strigifrons</i> Fairm. (Crossotus)	68	
<i>ochreicollis</i> Breun. (Dichostathes)	54		<i>stypticus</i> Pasc. (Crossotus)	72	
<i>oculatus</i> Hintz (Crossotus)	67		<i>subcostata</i> Kolbe (Frea)	34	
<i>olivacea</i> Breun. (Frea)	35		<i>subcostatus</i> Kolbe (Mycerinus)	80	
<i>pallida</i> Breun. (Hecyra)	84		<i>sublineatus</i> Gestro (Crossotus)	70	
Parabiobessa Breun.	87		<i>subocellatus</i> Fairm. (Crossotus)	69	
Paralasiocercis Breun.	97		<i>suffusa</i> Pasc. (Mœchotypa)	91	
<i>parallelus</i> Breun. (Corus)	57		<i>tabularis</i> Kolbe (Dichostathes)	49	
Paramœchotypa Breun.	96		Tambusa Dist.	75	
Parhecyra Breun.	85		<i>tenebrioides</i> Fahr. (Hecyra)	83	
<i>parvus</i> Breun. (Corus)	59		<i>tenuepunctata</i> Fairm. (Megalofrea)	44	
<i>penicillatus</i> Gah. (Gasponia)	75		<i>terrea</i> Bert. (Hecyra)	83	

N O M S	PAGES	FIGURES	N O M S	PAGES	FIGURES
<i>thoracica Hintz</i> (Frea)	29		<i>uniformis Hintz</i> (Frea)	28	
<i>thoracica White</i> (Mœchotypa)	92		<i>uniformis Pic</i> (Mœchotypa)	94	
<i>transversefasciata Breun.</i> (Cincinnati)	43		<i>unipunctata Breun.</i> (Frea)	38	
<i>trifasciculata Breun.</i> (Mœchotypa)	94		<i>vagepicta Fairm.</i> (Frea)	24	
<i>trilineata Hintz</i> (Frea)	36		<i>vagepictus Fairm.</i> (Crossotus)	68	
<i>trilineatus Hintz</i> (Dichostathes)	49		<i>valdepunctata Thoms.</i> (Frea)	25	
<i>trioculata Breun.</i> (Megalofrea)	45		<i>valida Gah.</i> (Crossotus)	70	
<i>tuberculata Auriv.</i> (Frea)	36		<i>variegatus Wat.</i> (Leucographus)	46	
<i>tubericollis Fairm.</i> (Crossotus)	70		<i>vermiculata Kolbe</i> (Frea)	30	
<i>turchais Fairm.</i> (Frea)	29		<i>verrucicollis Gah.</i> (Mœchohecyra)	96	
<i>Tylophorus Bless.</i>	89		<i>vestiticornis Fairm.</i> (Crossotus)	73	
<i>ugandæ Breun.</i> (Crossotus)	66		<i>virgata Qued.</i> (Frea)	34	
<i>ugandæ Breun.</i> (Dichostathes)	50		<i>vittatus Auriv.</i> (Crossotus)	70	
<i>ugandæ Breun.</i> (Parabiobessa)	88		<i>wulffiusi Ganglb.</i> (Mœchotypa)	95	
<i>umbrosa Lac.</i> (Mœchotypa)	92		<i>zambesiâna Hintz</i> (Frea)	32	
<i>unicolor Breun.</i> (Frea)	27		<i>zic-zac Breun.</i> (Frea)	37	
<i>unifasciata Thoms.</i> (Frea)	36				
<i>uniformis Breun.</i> (Niphecyra)	82				